



Eenheid voor Zelfmoordonderzoek
Prof. Dr. C. van Heeringen
Universitair Ziekenhuis – 1K12F
De Pintelaan 185
9000 Gent
Tel. 09/332.43.73
Fax 09/332.49.89

DE EPIDEMIOLOGIE VAN SUÏCIDEPOGINGEN
IN VLAANDEREN
JAARVERSLAG 2010

Een onderzoek naar de verspreiding van suïcidepogingen en naar de factoren die deze verspreiding beïnvloeden door middel van een registratie in zesentwintig Vlaamse spoedopnamediensten.

Uitgevoerd met de steun van de Vlaamse Regering, in opdracht van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Lic. E. De Jaegere
Lic. C. Wittouck
Lic. Dr. G. Portzky
Prof. Dr. C. van Heeringen

Inhoudstafel

Inleiding: achtergrond en methodologie van het registratieproject	1-3
Suïcidepogingen in Vlaanderen	4-29
<u>Deel 1: Algemeen</u>	4-11
<i>Aantal gebeurtenissen en personen</i>	<i>4</i>
<i>Rates</i>	<i>5-8</i>
<i>Schattingsfactoren</i>	<i>9-11</i>
Vergelijking IPEO-registraties en kwaliteitscontrole UZ Gent	10-11
<u>Deel 2: Persoonsgerelateerde gegevens</u>	12-18
<i>Geslacht en leeftijd</i>	<i>12</i>
<i>Burgerlijke staat en woonsituatie</i>	<i>12-13</i>
<i>Economische toestand</i>	<i>13-14</i>
<i>Psychiatrische behandeling in voorgeschiedenis</i>	<i>14</i>
<i>Voorgeschiedenis van suïcidaal gedrag</i>	<i>15-16</i>
<i>Sociaal netwerk</i>	<i>16</i>
<i>Alcohol- en middelenmisbruik</i>	<i>16-17</i>
<i>Diagnose</i>	<i>17-18</i>
<u>Deel 3: Gebeurtenisgerelateerde gegevens</u>	19-29
<i>Situering in de tijd</i>	<i>19</i>
<i>Aard van de poging</i>	<i>20-22</i>
Methode	20
Alcoholiname tijdens suïcidepoging	20
Omstandigheden	20-21
Aanmelding	21
Ernst letsel	21-22
<i>Gevoelens en suïcidaliteit na de poging</i>	<i>22-24</i>
Gevoelens	22-23
Suïcidaliteit	23-24
<i>Ervaren problemen</i>	<i>24-25</i>
<i>Motieven</i>	<i>25-26</i>
<i>Suïcidale intentie</i>	<i>26-27</i>
<i>Zorgtraject</i>	<i>27-29</i>
Bereidheid tot begeleiding	27
Zorgbehoeften	27-28
Behandelplan na spoedopname	28-29
Samenvatting van de voornaamste trends en aanbevelingen	30-32
Overzichtstabel	33-87
Bijlage: Relevante invloedssferen	88-92
Referentie	93

Inleiding: Achtergrond en methodologie van het registratieproject

Sinds 1998 worden er jaarlijks, met steun van de Vlaamse Regering, in opdracht van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, gegevens geregistreerd betreffende de frequentie van suïcidepogingen en de kenmerken van suïcidepogers die gezien werden op de spoedopname-dienst van vier Vlaamse ziekenhuizen (UZ Gent, AZ Sint-Jan Brugge, AZ Oost-Limburg Genk en Virga Jesse Hasselt). In het kader van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie werd deze registratie van suïcidepogingen in 2008 sterk uitgebreid. Aangezien de kenmerken van suïcidepogingen nu verzameld worden aan de hand van het Instrument voor Psychosociale Evaluatie en Opvang van suïcidepogers (IPEO¹) zijn er veel meer gegevens beschikbaar. Dit instrument werd in de eerste plaats ontwikkeld om de organisatie van het zorgproces na een suïcidepoging te ondersteunen. Het kan echter ook gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. De informatie die nu verzameld wordt bevat niet alleen epidemiologische gegevens, maar ook data in verband met het suïcidaal proces, de psychiatrische voorgeschiedenis, de belangrijkste life-events, de suïcidale intentie, de motieven voor de poging, en het uiteindelijke behandelplan na het ontslag op de spoedopname.

In 2007 leverden 5 ziekenhuizen (UZ Gent, AZ Sint-Jan Brugge, ZH Oost-Limburg Genk, Virga Jesse Hasselt en ZH Maas en Kempen Maaseik) data aan de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek, in 2008 6 ziekenhuizen (UZ Gent, ZH Oost-Limburg Genk, AZ Sint-Jan Brugge, AZ Sint-Lucas Brugge, Sint-Trudo Sint-Truiden en AZ Glorieux Ronse) en in 2009 waren dit 12 ziekenhuizen (UZ Gent, ZH Oost-Limburg Genk, AZ Sint-Jan Brugge, AZ Sint-Lucas Brugge, Sint-Trudo Sint-Truiden, AZ Glorieux Ronse, AZ Lokeren, ZH Maas en Kempen Maaseik, Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst en Asse, AZ Salvator Hasselt, AZ Sint-Maarten Duffel en AZ Vesalius Tongeren). Het totaal aantal ziekenhuizen dat in 2010 data heeft geleverd is 26, m.n. UZ Gent, ZH Oost-Limburg Genk, AZ Sint-Jan Brugge, AZ Sint-Lucas Brugge, Sint-Trudo Sint-Truiden, AZ Glorieux Ronse, AZ Lokeren, ZH Maas en Kempen Maaseik, Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst en Asse, AZ Salvator Hasselt, AZ Sint-Maarten Duffel, AZ Vesalius Tongeren, AZ Damiaan Oostende, AZ Groeninge Kortrijk, AZ Monica Antwerpen, AZ Oudenaarde, AZ Sint-Jozef Malle, AZ Sint-Blasius Dendermonde, H. Hartziekenhuis Mol, Jan Yperman Ieper, Maria Middelaars Gent, Maria ZH Overpelt, OLV van Lourdes Waregem, RZ Sint-Maria Halle, AZ Sint-Augustinus Veurne en UZ Leuven.

Het IPEO zal de komende jaren progressief in heel Vlaanderen geïmplementeerd worden en zal aldus de basis vormen voor een meer uitgebreide dataverzameling, zowel kwantitatief als inhoudelijk. In 2011 registreerden 40 ziekenhuizen hun suïcidepogers aan de hand van het IPEO.

Naast een papieren versie van het IPEO is ook een elektronische versie beschikbaar voor de deelnemende ziekenhuizen. De gegevens die ingegeven worden in dit programma kunnen digitaal aan de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek bezorgd worden. Voor dit jaarverslag leverden twee op drie ziekenhuizen elektronische IPEO's.

Om zo weinig mogelijk vals positieve en vals negatieve suïcidepogingen te bekomen en om de inclusie van suïcidepogingen over de verschillende ziekenhuizen heen te uniformiseren werd in de handleiding van het IPEO een definitie van een suïcidepoging geformuleerd, afkomstig van de

¹ Dit instrument werd ontwikkeld door de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek (UGent) in samenwerking met Sein – Instituut voor Gedragwetenschappen (UHasselt) & het Project Zelfmoordpreventie van Vlaanderen (CGGZ) i.o.v. het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Wereld Gezondheid Organisatie (WHO). Deze definitie wordt in de handleiding toegelicht aan de hand van een beslissingsboom met voorbeelden. De definitie gaat als volgt:

*Een **suïcidepoging** is een handeling, met een niet fatale afloop, waarbij een individu opzettelijk, weloverwogen een ongewoon gedrag stelt of initieert, dat zonder interventie van anderen zal leiden tot zelfverwonding(-vernietiging), of waarbij een individu opzettelijk een stof inneemt in een grotere dan de voorgeschreven of algemeen aanvaardbare therapeutische dosis, met de bedoeling via de actuele of verwachte fysieke gevolgen, verlangde verandering(en) te bewerkstelligen (Bille-Brabe et al., 1994).*

Wat betreft de methode van suïcidepogingen hanteren we een onderscheid tussen zelfverwonding (verhanging, wurging, verdrinking, steek- en snijwonden, sprong van een hoogte e.d.) en zelfvergiftiging (inname van (psycho)farmaca, drugs, alcohol, chemicaliën of andere schadelijke stoffen).

In de registrerende ziekenhuizen, die bereid zijn om inzage in de opname-registers te verschaffen, wordt een kwaliteitscontrole uitgevoerd. Hierbij wordt er in de aanmeldingsregisters van spoed en eventueel urgentiepsychiatrie op zoek gegaan naar “missings”, patiënten die zich aanmelden ten gevolge van een suïcidepoging en niet geïnterviewd zijn met behulp van het IPEO. In het UZ Gent worden deze patiënten ook steeds opgezocht in het elektronisch patiëntendossier om na te gaan of het wel degelijk om een suïcidepoging gaat. De kwaliteitscontrole in het UZ Gent vindt jaarlijks plaats. In de overige registrerende ziekenhuizen wordt de kwaliteitscontrole slechts om de drie jaar uitgevoerd omwille van een tekort aan tijd en middelen. De kwaliteitscontrole wordt ook enkel in een ziekenhuis uitgevoerd wanneer het IPEO reeds een jaar of langer in gebruik is.

Op basis van de kwaliteitscontrole wordt een schatting gemaakt van het reële aantal suïcidepogingen gemeld op de spoedafdeling van een ziekenhuis. De schattingsfactor wordt berekend door het aantal geregistreerde IPEO's op te tellen bij het aantal “missings” en dit vervolgens te delen door het aantal geregistreerde IPEO's. Voor de ziekenhuizen waar geen kwaliteitscontrole plaatsvond in 2010, of waar ons toegang geweigerd werd tot de aanmeldingsregisters, wordt een algemene schattingsfactor berekend. De algemene schattingsfactor is gelijk aan de som van de schattingsfactoren afkomstig uit de kwaliteitscontroles van de afgelopen drie jaar gedeeld door het aantal ziekenhuizen waarin een kwaliteitscontrole gebeurde. Hierbij dienen we ook op te merken dat deze schattingsfactoren onderhevig zijn aan de nadelen die verbonden zijn aan de kwaliteitscontroles (frequent voorkomende vage terminologie in de opnameregisters of onduidelijkheid over habituele versus niet habituele zelfvergiftiging en/of zelfverwonding). UZ Gent vertoont de meest realistische schattingsfactor aangezien we daar gebruik konden maken van de patiëntendossiers.

Het incidentiecijfer per spoedopnamedienst wordt aan de hand van volgende procedure berekend: De populatioemer wordt berekend aan de hand van de bevolking waaruit de spoedopnamedienst de patiënten werft. Er wordt nagegaan per gemeente hoeveel procent van de inwoners van die regio opgenomen werden in een Belgisch ziekenhuis in het beschouwde kalenderjaar (voor dit jaarverslag werd gebruik gemaakt van de meest recente relevante invloedssferen, namelijk van 2007). Vervolgens wordt bekeken hoeveel patiënten opgenomen werden in het registrerende ziekenhuis in datzelfde kalenderjaar. Het percentage (aantal patiënten gehospitaliseerd in dit ZH/ aantal patiënten gehospitaliseerd in alle ZHN) wordt vervolgens vermenigvuldigd met het totale aantal inwoners van die gemeente voor het beschouwde kalenderjaar (met name 2010) om de populatioemer voor die gemeente voor het desbetreffende ziekenhuis te bekomen. De totale populatioemer voor het ziekenhuis wordt bekomen door de populatioemers voor de verschillende gemeentes op te tellen. Het incidentiecijfer wordt uiteindelijk bekomen door het aantal geschatte suïcidepogingen (event-based) of suïcidepogers (person-based) van het beschouwde kalenderjaar te delen door de

populatioener. Daarna wordt het cijfer herleid naar 100.000. De rates voor Vlaanderen als geheel worden berekend door de som van het aantal geschatte suïcidepogingen (event-based) of suïcidepogers (person-based) te delen door de som van de populatioeners van de zesentwintig registrerende ziekenhuizen.

Het huidige jaarverslag omvat informatie van de patiënten die gedurende 2010 één of meerdere suïcidepogingen ondernamen en zich aanmeldden in één van de zesentwintig eerder vernoemde ziekenhuizen. Het verslag wordt opgesplitst in een Vlaams gedeelte (alle kenmerken van de geregistreerde suïcidepogingen van 2010 samen) en in een gedeelte per ziekenhuis, verwerkt in een overzichtstabel. Een deel van de gegevens van het UZ Gent werd ook verwerkt in de WHO/EURO Multicentre Study of Suicidal Behaviour.

Rest ons nog iedereen te bedanken die actief meegewerkt heeft aan de dataverzameling. Zonder jullie medewerking kunnen wij immers niet verder. Indien er onduidelijkheden of extra vragen zijn, aarzel dan niet ons te contacteren. Verder danken wij ook het Rijksregister en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Informatie en Ondersteuning, Team Gegevensverwerking en Resultaatsopvolging, voor het ter beschikking stellen van de populatiecijfers voor de verschillende regio's, en de Vlaamse Regering, met name het Vlaams ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, voor de financiering van het onderzoek.

Meer informatie over de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek is beschikbaar op onze website: www.eenheidvoorzelfmoordonderzoek.be.

Suïcidepogingen in Vlaanderen 2010

Deel 1: Algemeen

Aantal gebeurtenissen (event-based) en personen (person-based)

In onderstaande tabel staat een overzicht van het aantal geregistreerde suïcidepogingen ('events') en het aantal geregistreerde suïcidepogers ('persons') in Vlaanderen in 2010. Aangezien we van sommige ziekenhuizen, m.n. AZ Damiaan Oostende, AZ Groeninge Kortrijk, AZ Monica, AZ Oudenaarde, AZ St-Jozef Malle, AZ Maria Middelaes Gent, OLV van Lourdes Waregem, Salvator ZH Hasselt en AZ St-Augustinus Veurne, niet alle registraties voor 2010 hebben ontvangen, werden hun registraties geëxtrapoleerd over het hele jaar. De aantallen die worden weergegeven in onderstaande tabel verschillen ook voor sommige ziekenhuizen van deze in de overzichtstabel omdat éénzelfde patiënt soms van de ene registrerende spoedopnamedienst naar een andere werd doorverwezen waardoor het IPEO tweemaal werd afgenomen. Voor Vlaanderen werd slechts één van de twee IPEO-afnames gebruikt. Aan de registraties van UZ Gent werden ook de registraties toegevoegd die verkregen werden via de kwaliteitscontrole.

Zoals wordt weergegeven in tabel 1 waren er verscheidene personen die meer dan één poging ondernamen.

Tabel 1: Overzicht events (EB) en personen (PB) per instelling en geslacht, 2010

Instelling/Regio*	Mannen		Vrouwen		Totaal	
	EB	PB	EB	PB	EB	PB
AZ Damiaan / Oostende	12	12	21	20	33	32
AZ Glorieux / Ronse	20	20	34	32	55	53
AZ Groeninge / Kortrijk	56	54	30	30	88	86
AZ Lokeren	17	17	20	20	37	37
AZ Maria Middelaes / Gent	9	9	42	42	51	51
AZ Monica/ Antwerpen	12	12	8	8	20	20
AZ Oudenaarde	9	9	20	19	29	28
AZ Sint-Augustinus / Veurne	24	24	12	12	36	36
AZ Sint-Blasius / Dendermonde	36	36	26	26	63	63
AZ Sint-Jan / Brugge	67	67	121	104	188	171
AZ Sint-Jozef / Malle	9	9	21	21	30	30
AZ Sint-Lucas / Brugge	26	25	41	35	67	60
AZ Sint-Maarten / Duffel	31	31	30	30	61	61
AZ Vesalius / Tongeren	16	16	19	19	35	35
H. Hartziekenhuis / Mol	12	12	34	34	46	46
Jan Yperman / Ieper	31	30	61	58	92	88
Maria ZH / Overpelt	7	7	17	17	24	24
OLV van Lourdes ZH / Waregem	28	27	44	44	72	71
OLV Ziekenhuis Aalst - Asse	36	36	72	67	108	103
RZ Sint-Maria / Halle	8	8	18	18	26	26
RZ Sint-Trudo / Sint-Truiden	22	22	60	57	82	79
Salvator ZH / Hasselt	10	10	14	14	24	24
UZ Gent	97	91	117	111	214	202
UZ Leuven	38	38	93	93	134	134
ZH Maas en Kempen / Maaseik	16	16	35	35	51	51
ZH Oost-Limburg / Genk	22	22	35	35	58	58
Totaal / Vlaanderen	671	660	1045	1001	1724	1669

*De gemeenten die tot een bepaalde regio behoren, vindt men in bijlage

Rates

In tabel 2 worden de rates per geslacht en spoedopnamedienst gepresenteerd. De incidentiecijfers van suicidepogingen in Vlaanderen werden berekend op basis van het aantal gebeurtenissen (event-based rates; EB) en op basis van het aantal personen dat één of meerdere pogingen ondernam (person-based rates; PB).

Tabel 2: Overzicht rates verdeeld volgens instelling en geslacht (per 100.000 inwoners), 2010

Instelling/Regio*	Mannen		Vrouwen		Totaal	
	EB	PB	EB	PB	EB	PB
AZ Damiaan / Oostende	82	82	125	119	104	101
AZ Glorieux / Ronse	272	273	411	396	349	341
AZ Groeninge / Kortrijk	149	144	72	74	110	109
AZ Lokeren	229	223	253	253	242	239
AZ Maria Middelaars / Gent	36	36	150	153	95	96
AZ Monica/ Antwerpen	69	69	43	43	55	55
AZ Oudenaarde	116	117	240	229	170	164
AZ Sint-Augustinus / Veurne	300	301	132	135	209	212
AZ Sint-Blasius / Dendermonde	195	196	128	131	161	164
AZ Sint-Jan / Brugge	159	159	264	236	210	197
AZ Sint-Jozef / Malle	62	63	136	140	100	101
AZ Sint-Lucas / Brugge	219	212	235	206	228	207
AZ Sint-Maarten / Duffel	131	132	107	109	117	119
AZ Vesalius / Tongeren	118	118	127	130	122	123
H. Hartziekenhuis / Mol	111	112	275	281	197	200
Jan Yperman / Ieper	288	285	302	294	295	290
Maria ZH / Overpelt	39	39	86	88	63	64
OLV van Lourdes ZH / Waregem	250	241	349	358	300	299
OLV Ziekenhuis Aalst - Asse	81	81	165	157	121	117
RZ Sint-Maria / Halle	62	62	117	120	91	92
RZ Sint-Trudo / Sint-Truiden	160	161	401	390	283	277
Salvator ZH / Hasselt	61	61	78	80	70	71
UZ Gent	218	204	357	321	280	257
UZ Leuven	45	45	132	135	85	87
ZH Maas en Kempen / Maaseik	174	175	316	324	250	254
ZH Oost-Limburg / Genk	49	50	79	81	65	66
Totaal / Vlaanderen⁺	129	128	177	169	153	150


*De gemeenten die tot een bepaalde regio behoren, vindt men in bijlage

⁺UZ Leuven werd niet in de totale rates geïnccludeerd aangezien de registratiemaanden niet bekend waren.

Bij de vrouwen kwamen meer repetitieve pogingen voor dan bij de mannen, bijgevolg liggen de EB- en PB-rates bij de mannen dicht bij elkaar dan bij de vrouwen.

Figuur 1 toont de evolutie aan van de PB-rates in Vlaanderen. Het gemiddelde van de totale PB rates gedurende de voorbije twaalf registratiejaren bedraagt 161/100.000 inwoners. Wanneer de PB-rate van 2010 vergeleken wordt met die van 2009 blijkt dat er een daling is van 6,3% die echter niet significant is ($\chi^2(1) = 0,45$; $p > .05$). De gemiddelde incidentierate voor vrouwen (196/100.000) ligt hoger dan deze voor mannen (129/100.000). Ten opzichte van 2009 is de incidentierate van 2010 voor mannen licht gestegen met 3,2% ($\chi^2(1) = 0,06$; $p > .05$) en voor vrouwen met 13,8% gedaald ($\chi^2(1) = 2,01$; $p > .05$).


Figuur 1: Person-based rate-evolatie van suïcidepogingen per 100.000 inwoners in Vlaanderen, volgens geslacht, 1999-2010



Figuur 2 toont aan dat de EB-rates quasi dezelfde evolutie volgen als de PB-rates. De gemiddelde EB-rate voor Vlaanderen, berekend over de laatste twaalf jaar, bedraagt 169/100.000 inwoners. Ten opzichte van 2009 is de EB-rate van 2010 7,3% gedaald. Deze daling is echter niet significant ($\chi^2(1) = 0,45$; $p > .05$). Ter verduidelijking van deze rate betekent dit in absolute cijfers dat in 2010 naar schatting 9566 pogingen voorkwamen in Vlaanderen, wat neerkomt op ongeveer 26 suïcidepogingen per dag.

Het verschil tussen de gemiddelde EB-rate voor vrouwen (206/100.000) en mannen (134/100.000) is nog meer uitgesproken in vergelijking met het man/vrouw verschil van de PB-rates. De EB-rate van de mannen is in 2010 1,6% gestegen ($\chi^2(1) = 0,02$; $p > .05$) ten opzichte van 2009, de EB-rate van de vrouwen is daarentegen 12,4% gedaald ($\chi^2(1) = 1,65$; $p > .05$).

Figuur 2: Event-based rate-evolatie van suïcidepogingen per 100.000 inwoners in Vlaanderen, volgens geslacht, 1999-2010




Tabel 3 en Figuur 3 geven de PB-evolutie weer, opgesplitst volgens de verschillende spoed-opnamediensten. Hierbij worden slechts 12 ziekenhuizen weergegeven daar we van de nieuw registrerende ziekenhuizen uiteraard nog geen voorgaande gegevens hebben. We zien een duidelijke daling van de incidentie in UZ Gent, AZ Sint-Jan, ZH Oost-Limburg, RZ Sint-Trudo en OLV Ziekenhuis en een stijging in AZ Glorieux, Sint-Lucas, ZH Maas en Kempen, AZ Lokeren, AZ Sint-Maarten, AZ Vesalius en Salvator Hasselt. De sterke schommelingen in de rates kunnen deels te wijten zijn aan de nadelen die verbonden zijn aan een kwaliteitscontrole. Op basis van de aanmeldingsregisters is het niet altijd mogelijk om een onderscheid te maken tussen een habituele middelenintoxicatie of zelfverwonding en een intentionele overdosis of zelfverwonding. Ook de terminologie die in de aanmeldingsregisters gebruikt wordt om suïcidepogingen aan te duiden, verschilt tussen de ziekenhuizen.

Tabel 3: Overzicht van person-based rates volgens instelling/regio per 100.000 inwoners

Instelling/Regio*	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
UZ Gent	190	221	143	217	173	301	282	216	257	270	274	257
AZ Sint-Jan, Brugge	245	279	199	241	190	138	214	248	305	245	214	197
ZH Oost-Limburg, Genk	117	97	113	123	105	84	107	97	75	105	78	66
AZ Glorieux, Ronse										222	249	341
AZ Sint-Lucas, Brugge										162	163	207
RZ Sint-Trudo, Sint-Truiden										182	312	277
ZH Maas en Kempen, Maaseik									105		193	254
AZ Lokeren											182	239
AZ Sint-Maarten, Duffel											92	119
AZ Vesalius, Tongeren											79	123
OLV Ziekenhuis, Aalst - Asse											144	117
Salvator ZH, Hasselt											63	71

*De gemeenten die tot een bepaalde regio behoren, vindt men in bijlage

Figuur 3: Evolutie van PB-incidentierate van suïcidepogingen volgens instelling/regio, 1999-2010




Tabel 4 en Figuur 4 geven de EB-evolutie van de laatste twaalf jaar per spoedopnamedienst weer. De tendensen zijn identiek aan de persoonsgerelateerde evolutie.

Tabel 4: Overzicht van event-based rates per 100.000 inwoners volgens instelling/regio

Instelling/Regio*	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
UZ Gent	198	235	150	234	193	315	310	231	271	280	294	280
AZ Sint-Jan, Brugge	265	303	206	275	197	144	221	278	331	251	221	210
ZH Oost-Limburg, Genk	122	102	113	125	111	88	110	98	76	107	80	66
AZ Glorieux, Ronse										222	252	341
AZ Sint-Lucas, Brugge										166	169	228
RZ Sint-Trudo, Sint-Truiden										189	319	277
ZH Maas en Kempen, Maaseik									124		195	250
AZ Lokeren											188	242
AZ Sint-Maarten, Duffel											92	117
AZ Vesalius											79	122
OLV Ziekenhuis, Aalst - Asse											145	121
Salvator ZH, Hasselt											63	70

*De gemeenten die tot een bepaalde regio behoren, vindt men in bijlage

Figuur 4: Evolutie van EB-incidentierate van suïcidepogingen volgens instelling/regio, 1999-2010



Schattingsfactoren

De schattingsfactoren worden berekend op basis van een kwaliteitscontroles. Bij een kwaliteitscontrole wordt er in de aanmeldingsregisters van spoed en eventueel urgentiepsychiatrie op zoek gegaan naar “missings”, patiënten die zich aanmelden ten gevolge van een suïcidepoging en niet geïnterviewd zijn met behulp van het IPEO. In het UZ Gent worden deze patiënten ook steeds opgezocht in het elektronisch patiëntendossier om na te gaan of het wel degelijk om een suïcidepoging gaat. De kwaliteitscontrole in het UZ Gent vindt jaarlijks plaats. In de overige registrerende ziekenhuizen wordt de kwaliteitscontrole slechts om de drie jaar uitgevoerd omwille van een tekort aan tijd en middelen. De kwaliteitscontrole wordt ook enkel in een ziekenhuis uitgevoerd wanneer het IPEO reeds een jaar of langer in gebruik is.

Op basis van de kwaliteitscontrole wordt een schatting gemaakt van het reële aantal suïcidepogingen gemeld op de spoedafdeling van een ziekenhuis. De schattingsfactor wordt berekend door het aantal geregistreerde IPEO's op te tellen bij het aantal “missings” en dit vervolgens te delen door het aantal geregistreerde IPEO's. Voor de ziekenhuizen waar geen kwaliteitscontrole plaatsvond in 2010, of waar ons toegang geweigerd werd tot de aanmeldingsregisters, wordt een algemene schattingsfactor berekend. De algemene schattingsfactor is gelijk aan de som van de schattingsfactoren afkomstig uit de kwaliteitscontroles van de afgelopen drie jaar gedeeld door het aantal ziekenhuizen waarin een kwaliteitscontrole gebeurde. Tabel 5 en 6 geven per ziekenhuis waar de afgelopen drie jaar een kwaliteitscontrole is uitgevoerd, het aantal geregistreerde IPEO's, het aantal missings en de EB- en PB-schattingfactoren weer. De algemene EB- en PB-schattingfactoren van 2010 zijn ook terug te vinden in tabel 5 en 6. Hierbij dienen we ook op te merken dat deze schattingsfactoren onderhevig zijn aan de nadelen die verbonden zijn aan de kwaliteitscontroles (frequent voorkomende vage terminologie in de opnameregisters of onduidelijkheid over habituele versus niet habituele zelfvergiftiging en/of zelfverwonding). UZ Gent vertoont de meest realistische schattingsfactor aangezien we daar gebruik konden maken van de patiëntendossiers.

Tabel 5: Overzicht van EB-schattingfactoren (SF) per instelling en jaar van kwaliteitscontrole (KC), en algemene EB-schattingfactoren

Instelling/regio*	Jaar van KC	Man	Missing M	SF M	Vrouw	Missing V	SF V	Tot.	Missing tot.	SF tot.
AZ Glorieux, Ronse	2009	30	5	1,17	43	11	1,26	73	16	1,22
AZ Lokeren	2010	17	22	2,31	20	29	2,47	37	52	2,40
AZ Sint-Jan, Brugge	2010	67	36	1,54	104	37	1,36	171	72	1,42
AZ Sint-Maarten, Duffel	2009	30	21	1,70	28	24	1,86	58	45	1,78
Jan Yperman, Ieper	2010	30	69	3,29	58	53	1,92	88	121	2,38
OLV Ziekenhuis, Aalst-Asse	2009	22	83	4,77	31	136	5,39	53	219	5,13
UZ Gent	2010	91	68	1,75	111	98	1,88	202	166	1,82
ZH Maas en Kempen, Maaseik	2009	20	17	1,85	36	12	1,33	56	29	1,52
ZH Oost-Limburg, Genk	2008	44	27	1,61	81	32	1,40	126	77	1,61
Algemene Schattingsfactor EB				2,22			2,10			2,14

*De gemeenten die tot een bepaalde regio behoren, vindt men in bijlage

Tabel 6: Overzicht van PB-schattingsfactoren (SF) per instelling en jaar van kwaliteitscontrole (KC), en algemene PB-schattingsfactoren

Instelling/regio*	Jaar van KC	Man	Missing M	SF M	Vrouw	Missing V	SF V	Tot.	Missing tot.	SF tot.
AZ Glorieux, Ronse	2009	30	5	1,17	42	11	1,26	73	16	1,22
AZ Lokeren	2010	17	21	2,25	20	30	2,47	37	52	2,40
AZ Sint-Jan, Brugge	2010	67	36	1,54	104	43	1,41	171	79	1,46
AZ Sint-Maarten, Duffel	2009	30	21	1,70	28	24	1,86	58	45	1,78
Jan Yperman, Ieper	2010	30	71	3,37	58	56	1,97	88	127	2,44
OLV Ziekenhuis, Aalst-Asse	2009	22	83	4,77	28	136	5,86	53	232	5,38
UZ Gent	2010	91	68	1,8	111	86	1,8	202	156	1,8
ZH Maas en Kempen, Maaseik	2009	20	17	1,85	35	12	1,34	56	30	1,53
ZH Oost-Limburg, Genk	2008	44	28	1,64	86	36	1,42	131	72	1,55
Algemene Schattingsfactor PB				2,23			2,15			2,17

*De gemeenten die tot een bepaalde regio behoren, vindt men in bijlage

In UZ Gent, AZ Lokeren en Jan Yperman werden in 2010 kwaliteitscontroles uitgevoerd door de medewerkers van de EZO. In AZ Sint-Jan werd de kwaliteitscontrole uitgevoerd door personeelsleden van het ziekenhuis zelf. Op basis van deze kwaliteitscontroles werden de rates voor deze vier ziekenhuizen berekend. Voor de overige ziekenhuizen werd gebruik gemaakt van de algemene EB- en PB-schattingsfactoren.

Vergelijking IPEO-registraties en kwaliteitscontrole UZ Gent. Om na te gaan of de patiënten en bij wie geen IPEO werd afgenomen verschillen van degene bij wie wel een IPEO werd afgenomen, werden de IPEO-registraties uit het UZ Gent op verschillende variabelen vergeleken met de “missings” afkomstig uit de kwaliteitscontrole van het UZ Gent.

De IPEO-registraties verschilden significant van de “missings” wat betreft:

- leeftijd: wanneer patiënten in drie leeftijdscategorieën, met name jongeren (tot 19 jaar), volwassenen (20 tot 65 jaar) en ouderen (vanaf 65 jaar), worden onderverdeeld, blijkt dat er significant meer de “missings” (21,7%) dan IPEO-registraties (9,9%) tot de jongere leeftijdscategorie horen ($\chi^2(1) = 9,55$; $p < .01$) en dat de IPEO-registraties significant vaker in de leeftijdscategorie van de volwassenen voorkomen in vergelijking met de “missings” (86,1% vs. 73,9%; $\chi^2(1) = 8,54$; $p < .01$).
- woonsituatie: patiënten bij wie een IPEO werd afgenomen woonden significant vaker alleen dan de “missings” (37,7% vs. 25,8%; $\chi^2(1) = 4,68$; $p < .05$).
- burgerlijke staat: de “missings” (64,7%) waren significant vaker nooit gehuwd in vergelijking met de IPEO-registraties (50,8%; $\chi^2(1) = 6,68$; $p = .01$).
- economische toestand: de IPEO-registraties waren significant vaker werkloos dan de “missings” (22,8% vs. 12,0%; $\chi^2(1) = 4,67$; $p < .05$) en de missings waren in vergelijking met de IPEO-registraties significant vaker economisch inactief (57,6% vs. 38,0%; $\chi^2(1) = 9,5$; $p < .01$).
- economisch inactieve toestand: de “missings” waren significant vaker student in vergelijking met de IPEO-registraties (33,7% vs. 11,8%; $\chi^2(1) = 18,15$; $p < .001$).

Er was geen significant verschil tussen de IPEO-registraties en de “missings” qua geslacht, gebruikte methode en voorgeschiedenis van suïcidepogingen.

De significante verschillen tussen de IPEO-registraties en de “missings” lijken voor te vloeien uit het significant leeftijdsverschil tussen beide groepen. Jongeren die zich melden op spoed met een suïcidepoging werden vaker dan oudere leeftijdsgroepen niet geïnterviewd met behulp van het IPEO.

Deel 2: Persoonsgerelateerde gegevens

Geslacht en leeftijd

Onder de personen die in 2010 een suïcidepoging ondernamen, bevonden zich meer vrouwen (n = 989, 60,2%) dan mannen (n = 647, 39,4%). De huidige vrouw-man ratio bedraagt 1,5:1 en wordt in tabel 7 vergeleken met de geslachtsratio's van de voorgaande jaren.


Tabel 7: Overzicht vrouw-manratio 1999-2010

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Aantal vrouwen	404	380	341	462	371	449	334	322	403	473	617	647
Aantal mannen	284	251	215	294	207	287	274	197	288	294	410	989
V/M-ratio	1,4	1,5	1,6	1,6	1,8	1,6	1,2	1,6	1,4	1,6	1,5	1,5

In Figuur 5 wordt per leeftijdscategorie het aantal personen weergegeven dat één of meerdere suïcidepogingen ondernam in 2010. Het hoogste absolute aantal suïcidepogers vonden we terug in de leeftijdscategorie 45-49. Ongeveer één derde van de mannelijke (33,9%) en vrouwelijke suïcidepogers (34,2%) was tussen de 15 en 29 jaar oud.

De gemiddelde leeftijd van suïcidepogers in Vlaanderen was 37,8 jaar; voor mannen was dit 37,4 (min.: 14; max.: 85) en voor vrouwen 38,1 jaar (min.: 12; max.: 91).

Figuur 5: Leeftijdsverdeling van suïcidepogers volgens geslacht, 2010




Burgerlijke staat en woonsituatie

Uit de literatuur blijkt dat alleenstaanden, personen die gescheiden zijn en alleenwonenden een risicogroep vormen voor suïcidaal gedrag. Net zoals in de voorgaande jaren, met uitzondering van registratiejaar 2006, maakten ongehuwden in huidig onderzoek de grootste subgroep (41,2%) uit onder suïcidepogers die op een Vlaamse spoedopnamedienst worden aangemeld. Mannen waren significant vaker ongehuwd (46,8% vs. 37,6%; $\chi^2(1) = 12,47$; $p < .001$), terwijl vrouwen

vaker gehuwd (31,2% vs. 24,2%; $\chi^2(1) = 8,65$; $p < .01$) of weduwe (4,1% vs. 1,9%; $\chi^2(1) = 6,01$; $p < .05$) waren (zie figuur 6).

Figuur 6: Burgerlijke staat van suïcidepogers in Vlaanderen, volgens geslacht, 2010



*Significant geslachtsverschil ($p < .05$)


Mannen (36,9%) woonden significant vaker alleen dan vrouwen (24,1%) ($\chi^2(1) = 27,87$; $p < .001$). Meer dan de helft van de patiënten had kinderen. Vrouwen hadden echter significant vaker kinderen dan mannen (61,6% vs. 51,9%; $\chi^2(1) = 11,95$; $p = .001$). In 2009 was dit verschil niet significant.

Economische toestand

Patiënten die lager opgeleid zijn en (langdurig) werklozen vertonen een hogere kans op suïcidaal gedrag, zowel suïcidepogingen als suïcides. In Vlaanderen was 42,9% van de geregistreerde suïcidepogers werkend en was 18,2% werkloos. 38,9% was economisch inactief. Deze laatste groep bestond voornamelijk uit personen die invalide verklaard werden (40,2%) en studenten (35,2%). De overige 24,6% was economisch inactief omwille van pensioen.

Figuur 7 illustreert het significante verschil tussen mannen en vrouwen: mannelijke suïcidepogers werken vaker (48,5% vs. 39,2%; $\chi^2(1) = 11,49$; $p = .001$), en vrouwelijke suïcidepogers zijn vaker economisch inactief (42,9% vs. 32,8%; $\chi^2(1) = 14,38$; $p < .001$).

Figuur 7: Economische toestand van suïcidepogers in Vlaanderen volgens geslacht, 2010




*Significant geslachtsverschil ($p < .05$)

Psychiatrische behandeling in de voorgeschiedenis

Uit eerder onderzoek is gebleken dat veel suïcidale patiënten reeds in contact kwamen met psychiatrische hulpdiensten. Huidig onderzoek bevestigt dit: bijna de helft van de patiënten wiens voorgeschiedenis in kaart kon worden gebracht, werd reeds residentieel ($n = 400$; 40,5%) en/of ambulant ($n = 403$; 40,8%) behandeld. Bij 73 patiënten (7,4%) werd de huisarts vermeld in het kader van psychologische/psychiatrische begeleiding. 26,9% ($n = 266$) van de patiënten werd vóór de huidige suïcidepoging op geen enkele wijze psychiatrisch behandeld.

In figuur 8 wordt de psychiatrische behandeling in de voorgeschiedenis van de suïcidepogers grafisch weergegeven. Er waren significant meer vrouwen (44,7%) dan mannen (34,1%; $\chi^2(1) = 10,76$; $p = .001$) die vooraf aan de suïcidepoging een ambulante behandeling ontvingen. In 2009 werd geen significant geslachtsverschil gevonden wat betreft ambulante behandeling.

Figuur 8: Psychiatrische behandeling in de voorgeschiedenis van suïcidepogers in Vlaanderen volgens geslacht, 2010




*Significant geslachtsverschil ($p < .05$)

Voorgeschiedenis van suïcidaal gedrag

Wanneer de patiënt voorafgaand aan de huidige poging reeds een suïcidepoging ondernam, verhoogt dit de kans op een nieuwe poging. Hoe meer pogingen, hoe groter het risico. In huidig onderzoek werd bij ongeveer 80% van de geregistreerde suïcidepogers de voorgeschiedenis van suïcidaal gedrag in kaart gebracht. Voor iets minder dan de helft (44,3%) was dit de eerste suïcidepoging. Ongeveer een kwart van de suïcidepogers (25,4%) had reeds één eerdere poging ondernomen, 9,8% twee, 3,9% drie en 10,1% reeds vier of meer eerdere pogingen. 6,5% had één of meerdere voorgaande pogingen ondernomen, maar het was niet duidelijke hoeveel precies.

In figuur 9 wordt het aantal suïcidepogingen voorafgaand aan de huidige poging, weergegeven. Voor significant meer mannen (52,4%) dan vrouwen (39,4%; $\chi^2(1) = 21,21$; $p < .001$) was de huidige suïcidepoging hun eerste suïcidepoging. In 2009 werd geen significant geslachtsverschil gemeten. Wanneer gekeken wordt naar het aantal suïcidepogingen in de voorgeschiedenis, valt op dat significant meer vrouwen (12,5%) dan mannen (6,3%; $\chi^2(1) = 13,01$; $p < .001$) reeds vier of meer suïcidepogingen ondernomen hebben voorafgaand aan de huidige poging.

Figuur 9: Voorgeschiedenis van suïcidaal gedrag in Vlaanderen volgens geslacht, 2010



*Significant geslachtsverschil ($p < .05$)

Wanneer een patiënt reeds vroeger een suïcidepoging heeft ondernomen, is het belangrijk om na te gaan wanneer deze poging plaatsvond, want hoe korter de termijn van de voorgaande tot de huidige suïcidepoging, hoe acuter het gevaar op herhaald suïcidaal gedrag. Ongeveer de helft van de pogingen (49,7%) voorafgaand aan de huidige poging, werden gedurende het afgelopen jaar ondernomen. De overige pogingen vonden meer dan een jaar geleden plaats. Het tijdsinterval tussen de huidige en voorgaande suïcidepoging bleek niet significant verschillend te zijn qua geslacht.


Vier op vijf van de vorige pogingen werd medisch behandeld (79,8%). Dit gebeurde voornamelijk in een ziekenhuis (82,9%). 6,0% werd door de huisarts behandeld en 11,1% werd elders medisch behandeld (bijvoorbeeld in een psychiatrisch ziekenhuis). Bij 67,9% van de patiënten werd aangeduid dat de voorgaande poging ook “psychisch” behandeld werd. De aanwezigheid van een

medische en/of psychische behandeling bleek niet significant te verschillen volgens geslacht. Het voorgaande jaar was er wel een significant geslachtsverschil qua psychische behandeling.

Sociaal netwerk

Aangezien gebrek aan sociale steun het risico op een suïcidepoging vergroot, is het belangrijk om de omvang van het sociaal netwerk van een patiënt na te gaan. In figuur 10 wordt het sociale netwerk weergegeven. Sociale steun werd het vaakst door familie (57,6%) gegeven. Vrouwen gaven significant vaker dan mannen aan sociale steun te vinden bij hun partner (35,8% vs. 26,7%; $\chi^2(1) = 9,64$; $p < .01$). Dit significant geslachtsverschil was niet aanwezig in 2009.

Figuur 10: Sociaal netwerk bij suïcidepogers in Vlaanderen, volgens geslacht, 2010




*Significant geslachtsverschil ($p < .05$)

Alcohol- en middelenmisbruik

Bij 58,6% van de patiënten werd op basis van de CAGE-AID-vragenlijst, die onderdeel uitmaakt van het IPEO, een inschatting gemaakt van het alcohol- en/of middelenmisbruik van de patiënten. De CAGE-AID bestaat uit 4 vragen, met twee antwoordmogelijkheden “nee” of “ja”. Wanneer de patiënt één van de vier vragen positief beantwoordt, wordt dit gecodeerd als “mogelijke aanwezigheid van alcohol en/of drugmisbruik”. Wanneer de patiënt twee of meer van de vier vragen positief beantwoordt, wordt dit gecodeerd als “waarschijnlijk alcohol- en/of drugmisbruik”.

In de meerderheid van de gevallen (66,7%, $n = 642$) was er géén vermoeden van alcohol- of drugmisbruik. Bij 53 patiënten (5,5%) was er sprake van “mogelijk misbruik” en bij 267 patiënten (27,8%) was er sprake van “waarschijnlijk misbruik”. Figuur 11 illustreert de significante verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft alcohol- en/of middelenmisbruik. “Mogelijk misbruik” en “waarschijnlijk misbruik” kwamen significant vaker voor bij mannen (respectievelijk 8,0% vs. 4,1%; $\chi^2(1) = 6,61$; $p = .01$ en 38,2% vs. 21,3%; $\chi^2(1) = 31,8$; $p < .001$). Bij vrouwen was er significant vaker geen vermoeden van alcohol- of drugmisbruik dan bij mannen (74,6% vs. 53,7%; $\chi^2(1) = 43,6$; $p < .001$).

Figuur 11: Alcohol- en/of drugsmisbruik bij suïcidepogers in Vlaanderen volgens geslacht, 2010




Diagnose

Wanneer iemand suïcidaal gedrag stelt, zijn er zeer frequent psychiatrische stoornissen vast te stellen zoals angst- of stemmingsstoornissen. Uit de gegevens die gerapporteerd werden in het luik “Probleemomschrijving/diagnose” werd, indien mogelijk, een onderscheid gemaakt tussen een DSM As I-diagnose en een DSM As II-diagnose. Enkel de hoofddiagnoses werden genoteerd.

Bij 924 patiënten (56,2% van de totale steekproef) werd een probleembeschrijving geformuleerd. Bij ongeveer een kwart van de gevallen (27,8%) werd geen As I-diagnose vermeld. Wanneer wel een As I-diagnose werd geformuleerd, kwam een “stemmingsstoornis” ($n = 359$; 38,9%) als het vaakst voor. Het kan hierbij gaan om de diagnoses “depressieve episode”, “majeure depressieve stoornis”, “dysthyme stoornis” of “bipolaire stoornis”. Ook de “acute aanpassingsstoornis” ($n = 134$; 14,5%) werd frequent vermeld. Daarnaast werd in 8,0% van de gevallen “afhankelijk van een middel” of “misbruik van een middel” gediagnosticeerd, en in 5,1% van de gevallen werd “middelengebruik” gecombineerd met de diagnose “stemmingsstoornis”. Slechts in 5,7% van de gevallen vermeldde men een andere As I-diagnose. De DSM As-I diagnoses worden grafisch weergegeven in figuur 12. Significant meer vrouwen dan mannen kregen de diagnose “stemmingsstoornis” (41,4% vs. 34,3%; $\chi^2(1) = 4,56$; $p < .05$). Bij mannen werd significant vaker “afhankelijkheid van een middel” of “middelenmisbruik”, of een andere AS I-diagnose gediagnosticeerd dan bij vrouwen (respectievelijk 12,3% vs. 5,5%; $\chi^2(1) = 13,56$; $p < .001$ en 8,2% vs. 4,3%; $\chi^2(1) = 6,09$; $p < .05$).

Figuur 12: DSM AS I-diagnose bij suïcidepogers in Vlaanderen volgens geslacht, 2010




*Significant geslachtsverschil ($p < .05$)

Bij 289 van de 924 patiënten (31,3%) bij wie een probleemomschrijving werd vermeld, werd een As II-diagnose geformuleerd. Bij 90 van hen (9,7%) ging het om een “cluster B persoonlijkheidsstoornis”, voornamelijk de “borderline persoonlijkheidsstoornis”. Bij 25 personen, (2,7%) werd een andere As II-diagnose vermeld. Bij 174 patiënten (18,8%) werd de As II-diagnose uitgesteld of ging het om een persoonlijkheidsstoornis NAO.

Vrouwen werden significant vaker dan mannen gediagnosticeerd met een “cluster B persoonlijkheidsstoornis” (11,7% vs. 6,5%; $\chi^2(1) = 6,69$; $p = .01$). Vrouwen ontvingen ook vaker dan mannen een uitgesteld As II-diagnose of de diagnose persoonlijkheidsstoornis NAO (20,8% vs. 15,5%; $\chi^2(1) = 3,87$; $p < .05$). De geslachtsverschillen staan in onderstaande figuur.

Figuur 13: DSM As II-diagnose in Vlaanderen volgens geslacht, 2010




*Significant geslachtsverschil ($p < .05$)

Deel 3: Gebeurtenisgerelateerde gegevens

Situering in de tijd

Onderstaande figuur geeft het aantal registraties van suïcidepogingen per maand weer. Globaal werden de meeste suïcidepogingen in maart en oktober geregistreerd. Tijdens de maand april werd het minste aantal suïcidepogingen geregistreerd. Over de jaren heen zien we geen terugkerend patroon wat betreft het maandelijks voorkomen van suïcidepogingen.

Figuur 14: Maand van suïcidepoging, Vlaanderen, 2010



Wat het concrete tijdstip van de suïcidepoging² betreft, zien we, net zoals de voorgaande jaren, dat de meeste pogingen ondernomen werden tijdens de avond (37,0%) en de (na)middag (28,6%). 's Nachts (17,6%) en 's ochtends (16,8%) werden minder pogingen geregistreerd. Vrouwen in vergelijking met mannen, ondernamen significant vaker in de namiddag een poging (33,7% vs. 19,9%; $\chi^2(1) = 25,04$; $p < .001$). Dit geslachtsverschil trad niet op in 2009. Mannen in vergelijking met vrouwen, ondernamen significant vaker 's nachts een suïcidepoging (22,0% vs. 15,1%; $\chi^2(1) = 8,954$; $p < .01$).

Wanneer IPEO 2 werd afgenomen, werd er aan de hand van de Suicide Intent Scale (SIS) meer precieze informatie verkregen over het gekozen tijdstip: in 56,3% van de gevallen gaven de hulpverleners op basis van het verhaal van de patiënt aan dat het tijdstip van de suïcidepoging zodanig gekozen was dat interventie waarschijnlijk was, in 32,9% van de gevallen dat interventie van anderen onwaarschijnlijk was, en bij 10,8% werd aangegeven dat interventie zo goed als uitgesloten was. Wanneer mannelijke met vrouwelijke suïcidepogers vergeleken worden, blijkt dat vrouwen significant vaker het tijdstip kiezen zodat interventie waarschijnlijk is (59,9% vs. 50,1%; $\chi^2(1) = 9,24$; $p < .01$) en mannen kiezen significant vaker een tijdstip waarop interventie zo goed als onwaarschijnlijk is (14,8% vs. 8,6%; $\chi^2(1) = 9,55$; $p < .01$).


In 38,5% van de gevallen werd aangeduid dat de huidige suïcidepoging onderbroken was door derden. Er werden significant meer mannen (42,5%) onderbroken tijdens hun suïcidepoging in vergelijking met vrouwelijke suïcidepogers (36,0%; $\chi^2(1) = 6,02$; $p < .05$).

² Een poging die tijdens het eerste half uur (1-30 minuten) plaatsvond, werd bij het voorgaande uur gerekend. Een poging tijdens het laatste half uur (31-59 minuten) werd bij het volgende uur gerekend.

Aard van de poging

Methode. Net zoals voorgaande jaren was de meest gehanteerde methode ‘zelfvergiftiging’ (78,0%, n = 1294). 15,1% (n = 260) van de patiënten verwondde zichzelf, en slechts 6,3% (n = 105) hanteerde beide methodes. Significant meer vrouwen dan mannen vergiftigden zichzelf (85,1% vs. 66,6; $\chi^2(1) = 77,86$; $p < .001$) en significant meer mannen dan vrouwen verwondden zichzelf (24,7% vs. 10,1%; $\chi^2(1) = 63,6$; $p < .001$) of gebruikten beide methodes (8,7% vs. 4,9%; $\chi^2(1) = 9,66$; $p < .01$). De geslachtsverschillen worden in onderstaande figuur weergegeven.

Figuur 15: Methode van suïcidepoging, Vlaanderen, volgens geslacht, 2010



*Significant geslachtsverschil ($p < .05$)

Het merendeel van de personen die zichzelf vergiftigden, gebruikte als voornaamste methode benzodiazepines of andere sedatieven (69,4%; n = 898). De tweede meest gebruikte methode betrof medicatie uit de groep niet-narcotische analgetica/ antipyretica/ antireumatica (19,2%; n = 248).

Wanneer men zichzelf verwondde, deed men dit het vaakst door middel van een scherp voorwerp (34,6%; n = 90) of door verhangings (32,3%; n = 84). Andere methodes van zelfverwonding waren onder andere een sprong van een hoogte (13,5%; n = 35), verdrinking (9,6%; n = 25), veroorzaken van een verkeersongeval (5,8%; n = 15) of voor een bewegend voorwerp springen of liggen (5,4%; n = 14).

Alcoholinname tijdens suïcidepoging Bij de afname van het IPEO werd er ook telkens nagegaan of er alcohol werd gebruikt tijdens de suïcidepoging. 193 (29,7%) personen hadden alcohol ingenomen tijdens hun poging. Er waren significant meer mannen dan vrouwen die alcohol hadden gebruikt (35,5% vs. 26,2%; $\chi^2(1) = 16,26$; $p > .001$).

Omstandigheden. Bij 1061 patiënten werd via de Suicide Intent Scale (SIS) informatie bekomen over de precieze omstandigheden van een poging. Bij 1016 patiënten werd de volledige schaal ingevuld. Uit de gegevens blijkt dat in bijna één op twee gevallen (48,2%) niemand in de buurt was op het moment van de poging. Mannen zorgden er, in vergelijking met vrouwen,

significant vaker voor dat er niemand in de buurt was op het moment van de poging (54,4% vs. 45,2%; $\chi^2(1) = 7,66$; $p < .01$).

Bij 7,2% werden actieve maatregelen genomen om ontdekking te vermijden, terwijl de meerderheid geen (80,0%) of passieve maatregelen (12,8%) genomen had om ontdekking tegen te gaan. Vrouwen namen in vergelijking met mannen significant vaker geen voorzorgsmaatregelen om ontdekking tegen te gaan (82,3% vs. 75,9%; $\chi^2(1) = 6,24$; $p < .05$).

Meer dan de helft van de patiënten (53,3%) zocht geen contact met een mogelijke hulpverlener nadat hij/zij zichzelf vergiftigd en/of verwond had. 38,3% van de patiënten bracht na de poging een mogelijke hulpverlener hiervan expliciet op de hoogte, en de overige 8,4% contacteerde een hulpverlener, maar bracht hem/haar niet expliciet op de hoogte.

Slechts 39 personen hadden met het oog op de dood definitieve maatregelen genomen zoals het maken van een testament (3,7%). 73 patiënten (6,9%) namen meer beperkte maatregelen zoals het betalen van rekeningen. Het merendeel van de patiënten (89,4%) echter ondernam geen “laatste handelingen” toen ze besloten hadden zichzelf te verwonden en/of te vergiftigen. Vrouwen deden dit significant vaker in vergelijking met mannen (91,1% vs. 86,7%; $\chi^2(1) = 4,94$; $p < .05$).

Ongeveer één vijfde van de patiënten (22,8%) had één of meerdere afscheidsbrieven geschreven. 47 patiënten (4,5%) hadden dit overwogen, maar uiteindelijk niet gedaan, en de overige 765 patiënten (72,7%) hadden een afscheidsbrief noch overdacht, noch geschreven.

Wat betreft de mate van planning, zien we dat de suïcidepoging van slechts 102 patiënten (9,6%) uitvoerig was voorbereid. Mannen deden dit, in vergelijking met vrouwen, significant vaker (13,5% vs. 7,5%; $\chi^2(1) = 9,96$; $p < .01$). In bijna drie op tien gevallen (27,7%) was ze minimaal gepland, en bij iets meer dan zes op tien gevallen (62,7%) was ze helemaal niet voorbereid. Vrouwen hadden in vergelijking met mannen significant vaker niets voorbereid (65,3% vs. 58,1%; $\chi^2(1) = 5,37$; $p < .05$).

Bijna de helft van de patiënten had gedurende het afgelopen jaar ten opzichte van vrienden of familie impliciet (20,0%) of expliciet (22,1%) aangegeven dat hij/zij zichzelf iets zou aandoen. In de overige gevallen (57,9%) had de patiënt zich hierover op geen enkele manier uitgelaten.

Aanmelding. 16,9% van de aanmeldingen gebeurde (mede) op initiatief van de patiënt zelf. In bijna de helft van de gevallen (48,6%) was de dienst 100 betrokken bij de aanmelding in het ziekenhuis, en bij 9,4% was de politie betrokken. In één op tien van de gevallen was de patiënt door de huisarts of door een ander ziekenhuis doorverwezen naar de spoeddienst van één van de registrerende ziekenhuizen. Daarnaast werd de patiënt in circa één op drie gevallen (32,6%) (ook) door “anderen”, zoals verwanten, begeleiders, of toevallige passanten naar de spoeddienst begeleid. Bij mannen was, in vergelijking met vrouwen, de politie significant vaker betrokken bij de aanmelding (14,9% vs. 5,9%; $\chi^2(1) = 35,56$; $p < .001$) en bij vrouwen gebeurde de aanmelding in vergelijking met mannen significant vaker via de huisarts of een ander ziekenhuis (11,2% vs. 6,8%; $\chi^2(1) = 8,41$; $p < .01$).

Ernst letsel. Van alle suïcidepogingen die aan de hand van het IPEO geregistreerd werden, leverde de meerderheid geen (40,4%; $n = 580$), of een beperkt letsel (44,7%; $n = 642$) op. Bij de overige patiënten benoemde men het letsel ernstig (10,4%; $n = 149$), tot levensbedreigend (4,5%;


n = 65). Mannen hadden significant vaker ernstige letsels dan vrouwen (6,4% vs. 3,3%; $\chi^2(1) = 8,01$; $p < .01$).

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het hier mogelijks een onderschatting betreft van de ernstige en levensbedreigende letsels aangezien deze vaak patiënten vaak naar een somatische afdeling of IZ worden gebracht en waarbij het IPEO vaak niet kan worden afgenomen.

Gevoelens en suïcidaliteit na de poging

Gevoelens. Bij 644 patiënten werd door de hulpverleners nagegaan en opgeschreven hoe de patiënt zich voelde kort na de suïcidepoging. Deze gevoelens werden door de onderzoekers gecodeerd in verschillende categorieën (zie figuur 16). Bij 182 patiënten (16,9%) werd vermeld dat ze expliciet aangaven dat ze spijt hadden dat de poging mislukt was. 111 patiënten (10,3%) gaven expliciet aan blij te zijn dat de poging mislukt was. Bij 196 patiënten (18,2%) werden depressieve gevoelens vermeld, bij 39 patiënten (3,6%) overheerste kwaadheid en cynisme, bij 35 patiënten (3,3%) werden gevoelens van leegheid vermeld, en 52 patiënten (4,8%) voelden zich schuldig of schaamden zich over de poging. 39 (3,6%) patiënten waren angstig en onrustig. In de overige gevallen werd gemeld dat ze zich positief (4,8%), negatief (9,9%), rustig (1,5%) of emotioneel (9,4%) voelden. 5,7% gaf tegenstrijdige of ambivalente gevoelens aan, 1,8% minimaliseerde de suïcidepoging en 9,3% voelde zich versuft of was te versuft om een juiste inschatting te maken van de emoties. Bij 97 patiënten (9,0%) was het onmogelijk om de gerapporteerde emoties onder te brengen in bovengenoemde categorieën. Vrouwen gaven significant vaker aan zich schuldig/beschaamd (6,6% vs. 1,9%; $\chi^2(1) = 12,17$; $p < .001$), negatief (11,8% vs. 7,0%; $\chi^2(1) = 6,33$; $p < .05$) of emotioneel (11,2% vs. 6,6%; $\chi^2(1) = 6,34$; $p < .05$) te voelen na de poging in vergelijking met mannen.

Figuur 16: Gevoelens na de poging, Vlaanderen, 2010




Omdat een hoge mate van hopeloosheid geassocieerd is met een hoger risico op repetitief suïcidaal gedrag, gingen de hulpverleners bij de patiënten ook telkens de verwachtingen omtrent hun eigen toekomst na. Ook deze gevoelens werden door de onderzoekers achteraf, naargelang de voornaamste anticipaties, ingedeeld in drie categorieën: bijna de helft van de patiënten zag de

toekomst eerder negatief tegemoet (45,2%), meer dan één vierde zag de toekomst eerder positief tegemoet (28,5%) en ongeveer één vierde uitte zich ambivalent (26,3%). Er waren geen significante geslachtsverschillen wat betreft mate van hopeloosheid. Vorig jaar, daarentegen, waren mannen significant vaker positief over de toekomst dan vrouwen.

Suïcidaliteit. Het is belangrijk om zo snel mogelijk, dus gedurende IPEO 1, in te schatten of de patiënt thans nog suïcidale gedachten of plannen heeft. Het resultaat van deze bevraging werd genoteerd bij 1209 patiënten. In iets meer dan de helft van de gevallen (51,7%, n = 625) gaven de patiënten aan géén gedachten te hebben omtrent het opnieuw verwonden en/of beschadigen van zichzelf. 24,4% van de patiënten gaf aan zwakke gedachten te hebben hieromtrent, en bijna één vierde van de patiënten (23,9%) gaf aan matige tot sterke gedachten te hebben aan zelfverwonding of zelfbeschadiging. Mannen hadden in vergelijking met vrouwen significant vaker matige tot sterke gedachten aan zelfverwonding of zelfbeschadiging (27,9% vs. 21,6%; $\chi^2(1) = 6,07$; $p < .05$). In 2009 werd geen significant geslachtsverschil gemeten.

Omdat de intensiteit van de suïcidale ideatie snel kan wisselen, wordt aan de hulpverleners gevraagd om de aanwezigheid van suïcidegedachten opnieuw na te gaan gedurende IPEO 2. Dit gebeurde bij 930 patiënten. Het blijkt dat tijdens IPEO 2 gemiddeld iets minder gedachten aan zelfverwonding en/of -beschadiging gerapporteerd werden, in vergelijking met IPEO 1. 61,4% van de patiënten (n = 571) gaf aan géén gedachten te hebben omtrent het opnieuw verwonden van zichzelf, 19,8% had eerder zwakke gedachten, en 18,8% had matige tot sterke gedachten aan zelfbeschadiging (zie figuur 17). Er waren geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar daarentegen, hadden mannen significant vaker dan vrouwen geen gedachten over het zichzelf opnieuw verwonden en/of beschadigen en hadden vrouwen in vergelijking met mannen significant vaker zwakke gedachten.

Figuur 17: Suïcidale ideatie per IPEO 1 & 2, Vlaanderen, 2010




Bij de patiënten die aangeven suïcidale gedachten te hebben, werd ook steeds geacht de aanwezigheid van concrete plannen na te gaan. Tijdens IPEO 1 gaf meer dan de helft van deze patiënten (59,5%; n = 310) aan reeds nagedacht te hebben over hoe ze zichzelf zouden kunnen verwonden of beschadigen: 47,4% van de patiënten gaf aan reeds nagedacht te hebben over de methode die ze zouden gebruiken, evenwel zonder de details uit te werken. 12,1% had de details

reeds uitgewerkt en goed geformuleerd. Significant meer vrouwen dan mannen hadden nog niet nagedacht over hoe ze zichzelf zouden kunnen verwonden of beschadigen (44,9% vs. 33,2%; $\chi^2(1) = 6,97$; $p < .01$) en significant meer mannen dan vrouwen hadden de details reeds uitgewerkt en goed geformuleerd (15,8% vs. 9,9%; $\chi^2(1) = 4,01$; $p < .05$). In 2009 waren er geen significante geslachtsverschillen wat betreft de aanwezigheid van concrete plannen.

Tijdens IPEO 2 gaf meer dan de helft van deze patiënten (64,7%; $n = 229$) aan reeds nagedacht te hebben over hoe men zichzelf zou kunnen verwonden of beschadigen: 54,0% van de patiënten gaf aan reeds nagedacht te hebben over de methode die ze zouden gebruiken, evenwel zonder de details uit te werken. 10,7% had de details reeds uitgewerkt en goed geformuleerd. Er waren geen significante geslachtsverschillen. Vorig jaar daarentegen, gaven vrouwen significant vaker aan geen concrete plannen te hebben in vergelijking met mannen.

De cijfergegevens wat betreft de concreetheid van de suïcidale ideatie tijdens IPEO 1 en 2 worden weergegeven in onderstaande figuur.

Figuur 18: Mate waarin suïcidale ideatie concreet is, per IPEO 1 & 2, Vlaanderen, 2010



Ervaren problemen


Figuur 19 geeft per geslacht weer welke ervaren problemen de patiënten *spontaan* en *explíciet* rapporteerden. Relationele problemen (55,9%) en psychische klachten of psychiatrische symptomen (55%) werden het vaakst verwoord. De meerderheid van de patiënten gaf aan dat hun psychische klachten of psychiatrische symptomen reeds jaren (62,5%) of maanden (27,4%) aanwezig waren. Ook gevoelens van eenzaamheid werden frequent spontaan gemeld (39,3%). 32,9% verwees naar problemen met de ouders. Werkproblemen (30,1%), afwijzing door een geliefde (26,5%), problemen met kinderen (23,1%), problemen in het onderhouden van sociale relaties (22,5%) en financiële problemen (22%) werden ook vaak opgegeven.

Er waren enkele significante verschillen qua geslacht. Zo bleken vrouwen vaker dan mannen problemen met de kinderen (26,0% vs. 17,9%; $\chi^2(1) = 8,95$; $p < .01$) en/of psychische problemen (57,7% vs. 49,7%; $\chi^2(1) = 6,36$; $p < .05$) op te geven. Mannen noemden vaker dan

vrouwen een afwijzing door een geliefde (35,5% vs. 31,6%; $\chi^2(1) = 24,25$; $p < .001$), werkproblemen (35,4% vs. 26,9%; $\chi^2(1) = 8,41$; $p < .01$), problemen met justitie/politie (11,2% vs. 3,4%; $\chi^2(1) = 26,70$; $p < .001$), woonproblemen (14,3% vs. 9,0%; $\chi^2(1) = 7,24$; $p < .01$) en/of financiële problemen (26,6% vs. 19,5%; $\chi^2(1) = 7,19$; $p < .01$) op.

Omwille van hun sterke relatie met suïcidaal gedrag werd aan de hulpverleners aangeraden om, aanvullend op de *spontane* rapportage van de ervaren problemen, een aantal items standaard *expliciet* te bevragen. Bij 245 personen (23,1%) werden traumatische gebeurtenissen gerapporteerd. Bij 210 personen (19,7%) werd het overlijden of ernstige ziekte van een belangrijke ander aangegeven, en bij 111 personen (10,4%) werd vermeld dat een belangrijke ander reeds suïcidaal gedrag had gesteld. Enkel voor traumatische gebeurtenissen in de voorgeschiedenis werd een significant geslachtsverschil gevonden. Meer vrouwen (26,5%) rapporteerden een traumatische gebeurtenis in vergelijking met mannelijke pogers (16,8%; $\chi^2(1) = 19,14$; $p < .001$).

Figuur 19: Ervaren problemen per geslacht, Vlaanderen, 2010



*Significant geslachtsverschil ($p < .05$)


Motieven

Er werd aan de patiënten telkens een open vraag gesteld naar de beweegredenen voor hun suïcidepoging. Achteraf bracht de hulpverlener deze motieven zelf onder in de categorieën die in Figuur 20 worden weergegeven.

Het meest frequent gerapporteerde motief was “de situatie zo ondraaglijk vinden dat men niets anders wist te doen” (50,8%), onmiddellijk gevolgd door “willen sterven” (47,6%). Ook “weg willen uit een onmogelijke situatie” (39,2%) en “vreselijke gedachten” (25,0%) werden frequent aangevinkt. In de literatuur wordt aangegeven dat mensen met interne motieven (o.a. vreselijke gedachten, weg willen, ondraaglijke situatie) en met het doodsmotief “willen sterven” sterker geassocieerd worden met een risico op herval dan extrapunitieve motieven (o.a. liefde tonen, iemand bang maken).

Vrouwen gaven significant vaker dan mannen als motief “mensen spijt doen krijgen” (12,4% vs. 8,4%; $\chi^2(1) = 4,12$; $p = .05$) en/of “kwaad zijn op iemand en het hem/haar betaald willen zetten” (8,5% vs. 5,2%; $\chi^2(1) = 4,10$; $p < .05$) aan. Mannen gaven significant vaker dan vrouwen “willen sterven” (52,5% vs. 44,6%; $\chi^2(1) = 6,35$; $p = .05$) aan als motief.

Figuur 20: Motieven voor suïcidepoging per geslacht, Vlaanderen, 2010




Suïcidale intentie

De suïcidale intentie, de mate waarin de patiënt wenste te sterven op het moment van de poging, werd gemeten aan de hand van de ‘omstandigheden schaal’ van de Suicide Intent Scale (SIS) door te peilen naar de objectieve omstandigheden van de poging. Bij mannen spreekt men van een hoge suïcidale intentie wanneer de SIS-omstandighedenscore 5 of meer bedraagt, bij vrouwen wanneer deze score 6 of meer bedraagt. Zowel voor de mannen als voor de vrouwen was de mediaanscore 4. Op basis van de vastgelegde cut-offs voor mannen en vrouwen, was bij 57,0% van de mannen en 34,7% van de vrouwen sprake van een hoge suïcidale intentie. Dit geslachtsverschil bleek significant te zijn ($\chi^2(1) = 48,39$; $p < .001$).

Aanvullend op de ‘omstandigheden schaal’ werd ook één item uit de ‘zelf-rapportage schaal’ van de SIS bevroegd, om een inschatting te kunnen maken betreffende de ervaren ambivalentie ten opzichte van het leven tijdens de suïcidepoging. 46,5% van de patiënten gaf expliciet aan te willen sterven, ongeveer hetzelfde percentage als het cijfer dat gerapporteerd werd bij “ik wilde sterven” als motief in voorgaande paragraaf. 26,9% gaf aan dat het hem/haar niet kon schelen of hij/zij zou verder leven of sterven, en 26,6% gaf duidelijk aan *niet* te willen sterven. Zoals wordt weergegeven in onderstaande figuur waren er significant meer mannen dan vrouwen die expliciet aangaven dat ze wilden sterven (52,0% vs. 43,2%; $\chi^2(1) = 7,34$; $p < .01$). Vorig jaar daarentegen, waren er significant meer vrouwen dan mannen die dit meldden.

Figuur 21: Ambivalentie tov het leven per geslacht, Vlaanderen, 2010



*Significant geslachtsverschil ($p < .05$)

Zorgtraject

Bereidheid tot begeleiding. Wanneer tijdens IPEO 1 aan de patiënt gevraagd werd of men bereid was tot verdere begeleiding, gaf een grote meerderheid aan van wel ($n = 897$; 87,1%). 133 patiënten (12,9%) weigerden expliciet verdere professionele begeleiding binnen het ziekenhuis. Er was geen significant geslachtsverschil.

Zorgbehoeften. Uit eerder onderzoek blijkt dat de zorgbehoeften van de patiënt niet altijd overeen komen met het zorgaanbod van de hulpverleners. Om de patiënt te kunnen engageren in het hulpaanbod is het echter zeer belangrijk beide visies op elkaar af te stemmen. Een expliciete bevraging van de zorgbehoeften van de patiënt is dus noodzakelijk.

Tijdens IPEO 2 werden de zorgbehoeften na het ontslag op de spoeddienst bij 858 patiënten geregistreerd. Wanneer door de hulpverlener werd geregistreerd welke vorm van professionele hulpverlening (ambulant of residentieel) de patiënt verwachtte, werd dit achteraf door de onderzoekers gecodeerd als “zorgbehoeften op vormelijk niveau”. Wanneer werd geregistreerd rond welke probleemgebieden de patiënt wenste te werken, werd dit geregistreerd als “zorgbehoeften op inhoudelijk niveau”.

214 patiënten (24,9%) formuleerden zelf noch een vormelijke, noch een inhoudelijke zorgbehoefte. Bij 350 (40,8%) patiënten werd enkel een vormelijke zorgbehoefte opgetekend en bij 167 (19,5%) louter een inhoudelijke. 127 patiënten (14,8%) formuleerden zowel vormelijke als inhoudelijke zorgbehoeften. Vrouwen gaven significant vaker dan mannen een vormelijke zorgbehoefte op (43,8% vs. 35,7%; $\chi^2(1) = 5,33$; $p < .05$). Mannelijke suïcidepogers gaven significant vaker dan vrouwelijke suïcidepogers zowel een vormelijke als een inhoudelijke zorgbehoefte op (19,8% vs. 11,9%; $\chi^2(1) = 9,91$; $p < .01$).

Van de patiënten bij wie de nood aan professionele hulp geregistreerd werden, gaf 44,2% aan ambulante begeleiding te wensen, 42,8% residentiële begeleiding en 7,3% ondersteuning door een huisarts. 11,5% van de patiënten was onbeslist over de vorm van de gewenste behandeling.

Van de patiënten die inhoudelijke zorgbehoeften hadden, formuleerde 51,4% duidelijke intrapersoonlijke hulpbehoeften (zoals werken aan zelfbeeld, afhankelijkheidsprobleem en/of depressie) en 24,1% interpersoonlijke hulpbehoeften (zoals relatieproblemen en/of

psychiatrische problematiek partner). 21,4% van de patiënten wenste vooral praktische ondersteuning (zoals hulp bij financiële problemen en/of huisvestingsproblemen). Tenslotte vermeldden 22,8% van de patiënten geen duidelijke probleemgebieden, zij gaven aan vooral te verlangen naar “rust” (tijdens de verdere behandeling). Mannen vroegen in vergelijking met vrouwen significant vaker hulp bij intrapersoonlijke (22,4% vs. 15,7%; $\chi^2(1) = 5,99$; $p < .05$) en praktische problemen (10,4% vs. 6,0%; $\chi^2(1) = 5,36$; $p < .05$).

Behandelp lan na spoedopname. Er werd aan de hulpverleners gevraagd om het zorgtraject dat de patiënt zal volgen of reeds gevolgd heeft na ontslag op de spoedopname, zo volledig mogelijk te registreren. Wanneer IPEO 2 bijvoorbeeld op de afdeling urgentiepsychiatrie werd afgenomen, en men daarna besloot tot opname op een PAAZ afdeling, werden beide opties aangevinkt.


Het zorgtraject werd geregistreerd bij 1249 patiënten (72,6% van de totale groep).

Bij 114 patiënten (9,1%) werd aangeduid dat na het ontslag op de algemene spoeddienst of op de urgentiepsychiatrische spoeddienst géén zorgtraject voorzien werd. Bij 75 patiënten ging het om een ontslag op advies, bij 24 om een ontslag op tegenadvies en 12 patiënten gingen terug naar hun begeleidingsdienst (zoals een MPI of een gevangenis). Van 3 patiënten werd niet geregistreerd welk type ontslag het betrof.

Bij 367 patiënten (29,4%) werd een ambulante zorgtraject voorgesteld. 846 patiënten (67,7%) werden residentieel behandeld na hun aanmelding op de spoeddienst: 361 patiënten (28,9% van de totale groep) verbleef minstens één nacht op een urgentiepsychiatrische dienst, 174 patiënten (13,9%) werden doorverwezen naar een psychiatrisch ziekenhuis, en 348 patiënten (27,9%) naar een PAAZ dienst. 12,2% ($n = 152$) van de patiënten verbleef op een somatische afdeling.

In figuur 22 wordt het zorgtraject per geslacht gedetailleerd weergegeven. Vrouwelijke patiënten ontvingen significant vaker een ambulante behandeling in vergelijking met mannelijke patiënten (32,1% vs. 24,8%; $\chi^2(1) = 7,41$; $p < .01$). Mannelijke patiënten ontvingen in vergelijking met vrouwelijke patiënten vaker een residentiele behandeling (71,9% vs. 65,3%; $\chi^2(1) = 5,86$; $p < .05$). In 2009 waren er geen significante geslachtsverschillen qua zorgtraject.

Figuur 22: Zorgtraject na ontslag op spoed per geslacht, Vlaanderen, 2010



*Significant geslachtsverschil ($p < .05$)

In de overzichtstabel waarin de resultaten voor elk ziekenhuis apart behandeld worden, kan er vastgesteld worden dat het zorgtraject sterk kan verschillen naargelang het ziekenhuis waarnaar men verwezen wordt. UZ Gent, AZ Groeninge, UZ Leuven, AZ Sint-Jan en ZH Oost-Limburg werken namelijk met een urgentiepsychiatrische spoeddienst terwijl overige ziekenhuizen zonder eigen urgentiepsychiatrische spoeddienst werken.

Samenvatting van de voornaamste trends en aanbevelingen

- In 2010 bedroeg de event-based rate voor suïcidepogingen in Vlaanderen 153/100.000. Dit betekent een niet-significante daling van 7,3% ten opzichte van 2009. De person-based rate bedroeg 150/100.000, een niet-significante daling van 6,3% ten opzichte van 2009.
- De event/person ratio was in 2010 1,02:1, gelijkaardig aan de voorgaande jaren.
- De vrouw-man ratio bedroeg 1,5:1. Deze is gelijk gebleven ten opzichte van 2009.
- Het hoogste absolute aantal suïcidepogers was tussen de 45 en 49 jaar oud. Ongeveer één derde van de mannelijke (33,9%) en vrouwelijke suïcidepogers (34,2%) was tussen de 15 en 29 jaar.
- Meer dan één op twee van de aangemelde suïcidepogers (55,7%) had reeds één of meerdere suïcidepogingen ondernomen in het verleden. Ongeveer de helft van hen (49,7%) ondernam een poging gedurende het afgelopen jaar.
- Bijna de helft van de suïcidepogers (48,3%) had ten tijde van IPEO 1 zwakke tot sterke gedachten om zichzelf opnieuw te verwonden of beschadigen. Meer dan de helft van hen (59,5%) gaf aan reeds te hebben nagedacht over hoe ze zichzelf zouden kunnen verwonden of beschadigen. Ongeveer één tiende (12,1%) rapporteerde hieromtrent gedetailleerde plannen. Tijdens IPEO 2 rapporteerde nog bijna vier op tien patiënten (38,6%) gedachten aan zelfbeschadiging. Meer dan de helft van hen (54,0%) had reeds nagedacht over de manier waarop, evenwel zonder de details uit te werken. Eén op tien (10,7%) had de details echter reeds uitgewerkt en goed geformuleerd.
- Bijna één op vier van de patiënten (38,9%) bij wie een probleemomschrijving werd geformuleerd, kreeg de DSM As I-diagnose “stemmingsstoornis”. Significant meer vrouwen (41,4%) dan mannen (34,3%) ontvingen deze diagnose. Bij 31,3% van de patiënten werd een (uitgestelde) As II-diagnose geformuleerd.
- Bijna de helft van de patiënten bij wie de psychiatrische behandeling in de voorgeschiedenis in kaart werd gebracht, ontving reeds een residentiële (40,5%) en/of ambulante behandeling (40,8%). Slechts één op vier (26,9%) was nog nooit psychiatrisch behandeld voorafgaand aan de suïcidepoging.
 - *Voorgaande cijfers wijzen op het belang van een gespecialiseerde opvang van suïcidepogers om suïcidaal gedrag in de toekomst te vermijden. Het IPEO biedt richtlijnen voor deze opvang, en wil voor de algemene ziekenhuizen een belangrijke stimulans zijn om de zorg voor suïcidepogers als een structureel, specifiek onderdeel in hun beleid te integreren. Deze integratie vergt een proces van kennisontwikkeling binnen het ziekenhuis en een langdurige samenwerking tussen verschillende interne en externe diensten. Dit proces is essentieel om het IPEO optimaal te laten renderen.*
- Meer dan drie op vier suïcidepogingen (78,0%) gebeurden aan de hand van zelfvergiftiging (voornamelijk door middel van benzodiazepines of andere sedatieven), 15,1% van de suïcidepogingen gebeurde door middel van zelfverwonding (voornamelijk door middel van een scherp voorwerp of verhangings), en 8,7% gebeurde door een combinatie van zelfverwonding en zelfvergiftiging. Tijdens ongeveer één derde (29,7%)

van de suïcidepogingen werd er alcohol ingenomen. Dit gebeurde significant vaker bij mannen (35,5%) dan vrouwen (26,2%).

→ *In het verleden is reeds herhaaldelijk gebleken dat maatregelen die de beschikbaarheid van middelen verminderen, zoals bijvoorbeeld de beveiliging van hoge gebouwen en bruggen, een preventief effect hebben op suïcidaal gedrag. In Vlaanderen lijkt de controle op de verkrijgbaarheid van medicatie een belangrijke preventieve maatregel.*

- De meerderheid van de suïcidepogingen leverde geen (40,4%) of een beperkt lichamelijk letsel (44,7%) op. De overige letsels werden als ernstig (10,4%), of levensbedreigend (4,5%) benoemd.

→ *Op basis van de feedback die we van de deelnemende ziekenhuizen kregen, vermoeden we dat deze cijfers een onderschatting zijn van het werkelijke aantal levensbedreigende letsels na een suïcidepoging. De patiënten die onmiddellijk na hun suïcidepoging op de Afdeling Intensieve Zorgen opgenomen werden, werden immers minder vaak bevraagd aan de hand van het IPEO in vergelijking met de patiënten die enige tijd op de (urgentiepsychiatrische) spoedafdeling verbleven. Dit impliceert dat ook het zorgtraject van patiënten met een ernstig of levensbedreigend letsel minder nauwkeurig in kaart werd gebracht. Om de kenmerken van deze patiënten en de aan hen aangeboden nazorg in kaart te brengen is verder onderzoek noodzakelijk.*

- De grootste subgroep van de suïcidepogers was ongehuwd (41,2%). Significant meer mannen woonden alleen (36,9%) ten tijde van de suïcidepoging in vergelijking met vrouwen (24,1%).
- Het merendeel van de suïcidepogers behoorden tot het economisch inactieve deel van de bevolking (42,9%), of was werkloos (18,2%); wat overeenkomt met de bevindingen van voorgaande jaren.
- Bij ongeveer één derde van de patiënten was er, op basis van de CAGE-AID, sprake van “mogelijk alcohol- en/of middelenmisbruik” (5,5%) of “waarschijnlijk misbruik” (27,8%). “Mogelijk misbruik” en “waarschijnlijk misbruik” kwamen significant vaker voor bij mannen (8,0% en 38,2%) dan bij vrouwen (4,1% en 21,3%).
- Bijna één vierde van de patiënten (23,1%) rapporteerde een traumatische gebeurtenis als ervaren probleem wanneer dit expliciet bevraagd werd. Meer vrouwen (26,5%) dan mannen (16,8%) rapporteerden dit.

- Wanneer gevraagd wordt naar de motieven voor de suïcidepoging, geeft de meerderheid van de patiënten een intern motief aan en bijna de helft geeft doodswens aan als motief.

→ *Voorgaande cijfers wijzen op een aantal risicofactoren voor het ondernemen van een suïcidepoging. Interventies die zich richten op risicofactoren of risicogroepen kunnen bijdragen aan de vermindering van suïcidaliteit. Suïcidaliteit komt meer voor bij jongeren en volwassenen die in verschillende opzichten kwetsbaar zijn, en om een risico-inschatting te maken van de aard en de ernst van de suïcidaliteit dienen combinaties van risicofactoren gemaakt te worden. Verder onderzoek is nodig om na te gaan onder welke omstandigheden of door welke oorzaken gedachten aan suïcide ook in plannen en daden worden omgezet.*

- Slechts één op tien patiënten (9,1%) werd vanuit de spoeddienst niet doorverwezen voor verdere behandeling. Bij de overige patiënten werd een residentieel en/of een ambulante

zorgtraject geregistreerd: ongeveer één derde van de patiënten (67,7%) werd doorverwezen voor residentiële behandeling na de poging en bij drie op tien patiënten (29,4%) werd ambulante zorg voorgesteld. Het zorgtraject van de suïcidepoging verschilt naar gelang de aanwezigheid van een urgentiepsychiatrische spoeddienst.

- Patiënten uit het UZ Gent bij wie geen IPEO werd afgenomen (“missings”) in vergelijking met patiënten bij wie wel een IPEO werd afgenomen (IPEO-registraties) verschilden significant qua leeftijd. De “missings” waren significant jonger dan de de IPEO-registraties.

→ *Deze cijfergegevens wijzen duidelijk op een nood aan de implementatie van een gelijkaardig interview als het IPEO voor kinderen en jongeren die zich melden op de spoed naar aanleiding van een suïcidepoging. Op vraag van kinderpsychiaters en spoedpersoneel en in opdracht van het Vlaamse Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werd in 2010 het Instrument voor Psychosociale Evaluatie en Opvang van suïcidepogers (Kinderen en jongeren, KIPEO) ontwikkeld. Er wordt verwacht dat het in 2011 geïmplementeerd zal worden in de registrerende ziekenhuizen.*

Overzichtstabel

In de overzichtstabel van de zesentwintig registrerende ziekenhuizen staat alle kenmerken van de suïcidepogers en de suïcidepogingen beschreven per ziekenhuis. De ziekenhuizen staan in alfabetische volgorde. Een plus (†) naast de naam van een ziekenhuis wijst erop dat het geslacht van één of meerdere patiënten onbekend was waardoor de totale frequentie van een variabele kan verschillen van de som van de frequenties van beide geslachten. Een asterisk (*) naast een percentage wijst op een significant geslachtsverschil ($p < .05$).

	AZ Damiaan						AZ Glorieux ⁺						AZ Groeninge ⁺					
	Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Rates																		
PB	8	38,1%	13	61,9%	21	100,0%	20	37,7%	32	60,4%	53	100,0%	27	62,8%	15	34,9%	43	100,0%
EB	8	36,4%	14	63,6%	22	100,0%	20	36,4%	34	61,8%	55	100,0%	28	63,6%	15	34,1%	44	100,0%
PB factoren																		
Gemiddelde leeftijd	44,9		32,3		37,1		39,2		39,6		39,4		31,8		34,8		32,8	
Woonsituatie																		
<i>Alleen</i>	3	50,0%	1	9,1%	4	23,5%	6	31,6%	8	28,6%	14	29,8%	4	16,0%	5	33,3%	9	22,0%
<i>Niet alleen</i>	3	50,0%	10	90,9%	13	76,5%	13	68,4%	20	71,4%	33	70,2%	21	84,0%	10	66,7%	32	78,0%
Burgerlijke staat																		
<i>Nooit gehuwd</i>	1	16,7%	6	60,0%	7	43,8%	6	33,3%	6	23,1%	12	27,3%	13	50,0%	5	33,3%	18	43,9%
<i>Gehuwd</i>	3	50,0%	2	20,0%	5	31,2%	4	22,2%	12	46,2%	16	36,4%	6	23,1%	6	40,0%	12	29,3%
<i>Weduwe(naar)</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Gescheiden</i>	1	16,7%	2	20,0%	3	18,8%	3	16,7%	5	19,2%	8	18,2%	4	15,4%	3	20,0%	7	17,1%
<i>Officieel samenwonend</i>	1	16,7%	0	0,0%	1	6,3%	5	27,8%	3	11,5%	8	18,2%	3	11,5%	1	6,7%	4	9,8%
Kinderen																		
<i>Ja</i>	3	50,0%	4	36,4%	7	41,2%	9	56,3%	19	76,0%	28	68,3%	13	54,2%	8	53,3%	21	53,8%
<i>Nee</i>	3	50,0%	7	63,6%	10	58,8%	7	43,8%	6	24,0%	13	31,7%	11	45,8%	7	46,7%	18	46,2%
Economische toestand																		
<i>Werkend</i>	5	83,3%	5	45,5%	10	58,8%	6	35,3%	10	41,7%	16	39,0%	18	72,0%*	5	33,3%*	23	57,5%
<i>Werkloos</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	7	41,2%	3	12,5%	10	24,4%	0	0,0%	2	13,3%	2	5,0%
<i>Economisch inactief</i>	4	16,7%	6	54,5%	7	41,2%	4	23,5%	11	45,8%	15	36,6%	7	28,0%	8	53,3%	15	37,5%
<i>Student</i>	0	0,0%	3	50,0%	3	42,9%	2	50,0%	3	30,0%	5	35,7%	4	57,1%	2	28,6%	6	42,9%
<i>Invalide</i>	0	0,0%	2	33,3%	2	28,6%	1	25,0%	5	50,0%	6	42,9%	2	28,6%*	5	71,4%*	7	50,0%
<i>Gepensioneerd</i>	1	100,0%	1	16,7%	2	28,6%	1	25,0%	2	20,0%	3	21,4%	1	14,3%	0	0,0%	1	7,1%
Psychiatrische behandeling in voorgeschiedenis																		
<i>Geen</i>	1	20,0%	2	25,0%	3	23,1%	2	50,0%	3	30,0%	5	35,7%	5	29,4%	1	8,3%	6	20,0%
<i>Huisarts</i>	2	40,0%	2	25,0%	4	30,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Ambulante behandeling</i>	2	40,0%	3	37,5%	5	38,5%	1	25,0%	4	40,0%	5	35,7%	5	29,4%	7	58,3%	12	40,0%
<i>Residentiële behandeling</i>	3	60,0%	3	37,5%	6	46,2%	2	50,0%	5	50,0%	7	50,0%	10	58,8%	7	58,3%	18	60,0%
Sociaal netwerk																		
<i>Niemand</i>	2	33,3%	0	0,0%	2	11,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	8,7%	1	7,1%	3	7,9%
<i>Partner</i>	2	33,3%	6	54,5%	8	47,1%	2	28,6%	3	30,0%	5	29,4%	8	34,8%	6	42,9%	15	39,5%
<i>Familie</i>	1	16,7%*	8	72,7%*	9	52,9%	4	57,1%	5	50,0%	9	52,9%	16	69,6%	12	85,7%	29	76,3%
<i>Vriend(in)</i>	2	33,3%	6	54,5%	8	47,1%	1	14,3%	6	60,0%	7	41,2%	5	21,7%	1	7,1%	6	15,8%
<i>Andere</i>	1	16,7%	3	27,3%	4	23,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	8,7%	1	7,1%	3	7,9%

	AZ Damiaan						AZ Glorieux ⁺						AZ Groeninge ⁺					
	Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Voorgeschiedenis van suïcidaal gedrag																		
<i>Geen</i>	2	33,3%	5	45,5%	7	41,2%	6	50,0%	6	35,3%	12	40,0%	17	65,4%	6	40,0%	24	57,1%
<i>1</i>	2	33,3%	3	27,3%	5	29,4%	4	33,3%	4	23,5%	8	26,7%	5	19,2%	4	26,7%	9	21,4%
<i>2</i>	0	0,0%	1	9,1%	1	5,9%	0	0,0%	1	5,9%	2	6,7%	0	0,0%	3	20,0%	3	7,1%
<i>3</i>	1	16,7%	0	0,0%	1	5,9%	0	0,0%	1	5,9%	1	3,3%	3	11,5%	0	0,0%	3	7,1%
<i>4 of meerdere</i>	1	16,7%	2	18,2%	3	17,6%	1	8,3%	4	23,5%	5	16,7%	0	0,0%	2	13,3%	2	4,8%
<i>Meerdere, aantal onbekend</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	8,3%	1	5,9%	2	6,7%	1	3,8%	0	0,0%	1	2,4%
Tijdsinterval tussen suicidepogingen																		
<i>< 12 maanden</i>	2	50,0%	4	66,7%	6	60,0%	3	50,0%	5	45,5%	9	50,0%	1	12,5%	1	11,1%	2	11,8%
<i>>12 maanden</i>	2	50,0%	2	33,3%	4	40,0%	3	50,0%	6	54,5%	9	50,0%	7	87,5%	8	88,9%	15	88,2%
Medische behandeling																		
<i>Ja</i>	4	100,0%	6	100,0%	10	100,0%	2	40,0%*	10	100,0%*	12	80,0%	7	77,8%	7	77,8%	14	77,8%
<i>Ziekenhuis</i>	4	100,0%	5	83,3%	9	90,0%	0	0,0%*	10	100,0%*	10	83,3%	6	100,0%	7	100,0%	13	100,0%
<i>Huisarts</i>	0	0,0%	1	16,7%	1	10,0%	0	0,0%*	0	0,0%*	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Andere</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	100,0%*	0	0,0%*	2	16,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Nee</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	60,0%*	0	0,0%*	3	20,0%	2	22,2%	2	22,2%	4	22,2%
Psychische behandeling																		
<i>Ja</i>	2	50,0%	4	66,7%	6	60,0%	2	50,0%	8	100,0%	10	83,3%	5	55,6%	6	66,7%	11	61,1%
<i>Nee</i>	2	50,0%	2	33,3%	4	40,0%	2	50,0%	0	0,0%	2	16,7%	4	44,4%	3	33,3%	7	38,9%
Alcohol- en middelenmisbruik																		
<i>Geen vermoeden</i>	3	50,0%	6	66,7%	9	60,0%	5	55,6%	11	61,1%	16	59,3%	9	47,4%	3	75,0%	12	50,0%
<i>Mogelijk misbruik</i>	1	16,7%	1	11,1%	2	13,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	10,5%	0	0,0%	2	8,3%
<i>Waarschijnlijk misbruik</i>	2	33,3%	2	22,2%	4	26,7%	4	44,4%	7	38,9%	11	40,7%	8	42,1%	1	25,0%	10	41,7%
As I diagnose																		
<i>Geen AS I diagnose geformuleerd</i>	0	0,0%	1	16,7%	1	9,1%	0	0,0%	1	9,1%	1	6,3%	1	6,7%	0	0,0%	1	4,5%
<i>Stemmingsst.</i>	1	20,0%	0	0,0%	1	9,1%	4	80,0%	7	63,6%	11	68,8%	5	33,3%	3	50,0%	9	40,9%
<i>Middelenmisbruik</i>	1	20,0%	1	16,7%	2	18,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Stemming + middelenmisbruik</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	9,1%	1	6,3%	1	6,7%	0	0,0%	1	4,5%
<i>Acute aanpassingsstoornis</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	20,0%	0	0,0%	1	6,3%	4	26,7%	2	33,3%	6	27,3%
<i>Andere</i>	1	20,0%	3	50,0%	4	36,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Enkel probleembeschrijving</i>	2	40,0%	1	16,7%	3	27,3%	0	0,0%	2	18,2%	2	12,5%	4	26,7%	1	16,7%	5	22,7%
As II diagnose																		
<i>Geen AS II diagnose geformuleerd</i>	5	100,0%	3	50,0%	8	72,7%	5	100,0%	9	81,8%	14	87,5%	12	80,0%	6	100,0%	19	86,4%
<i>Cluster B</i>	0	0,0%	3	50,0%	3	27,3%	0	0,0%	1	9,1%	1	6,3%	2	13,3%	0	0,0%	2	9,1%
<i>Andere</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	6,7%	0	0,0%	1	4,5%
<i>Uitgesteld</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	9,1%	1	6,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

	AZ Damiaan						AZ Glorieux ⁺						AZ Groeninge ⁺						
	Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal		
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
EB factoren																			
Situering in de tijd																			
Maand van suïcidepoging																			
<i>Januari</i>							1	5,3%	4	13,8%	5	10,2%							
<i>Februari</i>							2	10,5%	4	13,8%	6	12,2%							
<i>Maart</i>							2	10,5%	5	17,2%	7	14,3%							
<i>April</i>							1	5,3%	1	3,4%	2	4,1%							
<i>Mei</i>	1	14,3%	3	21,4%	4	19,0%	3	15,8%	2	6,9%	5	10,2%							
<i>Juni</i>	2	28,6%	4	28,6%	6	28,6%	2	10,5%	1	3,4%	3	6,1%							
<i>Juli</i>	0	0,0%	1	7,1%	1	4,8%	1	5,3%	3	10,3%	5	10,2%	3	11,1%	1	7,1%	4	9,8%	
<i>Augustus</i>	1	14,3%	1	7,1%	2	9,5%	3	15,8%	3	10,3%	6	12,2%	2	7,4%	3	21,4%	5	12,2%	
<i>September</i>	0	0,0%	2	14,3%	2	9,5%	0	0,0%	1	3,4%	1	2,0%	8	29,6%	1	7,1%	9	22,0%	
<i>Oktober</i>	1	14,3%	2	14,3%	3	14,3%	2	10,5%	2	6,9%	4	8,2%	6	22,2%	8	57,1%	14	34,1%	
<i>November</i>	2	28,6%	0	0,0%	2	9,5%	1	5,3%	2	6,9%	3	6,1%	6	22,2%	1	7,1%	7	17,1%	
<i>December</i>	0	0,0%	1	7,1%	1	4,8%	1	5,3%	1	3,4%	2	4,1%	2	7,4%	0	0,0%	2	4,9%	
Tijdstip van suïcidepoging																			
<i>Ochtend</i>	1	20,0%	1	14,3%	2	16,7%	1	7,1%	6	30,0%	7	20,0%	2	11,8%	0	0,0%	2	7,1%	
<i>(Na)middag</i>	1	20,0%	2	28,6%	3	25,0%	3	21,4%	7	35,0%	11	31,4%	5	29,4%	9	81,8%	14	50,0%	
<i>Avond</i>	1	20,0%	2	28,6%	3	25,0%	7	50,0%	6	30,0%	13	37,1%	9	52,9%	2	18,2%	11	39,3%	
<i>Nacht</i>	2	40,0%	2	28,6%	4	33,3%	3	21,4%	1	5,0%	4	11,4%	1	5,9%	0	0,0%	1	3,6%	
Methode																			
<i>Zelfvergiftiging</i>	4	57,1%	11	78,6%	15	71,4%	11	55,5%*	33	97,1%*	45	81,8%	18	66,7%*	15	100,0%*	34	79,1%	
<i>Zelfverwonding</i>	3	42,9%	2	14,3%	5	23,8%	8	40,0%*	1	2,9%*	9	16,4%	6	22,2%*	0	0,0%*	6	14,0%	
<i>Combinatie zelfvergiftiging en -verwonding</i>	0	0,0%	1	7,1%	1	4,8%	1	5,0%	0	0,0%	1	1,8%	3	11,1%	0	0,0%	3	7,0%	
Alcoholinname tijdens poging																			
	2	28,6%	3	21,4%	5	23,8%	5	25,0%	9	26,5%	14	25,5%	12	44,4%	8	53,3%	20	46,5%	
Ernst letsel																			
<i>Geen</i>	4	57,1%*	1	7,1%*	5	23,8%	4	23,5%	7	26,9%	12	27,3%	11	40,7%	9	64,3%	20	47,6%	
<i>Beperkt</i>	3	42,9%	11	78,6%	14	66,7%	9	52,9%	12	46,2%	21	47,7%	11	40,7%	3	21,4%	15	35,7%	
<i>Ernstig</i>	0	0,0%	2	14,3%	2	9,5%	3	17,6%	6	23,1%	9	20,5%	2	7,4%	1	7,1%	3	7,1%	
<i>Levensbedreigend</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	5,9%	1	3,8%	2	4,5%	3	11,1%	1	7,1%	4	9,5%	
Aanmelding																			
<i>Op eigen initiatief</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	16,7%	2	6,9%	5	10,4%	7	25,9%	3	20,0%	11	25,6%	
<i>Via 100</i>	3	37,5%	10	71,4%	13	59,1%	9	50,0%	19	65,5%	29	60,4%	12	44,4%	8	53,3%	20	46,5%	
<i>Via politie</i>	4	50,0%*	0	0,0%*	4	18,2%	3	16,7%	2	6,9%	5	10,4%	4	14,8%	2	13,3%	6	14,0%	
<i>Via huisarts/ vernijsbrief</i>	1	12,5%	2	14,3%	3	13,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	3,7%	1	6,7%	2	4,7%	
<i>Via andere(n)</i>	1	12,5%	3	21,4%	4	18,2%	6	33,3%	7	24,1%	13	27,1%	6	22,2%	3	20,0%	9	20,9%	
Poging onderbroken																			
	5	71,4%	7	53,8%	12	60,0%	11	61,1%	16	59,3%	27	58,7%	17	63,0%	8	53,3%	25	58,1%	

	AZ Damiaan						AZ Glorieux ⁺						AZ Groeninge ⁺					
	Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Suïcidale gedachten na de poging																		
IPEO 1																		
<i>Nee</i>	3	50,0%	10	83,3%	13	72,2%	3	37,5%	6	66,7%	9	52,9%	18	69,2%	10	66,7%	28	66,7%
<i>Znuk</i>	1	16,7%	1	8,3%	2	11,1%	3	37,5%	1	11,1%	4	23,5%	4	15,4%	4	26,7%	9	21,4%
<i>Matig tot sterk</i>	2	33,3%	1	8,3%	3	16,7%	2	25,0%	2	22,2%	4	23,5%	4	15,4%	1	6,7%	5	11,9%
IPEO 2																		
<i>Nee</i>	4	66,7%	9	90,0%	13	81,3%	5	55,6%	12	66,7%	17	63,0%	18	81,8%	6	66,7%	25	78,1%
<i>Znuk</i>	0	0,0%	1	10,0%	1	6,3%	1	11,1%	4	22,2%	5	18,5%	1	4,5%*	3	33,3%*	4	12,5%
<i>Matig tot sterk</i>	2	33,3%	0	0,0%	2	12,5%	3	33,3%	2	11,1%	5	18,5%	3	13,6%	0	0,0%	3	9,4%
Suïcidale plannen na de poging																		
IPEO 1																		
<i>Niet over nagedacht</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	50,0%	2	100,0%	3	75,0%	3	37,5%	2	40,0%	6	42,9%
<i>Over nagedacht, maar details niet uitgenerkt</i>	2	66,7%	2	100,0%	4	80,0%	1	50,0%	0	0,0%	1	25,0%	2	25,0%	2	40,0%	4	28,6%
<i>Goed geformuleerd en details uitgenerkt</i>	1	33,3%	0	0,0%	1	20,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	37,5%	1	20,0%	4	28,6%
IPEO 2																		
<i>Niet over nagedacht</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	66,7%	5	100,0%	7	87,5%	1	33,3%	1	33,3%	2	33,3%
<i>Over nagedacht, maar details niet uitgenerkt</i>	1	50,0%	1	100,0%	2	66,7%	1	33,3%	0	0,0%	1	12,5%	2	66,7%	1	33,3%	3	50,0%
<i>Goed geformuleerd en details uitgenerkt</i>	1	50,0%	0	0,0%	1	33,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	33,3%	1	16,7%
Hopeloosheid																		
<i>Negatieve anticipatie</i>	1	20,0%	2	18,2%	3	18,8%	1	100,0%	1	50,0%	2	66,7%	6	35,3%	5	50,0%	11	40,7%
<i>Positieve anticipatie</i>	2	40,0%	6	54,5%	8	50,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4	23,5%	1	10,0%	5	18,5%
<i>Onzeker, ambivalent</i>	2	40,0%	3	27,3%	5	31,3%	0	0,0%	1	50,0%	1	33,3%	7	41,2%	4	40,0%	11	40,7%
Gevoelens na de poging																		
<i>Knaadheid</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Ambivalentie</i>	0	0,0%	1	8,3%	1	5,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	11,1%	3	21,4%	6	14,3%
<i>Spijt over mislukte poging</i>	1	16,7%	2	16,7%	3	16,7%	1	10,0%	0	0,0%	1	5,0%	4	14,8%	3	21,4%	7	16,7%
<i>Blij met mislukte poging</i>	0	0,0%	2	16,7%	2	11,1%	0	0,0%	1	10,0%	1	5,0%	6	22,2%	5	35,7%	11	26,2%
<i>Angst/ Onrust</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	11,1%	0	0,0%	3	7,1%
<i>Leegheid</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	3,7%	0	0,0%	1	2,4%
<i>Depressief</i>	3	50,0%	1	8,3%	4	22,2%	3	30,0%	3	30,0%	6	30,0%	6	22,2%	3	21,4%	10	23,8%
<i>Schuld/ Schaamte</i>	0	0,0%	5	41,7%	5	27,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Goed, positief</i>	2	33,3%	1	8,3%	3	16,7%	1	10,0%	0	0,0%	1	5,0%	5	18,5%	1	7,1%	6	14,3%
<i>Rustig</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	7,1%	1	2,4%
<i>Negatief</i>	0	0,0%	2	16,7%	2	11,1%	1	10,0%	2	20,0%	3	15,0%	3	11,1%	1	7,1%	4	9,5%
<i>Emotioneel</i>	0	0,0%	1	8,3%	1	5,6%	0	0,0%	1	10,0%	1	5,0%	2	7,4%	1	7,1%	3	7,1%
<i>Minimalisatie van poging</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	10,0%	1	5,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Te versuft</i>	0	0,0%	1	8,3%	1	5,6%	2	20,0%	3	30,0%	5	25,0%	0	0,0%	2	14,3%	2	4,8%
<i>Andere</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	10,0%	0	0,0%	1	5,0%	2	7,4%	3	21,4%	5	11,9%

	AZ Damiaan						AZ Glorieux ⁺						AZ Groeninge ⁺					
	Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Ervaren problemen																		
<i>Partner</i>	3	50,0%	5	50,0%	8	50,0%	7	70,0%	9	50,0%	16	57,1%	16	69,6%	7	77,8%	23	69,7%
<i>Ouders</i>	4	66,7%	6	60,0%	10	62,5%	3	30,0%	7	38,9%	10	35,7%	6	26,1%	2	22,2%	8	24,2%
<i>Kinderen</i>	3	50,0%*	0	0,0%*	3	18,8%	2	20,0%	7	38,9%	9	32,1%	3	13,0%	1	11,1%	4	12,1%
<i>Eenzaamheid</i>	3	50,0%*	0	0,0%*	3	18,8%	1	10,0%	1	5,6%	2	7,1%	10	43,5%	5	55,6%	15	45,5%
<i>Sociale relaties</i>	4	66,7%*	0	0,0%*	4	25,0%	1	10,0%	1	5,6%	2	7,1%	7	30,4%	2	22,2%	9	27,3%
<i>Afnijzing door geliefde</i>	3	50,0%	2	20,0%	5	31,3%	4	40,0%*	1	5,6%*	5	17,9%	5	21,7%	3	33,3%	8	24,2%
<i>Gezondheid</i>	1	16,7%	2	20,0%	3	18,8%	2	20,0%	5	27,8%	7	25,0%	4	17,4%	1	11,1%	6	18,2%
<i>Psychisch/ psychiatrisch</i>	3	50,0%	3	30,0%	6	37,5%	5	50,0%	9	50,0%	14	50,0%	11	47,8%	3	33,3%	15	45,5%
<i>Werk</i>	1	16,7%	4	40,0%	5	31,3%	6	60,0%*	3	16,7%*	9	32,1%	4	17,4%	4	44,4%	9	27,3%
<i>Justitie</i>	2	33,3%	1	10,0%	3	18,8%	3	30,0%	1	5,6%	4	14,3%	4	17,4%	1	11,1%	5	15,2%
<i>Wonen</i>	1	16,7%	0	0,0%	1	6,3%	0	0,0%	2	11,1%	2	7,1%	2	8,7%	2	22,2%	4	12,1%
<i>Financiën</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4	40,0%*	1	5,6%*	5	17,9%	6	26,1%	3	33,3%	9	27,3%
<i>School</i>	1	16,7%	1	10,0%	2	12,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	13,0%	0	0,0%	3	9,1%
<i>Seksuele oriëntatie</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	4,3%	0	0,0%	1	3,0%
<i>Overlijden/ ziekte sign. pers.</i>	2	33,3%	2	20,0%	4	25,0%	0	0,0%	2	11,1%	2	7,1%	7	30,4%	1	11,1%	8	24,2%
<i>ZMP, ZM sign. pers.</i>	0	0,0%	3	30,0%	3	18,8%	1	10,0%	2	11,1%	3	10,7%	3	13,0%	2	22,2%	5	15,2%
<i>Traumatische gebeurtenis</i>	3	50,0%	5	50,0%	8	50,0%	1	10,0%	4	22,2%	5	17,9%	4	17,4%	4	44,4%	8	24,2%
Motieven																		
<i>Vreselijke gedachten</i>	5	83,3%	9	90,0%	14	87,5%	1	12,5%	2	11,8%	3	12,0%	9	40,9%	2	25,0%	12	38,7%
<i>Weg willen</i>	4	66,7%	4	40,0%	8	50,0%	3	37,5%	7	41,2%	10	40,0%	10	45,5%	3	37,5%	13	41,9%
<i>Ondraaglijke situatie</i>	4	66,7%	9	90,0%	13	81,3%	2	25,0%	5	29,4%	7	28,0%	12	54,5%	4	50,0%	17	54,8%
<i>Controleverlies</i>	2	33,3%	3	30,0%	5	31,3%	1	12,5%	3	17,6%	4	16,0%	7	31,8%	1	12,5%	8	25,8%
<i>Zichzelf straffen</i>	0	0,0%	3	30,0%	3	18,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	9,1%	0	0,0%	2	6,5%
<i>Mislukking voelen</i>	4	66,7%	5	50,0%	9	56,3%	1	12,5%	2	11,8%	3	12,0%	6	27,3%	2	25,0%	8	25,8%
<i>Hulp zoeken</i>	3	50,0%	3	30,0%	6	37,5%	0	0,0%	2	11,8%	2	8,0%	3	13,6%	1	12,5%	4	12,9%
<i>Ontreddering tonen</i>	5	83,3%	5	50,0%	10	62,5%	1	12,5%	3	17,6%	4	16,0%	10	45,5%	1	12,5%	11	35,5%
<i>Liefde tonen</i>	3	50,0%	3	30,0%	6	37,5%	2	25,0%	1	5,9%	3	12,0%	5	22,7%	1	12,5%	6	19,4%
<i>In vraag stellen liefde</i>	1	16,7%	2	20,0%	3	18,8%	1	12,5%	0	0,0%	1	4,0%	5	22,7%	0	0,0%	5	16,1%
<i>Mening beïnvloeden</i>	0	0,0%	1	10,0%	1	6,3%	0	0,0%	2	11,8%	2	8,0%	3	13,6%	1	12,5%	4	12,9%
<i>Spijt doen krijgen</i>	1	16,7%	2	20,0%	3	18,8%	1	12,5%	1	5,9%	2	8,0%	6	27,3%	0	0,0%	6	19,4%
<i>Iemand bang maken</i>	0	0,0%	2	20,0%	2	12,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	9,1%	0	0,0%	2	6,5%
<i>Kwaad zijn op iemand</i>	0	0,0%	2	20,0%	2	12,5%	1	12,5%	1	5,9%	2	8,0%	3	13,6%	2	25,0%	5	16,1%
<i>Willen sterven</i>	5	83,3%	9	90,0%	14	87,5%	6	75,0%	6	35,3%	12	48,0%	10	45,5%	2	25,0%	13	41,9%

	AZ Damiaan						AZ Glorieux ⁺						AZ Groeninge ⁺					
	Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Suïcidale intentie																		
<i>Laag</i>	3	50,0%	3	30,0%	6	37,5%	2	25,0%*	14	77,8%*	16	61,5%	9	39,1%*	8	80,0%*	18	52,9%
<i>Hoog</i>	3	50,0%	7	70,0%	10	62,5%	6	75,0%*	4	22,2%*	10	38,5%	14	60,9%*	2	20,0%*	16	47,1%
Ambivalentie tov het leven																		
<i>Niet willen sterven</i>	0	0,0%	1	10,0%	1	6,3%	2	25,0%	7	41,2%	9	36,0%	8	34,8%	2	22,2%	10	30,3%
<i>Onverschilligheid</i>	1	16,7%	1	10,0%	2	12,5%	1	12,5%	4	23,5%	5	20,0%	5	21,7%	5	55,6%	10	30,3%
<i>Willen sterven</i>	5	83,3%	8	80,0%	13	81,3%	5	62,5%	6	35,3%	11	44,0%	10	43,5%	2	22,2%	13	39,4%
Zorgbehoeften																		
<i>Op vormelijk niveau</i>	2	33,3%	6	60,0%	8	50,0%	1	16,7%	3	21,4%	4	20,0%	5	33,3%	2	25,0%	7	29,2%
<i>Op inhoudelijk niveau</i>	1	16,7%	1	10,0%	2	12,5%	2	33,3%	6	42,9%	8	40,0%	3	20,0%	3	37,5%	6	25,0%
<i>Op beide niveaus</i>	1	16,7%	1	10,0%	2	12,5%	2	33,3%	1	7,1%	3	15,0%	3	20,0%	1	12,5%	5	20,8%
<i>Geen van beide niveaus</i>	2	33,3%	2	20,0%	4	25,0%	1	16,7%	4	28,6%	5	25,0%	4	26,7%	2	25,0%	6	25,0%
Zorgtraject																		
Geen verdere behandeling	3	50,0%	5	50,0%	8	50,0%	1	12,5%	0	0,0%	1	5,6%	3	17,6%	2	28,6%	5	20,0%
<i>Ontslag op advies</i>	2	33,3%	3	30,0%	5	31,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	17,6%	2	28,6%	5	20,0%
<i>Ontslag op tegenadvies</i>	1	16,7%	2	20,0%	3	18,8%	1	12,5%	0	0,0%	1	5,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Terugkeer naar begeleidingsdienst</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ambulante behandeling	2	33,3%	4	40,0%	6	37,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	7	41,2%	2	28,6%	9	36,0%
Residentieële behandeling	4	66,7%	3	30,0%	7	43,8%	7	87,5%	10	100,0%	17	94,4%	9	52,9%	3	42,9%	13	52,0%
<i>Somatische behandeling</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	10,0%	1	5,6%	1	5,9%	0	0,0%	1	4,0%
<i>Urgentiepsychiatrie</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4	23,5%	0	0,0%	4	16,0%
<i>Intramurale PAAZ</i>	2	33,3%	3	30,0%	5	31,3%	6	75,0%	10	100,0%	16	88,9%	3	17,6%	3	42,9%	6	24,0%
<i>Extramurale PAAZ</i>	2	33,3%	0	0,0%	2	12,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>PZ of PVT</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	25,0%	0	0,0%	2	11,1%	2	11,8%	1	14,3%	4	16,0%

	AZ Lokeren						AZ Maria Middelaers		AZ Monica		AZ Oudenaarde					
	Man		Vrouw		Totaal		Totaal		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Rates																
PB	14	45,2%	17	54,8%	31	100,0%	17 (M: 3, V: 14)	100,0%	5 (M:3, V: 2)	100,0%	7	35,0%	13	65,0%	20	100,0%
EB	14	45,2%	17	54,8%	31	100,0%	17 (M: 3, V: 14)	100,0%	5 (M:3, V: 2)	100,0%	7	33,3%	14	66,7%	21	100,0%
PB factoren																
Gemiddelde leeftijd	41,8		33,5		37,1		40,2		45,6		44,6		40,1		41,9	
Woonsituatie																
<i>Alleen</i>	6	46,2%	2	12,5%	8	27,6%	2	14,3%	4	80,0%	1	25,0%	3	23,1%	4	23,5%
<i>Niet alleen</i>	7	53,8%	14	87,5%	21	72,4%	12	85,7%	1	20,0%	3	75,0%	10	76,9%	13	76,5%
Burgerlijke staat																
<i>Nooit gehuwd</i>	6	46,2%	8	53,3%	14	50,0%	5	38,5%	2	40,0%	1	14,3%	4	30,8%	5	25,0%
<i>Gehuwd</i>	4	30,8%	3	20,0%	7	25,0%	6	46,2%	2	40,0%	3	42,9%	6	46,2%	9	45,0%
<i>Weduwe(naar)</i>	0	0,0%	1	6,7%	1	3,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Gescheiden</i>	3	23,1%	2	13,3%	5	17,9%	2	15,4%	1	20,0%	1	14,3%	3	23,1%	4	20,0%
<i>Officieel samenwonend</i>	0	0,0%	1	6,7%	1	3,6%	0	0,0%	0	0,0%	2	28,6%	0	0,0%	2	10,0%
Kinderen																
<i>Ja</i>	8	66,7%	7	46,7%	15	55,6%	9	64,3%	2	40,0%	2	50,0%	5	55,6%	7	53,8%
<i>Nee</i>	4	33,3%	8	53,3%	12	44,4%	5	35,7%	3	60,0%	2	50,0%	4	44,4%	6	46,2%
Economische toestand																
<i>Werkend</i>	5	41,7%	2	16,7%	7	29,2%	4	40,0%	3	60,0%	4	66,7%	9	75,0%	13	72,2%
<i>Werkloos</i>	2	16,7%	1	8,3%	3	12,5%	1	10,0%	1	20,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Economisch inactief</i>	5	41,7%	9	75,0%	14	58,3%	5	50,0%	1	20,0%	2	33,3%	3	25,0%	5	27,8%
<i>Student</i>	1	20,0%	6	66,7%	7	50,0%	3	75,0%	0	100,0%	0	0,0%	1	33,3%	1	20,0%
<i>Invalide</i>	1	20,0%	1	11,1%	2	14,3%	0	0,0%	0	0,0%	2	100,0%	1	33,3%	3	60,0%
<i>Gepensioneerd</i>	3	60,0%	2	22,2%	5	35,7%	1	25,0%	1	100,0%	0	0,0%	1	33,3%	1	20,0%
Psychiatrische behandeling in voorgeschiedenis																
<i>Geen</i>	1	25,0%	1	20,0%	2	22,2%	5	45,5%	4	80,0%	4	66,7%	2	16,7%	6	33,3%
<i>Huisarts</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	9,1%	0	0,0%	1	16,7%	2	16,7%	3	16,7%
<i>Ambulante behandeling</i>	1	25,0%	3	60,0%	4	44,4%	5	45,5%	0	0,0%	1	16,7%	8	66,7%	9	50,0%
<i>Residentiële behandeling</i>	2	50,0%	1	20,0%	3	33,3%	1	9,1%	1	20,0%	0	0,0%	3	25,0%	3	16,7%
Sociaal netwerk																
<i>Niemand</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	7,7%	2	40,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Partner</i>	3	50,0%	2	25,0%	5	35,7%	3	23,1%	0	0,0%	2	50,0%	5	45,5%	7	46,7%
<i>Familie</i>	5	83,3%	5	62,5%	10	71,4%	8	61,5%	2	40,0%	2	50,0%	6	54,5%	8	53,3%
<i>Vriend(in)</i>	0	0,0%	2	25,0%	2	14,3%	3	23,1%	1	20,0%	1	25,0%	4	36,4%	5	33,3%
<i>Andere</i>	0	0,0%	1	12,5%	1	7,1%	1	7,7%	0	0,0%	0	0,0%	3	27,3%	3	20,0%

	AZ Lokeren						AZ Maria Middelaers		AZ Monica		AZ Oudenaarde					
	Man		Vrouw		Totaal		Totaal		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Voorgeschiedenis van suïcidaal gedrag																
<i>Geen</i>	5	71,4%	4	30,8%	9	45,0%	8	66,7%	3	60,0%	5	83,3%	5	38,5%	10	52,6%
<i>1</i>	1	14,3%	9	69,2%	10	50,0%	2	16,7%	1	20,0%	0	0,0%	3	23,1%	3	15,8%
<i>2</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	8,3%	1	20,0%	0	0,0%	2	15,4%	2	10,5%
<i>3</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>4 of meerdere</i>	1	14,3%	0	0,0%	1	5,0%	1	8,3%	0	0,0%	1	16,7%	3	23,1%	4	21,1%
<i>Meerdere, aantal onbekend</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Tijdsinterval tussen suïcidepogingen																
<i>< 12 maanden</i>	2	100,0%	4	66,7%	6	75,0%	3	75,0%	2	100,0%	0	0,0%	4	50,0%	4	50,0%
<i>>12 maanden</i>	0	0,0%	2	33,3%	2	25,0%	1	25,0%	0	0,0%	0	0,0%	4	50,0%	4	50,0%
Medische behandeling																
<i>Ja</i>	1	50,0%	7	100,0%	8	88,9%	3	100,0%	1	50,0%	1	100,0%	6	75,0%	7	77,8%
<i>Ziekenhuis</i>	1	100,0%	3	50,0%	4	57,1%	2	100,0%	1	100,0%	1	100,0%	5	83,3%	6	85,7%
<i>Huisarts</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Andere</i>	0	0,0%	3	50,0%	3	42,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	16,7%	1	14,3%
<i>Nee</i>	1	50,0%	0	0,0%	1	11,1%	0	0,0%	1	50,0%	0	0,0%	2	25,0%	2	22,2%
Psychische behandeling																
<i>Ja</i>	2	100,0%	5	83,3%	7	87,5%	3	100,0%	0	0,0%	1	100,0%	5	83,3%	6	85,7%
<i>Nee</i>	0	0,0%	1	16,7%	1	12,5%	0	0,0%	2	100,0%	0	0,0%	1	16,7%	1	14,3%
Alcohol- en middelenmisbruik																
<i>Geen vermoeden</i>	5	55,6%	6	85,7%	11	68,8%	1	33,3%	0	0,0%	1	33,3%	8	66,7%	9	60,0%
<i>Mogelijk misbruik</i>	1	11,1%	0	0,0%	1	6,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	33,3%	0	0,0%	1	6,7%
<i>Waarschijnlijk misbruik</i>	3	33,3%	1	14,3%	4	25,0%	2	66,7%	1	100,0%	1	33,3%	4	33,3%	5	33,3%
As I diagnose																
<i>Geen AS I diagnose geformuleerd</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Stemmingsst.</i>	1	11,1%	1	16,7%	2	13,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	25,0%	3	20,0%
<i>Middelenmisbruik</i>	1	11,1%	0	0,0%	1	6,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Stemming + middelenmisbruik</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	16,7%	2	13,3%
<i>Acute aanpassingsstoornis</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	66,7%	6	50,0%	8	53,3%	8	53,3%
<i>Andere</i>	1	11,1%	2	33,3%	3	20,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Enkel probleembeschrijving</i>	6	66,7%	3	50,0%	9	60,0%	0	0,0%	1	33,3%	1	8,3%	2	13,3%	2	13,3%
As II diagnose																
<i>Geen AS II diagnose geformuleerd</i>	9	100,0%	6	100,0%	15	100,0%	1	100,0%	3	100,0%	12	100,0%	15	100,0%	15	100,0%
<i>Cluster B</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Andere</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Uitgesteld</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

	AZ Lokeren						AZ Maria Middelaers		AZ Monica		AZ Oudenaarde						
	Man		Vrouw		Totaal		Totaal		Totaal		Man		Vrouw		Totaal		
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
EB factoren																	
Situering in de tijd																	
Maand van suïcidepoging																	
<i>Januari</i>	2	14,3%	0	0,0%	2	6,5%											
<i>Februari</i>	3	21,4%	0	0,0%	3	9,7%											
<i>Maart</i>	0	0,0%	3	17,6%	3	9,7%											
<i>April</i>	1	7,1%	3	17,6%	4	12,9%				0	0,0%	2	14,3%	2	9,5%		
<i>Mei</i>	1	7,1%	0	0,0%	1	3,2%				3	42,9%	1	7,1%	4	19,0%		
<i>Juni</i>	1	7,1%	2	11,8%	3	9,7%				1	14,3%	1	7,1%	2	9,5%		
<i>Juli</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%				0	0,0%	3	21,4%	3	14,3%		
<i>Augustus</i>	3	21,4%	1	5,9%	4	12,9%				0	0,0%	4	28,6%	4	19,0%		
<i>September</i>	3	21,4%	3	17,6%	6	19,4%	2	15,4%		0	0,0%	1	7,1%	1	4,8%		
<i>Oktober</i>	0	0,0%	3	17,6%	3	9,7%	4	30,8%	1	20,0%	1	14,3%	1	7,1%	2	9,5%	
<i>November</i>	0	0,0%	2	11,8%	2	6,5%	4	30,8%	2	40,0%	1	14,3%	1	7,1%	2	9,5%	
<i>December</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	23,1%	2	40,0%	1	14,3%	0	0,0%	1	4,8%	
Tijdstip van suïcidepoging																	
<i>Ochtend</i>	3	25,0%	1	6,3%	4	14,3%	2	22,2%	0	0,0%	1	20,0%	1	10,0%	2	13,3%	
<i>(Na)middag</i>	1	8,3%	6	37,5%	7	25,0%	1	11,1%	2	40,0%	2	40,0%	5	50,0%	7	46,7%	
<i>Avond</i>	6	50,0%	7	43,8%	13	46,4%	2	22,2%	2	40,0%	2	40,0%	2	20,0%	4	26,7%	
<i>Nacht</i>	2	16,7%	2	12,5%	4	14,3%	4	44,4%	1	20,0%	0	0,0%	2	20,0%	2	13,3%	
Methode																	
<i>Zelfvergiftiging</i>	9	64,3%	15	88,2%	24	77,4%	12	85,7%	5	100,0%	4	57,1%	11	78,6%	15	71,4%	
<i>Zelfverwonding</i>	5	35,7%	1	5,9%	6	19,4%	2	14,3%	0	0,0%	3	42,9%	2	14,3%	5	23,8%	
<i>Combinatie zelfvergiftiging en -verwonding</i>	0	0,0%	1	5,9%	1	3,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	7,1%	1	4,8%	
Alcoholiname tijdens poging	8	57,1%	5	29,4%	13	41,9%	2	14,3%	4	80,0%	3	42,9%	6	42,9%	9	42,9%	
Ernst letsel																	
<i>Geen</i>	6	42,9%	11	64,7%	17	54,8%	7	53,8%	3	75,0%	5	71,4%	6	46,2%	11	55,0%	
<i>Beperkt</i>	7	50,0%	5	29,4%	12	38,7%	2	15,4%	0	0,0%	2	28,6%	6	46,2%	8	40,0%	
<i>Ernstig</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	23,1%	0	0,0%	0	0,0%	1	7,7%	1	5,0%	
<i>Levensbedreigend</i>	1	7,1%	1	5,9%	2	6,5%	1	7,7%	1	25,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
Aanmelding																	
<i>Op eigen initiatief</i>	3	21,4%	3	17,6%	6	19,4%	3	23,1%	2	40,0%	3	50,0%	1	7,7%	4	21,1%	
<i>Via 100</i>	10	71,4%	13	76,5%	23	74,2%	8	61,5%	3	60,0%	0	0,0%	5	38,5%	5	26,3%	
<i>Via politie</i>	3	21,4%	0	0,0%	3	9,7%	1	7,7%	0	0,0%	1	16,7%	0	0,0%	1	5,3%	
<i>Via huisarts/verwijsbrief</i>	1	7,1%	0	0,0%	1	3,2%	1	7,7%	0	0,0%	1	16,7%	4	30,8%	5	26,3%	
<i>Via andere(n)</i>	3	21,4%	3	17,6%	6	19,4%	2	15,4%	0	0,0%	2	33,3%	3	23,1%	5	26,3%	
Poging onderbroken	8	57,1%	8	47,1%	16	51,6%	1	7,7%	1	20,0%	4	80,0%	4	28,6%	8	42,1%	

	AZ Lokeren						AZ Maria Middelaers		AZ Monica		AZ Oudenaarde					
	Man		Vrouw		Totaal		Totaal		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Suïcidale gedachten na de poging																
IPEO 1																
<i>Nee</i>	1	25,0%	3	37,5%	4	33,3%	8	80,0%	3	60,0%	3	60,0%	10	76,9%	13	72,2%
<i>Zwak</i>	1	25,0%	4	50,0%	5	41,7%	2	20,0%	2	40,0%	1	20,0%	1	7,7%	2	11,1%
<i>Matig tot sterk</i>	2	50,0%	1	12,5%	3	25,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	20,0%	2	15,4%	3	16,7%
IPEO 2																
<i>Nee</i>	8	88,9%	4	57,1%	12	75,0%	5	100,0%	1	50,0%	5	100,0%	12	85,7%	17	89,5%
<i>Zwak</i>	1	11,1%	0	0,0%	1	6,3%	0	0,0%	1	50,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Matig tot sterk</i>	0	0,0%	3	42,9%	3	18,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	14,3%	2	10,5%
Suïcidale plannen na de poging																
IPEO 1																
<i>Niet over nagedacht</i>	0	0,0%	2	40,0%	2	25,0%	1	50,0%	1	50,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Over nagedacht, maar details niet uitgewerkt</i>	1	33,3%	3	60,0%	4	50,0%	1	50,0%	1	50,0%	1	100,0%	2	100,0%	3	100,0%
<i>Goed geformuleerd en details uitgewerkt</i>	2	66,7%	0	0,0%	2	25,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
IPEO 2																
<i>Niet over nagedacht</i>	1	100,0%	0	0,0%	1	25,0%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Over nagedacht, maar details niet uitgewerkt</i>	0	0,0%	3	100,0%	3	75,0%	1	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	100,0%	1	100,0%
<i>Goed geformuleerd en details uitgewerkt</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Hopeloosheid																
<i>Negatieve anticipatie</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	40,0%	2	50,0%	2	100,0%	3	50,0%	5	62,5%
<i>Positieve anticipatie</i>	0	0,0%	1	50,0%	1	33,3%	1	20,0%	2	50,0%	0	0,0%	1	16,7%	1	12,5%
<i>Onzeker, ambivalent</i>	1	100,0%	1	50,0%	2	66,7%	2	40,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	33,3%	2	25,0%
Gevoelens na de poging																
<i>Knaadheid</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	10,0%	1	7,1%
<i>Ambivalentie</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	7,1%	0	0,0%	0	0,0%	1	10,0%	1	7,1%
<i>Spijt over mislukte poging</i>	1	20,0%	0	0,0%	1	7,7%	1	7,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Blij met mislukte poging</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	14,3%	1	20,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Angst/ Onrust</i>	1	20,0%	0	0,0%	1	7,7%	3	21,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Leegheid</i>	0	0,0%	2	25,0%	2	15,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	10,0%	1	7,1%
<i>Depressief</i>	1	20,0%	2	25,0%	3	23,1%	2	14,3%	1	20,0%	2	50,0%	3	30,0%	5	35,7%
<i>Schuld/ Schaamte</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	14,3%	0	0,0%	0	0,0%	4	40,0%	4	28,6%
<i>Goed, positief</i>	0	0,0%	1	12,5%	1	7,7%	1	7,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Rustig</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	25,0%	0	0,0%	1	7,1%
<i>Negatief</i>	1	20,0%	1	12,5%	2	15,4%	4	28,6%	1	20,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Emotioneel</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4	28,6%	0	0,0%	0	0,0%	1	10,0%	1	7,1%
<i>Minimalisatie van poging</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	7,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Te versuft</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	21,4%	1	20,0%	1	25,0%	4	40,0%	5	35,7%
<i>Andere</i>	1	20,0%	0	0,0%	1	7,7%	0	0,0%	1	20,0%	0	0,0%	2	20,0%	2	14,3%

	AZ Lokeren						AZ Maria Middelaers		AZ Monica		AZ Oudenaarde					
	Man		Vrouw		Totaal		Totaal		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Ervaren problemen																
<i>Partner</i>	5	55,6%	3	42,9%	8	50,0%	3	50,0%	2	100,0%	2	40,0%	8	57,1%	10	52,6%
<i>Ouders</i>	4	44,4%	3	42,9%	7	43,8%	2	33,3%	1	50,0%	1	20,0%	4	28,6%	5	26,3%
<i>Kinderen</i>	2	22,2%	1	14,3%	3	18,8%	0	0,0%	0	0,0%	1	20,0%	3	21,4%	4	21,1%
<i>Eenzaamheid</i>	4	44,4%	4	57,1%	8	50,0%	0	0,0%	1	50,0%	0	0,0%	1	7,1%	1	5,3%
<i>Sociale relaties</i>	0	0,0%	1	14,3%	1	6,3%	2	33,3%	1	50,0%	0	0,0%	1	7,1%	1	5,3%
<i>Afnijzing door geliefde</i>	3	33,3%	1	14,3%	4	25,0%	2	33,3%	1	50,0%	1	20,0%	3	21,4%	4	21,1%
<i>Gezondheid</i>	1	11,1%	2	28,6%	3	18,8%	0	0,0%	0	0,0%	1	20,0%	2	14,3%	3	15,8%
<i>Psychisch/ psychiatrisch</i>	4	44,4%	4	57,1%	8	50,0%	2	33,3%	0	0,0%	1	20,0%	5	35,7%	6	31,6%
<i>Werk</i>	4	44,4%	0	0,0%	4	25,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	40,0%	2	14,3%	4	21,1%
<i>Justitie</i>	1	11,1%	0	0,0%	1	6,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Wonen</i>	2	22,2%	0	0,0%	2	12,5%	1	16,7%	0	0,0%	1	20,0%	0	0,0%	1	5,3%
<i>Financiën</i>	3	33,3%	0	0,0%	3	18,8%	1	16,7%	0	0,0%	1	20,0%	1	7,1%	2	10,5%
<i>School</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Seksuele oriëntatie</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Overlijden/ ziekte sign. pers.</i>	1	11,1%	2	28,6%	3	18,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>ZMP, ZM sign. pers.</i>	1	11,1%	1	14,3%	2	12,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Traumatische gebeurtenis</i>	1	11,1%	1	14,3%	2	12,5%	1	16,7%	1	50,0%	0	0,0%	1	7,1%	1	5,3%
Motieven																
<i>Vreselijke gedachten</i>	2	22,2%	3	42,9%	5	31,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	16,7%	2	11,8%
<i>Weg willen</i>	5	55,6%	1	14,3%	6	37,5%	0	0,0%	1	50,0%	3	60,0%	9	75,0%	12	70,6%
<i>Ondraaglijke situatie</i>	4	44,4%	2	28,6%	6	37,5%	2	66,7%	0	0,0%	0	0,0%	2	16,7%	2	11,8%
<i>Controleverlies</i>	2	22,2%	1	14,3%	3	18,8%	0	0,0%	0	0,0%	1	20,0%	1	8,3%	2	11,8%
<i>Zichzelf straffen</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Mislukking voelen</i>	0	0,0%	3	42,9%	3	18,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	8,3%	1	5,9%
<i>Hulp zoeken</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	20,0%	0	0,0%	1	5,9%
<i>Ontreddering tonen</i>	1	11,1%	1	14,3%	2	12,5%	0	0,0%	1	50,0%	1	20,0%	7	58,3%	8	47,1%
<i>Liefde tonen</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>In vraag stellen liefde</i>	0	0,0%	1	14,3%	1	6,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	8,3%	1	5,9%
<i>Mening beïnvloeden</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	20,0%	0	0,0%	1	5,9%
<i>Spijt doen krijgen</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	20,0%	1	8,3%	2	11,8%
<i>Iemand bang maken</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Kwaad zijn op iemand</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Willen sterven</i>	3	33,3%	3	42,9%	6	37,5%	1	33,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

	AZ Lokeren						AZ Maria Middelaers		AZ Monica		AZ Oudenaarde					
	Man		Vrouw		Totaal		Totaal		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Suïcidale intentie																
<i>Laag</i>	6	66,7%	4	57,1%	10	62,5%	3	75,0%	1	100,0%	5	100,0%	12	100,0%	17	100,0%
<i>Hoog</i>	3	33,3%	3	42,9%	6	37,5%	1	25,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ambivalentie tov het leven																
<i>Niet willen sterven</i>	2	22,2%	3	42,9%	5	31,3%	1	33,3%	1	100,0%	3	75,0%	8	61,5%	11	22,9%
<i>Onverschilligheid</i>	2	22,2%	0	0,0%	2	12,5%	0	0,0%	0	0,0%	1	25,0%	4	30,8%	5	10,4%
<i>Willen sterven</i>	5	55,6%	4	57,1%	9	56,3%	2	66,7%	0	0,0%	0	0,0%	1	7,7%	1	2,1%
Zorgbehoeften																
<i>Op vormelijk niveau</i>	0	0,0%	3	50,0%	3	21,4%	0	0,0%			1	33,3%	6	54,5%	7	50,0%
<i>Op inhoudelijk niveau</i>	3	37,5%	1	16,7%	4	28,6%	2	100,0%			1	33,3%	1	9,1%	2	14,3%
<i>Op beide niveaus</i>	1	12,5%	1	16,7%	2	14,3%	0	0,0%			0	0,0%	2	18,2%	2	14,3%
<i>Geen van beide niveaus</i>	4	50,0%	1	16,7%	5	35,7%	0	0,0%			1	33,3%	2	18,2%	3	21,4%
Zorgtraject																
Geen verdere behandeling	1	11,1%	1	14,3%	2	12,5%	0	0,0%			2	33,3%	2	14,3%	4	20,0%
<i>Ontslag op advies</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%			1	16,7%	2	14,3%	3	15,0%
<i>Ontslag op tegenadvies</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%			1	16,7%	0	0,0%	1	5,0%
<i>Terugkeer naar begeleidingsdienst</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%			0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ambulante behandeling	5	55,6%	4	57,1%	9	56,3%	0	0,0%			4	66,7%	12	85,7%	16	80,0%
Residentieële behandeling	3	33,0%	2	28,6%	5	31,3%	1	1,0%			0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Somatische behandeling</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%			0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Urgentiepsychiatrie</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%			0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Intramurale PAAZ</i>	1	11,1%	0	0,0%	1	6,3%	1	1,0%			0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Extramurale PAAZ</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%			0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>PZ of PVT</i>	3	33,3%	2	28,6%	5	31,3%	0	0,0%			0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

	AZ Sint-Augustinus		AZ Sint-Blasius ⁺						AZ Sint-Jan					
	Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Rates														
PB	9 (M: 6, V: 3)	100,0%	36	58,1%	26	41,9%	63	100,0%	67	39,2%	104	60,8%	171	100,0%
EB	9 (M: 6, V: 3)	100,0%	36	58,1%	26	41,9%	63	100,0%	67	35,6%	121	64,4%	188	100,0%
PB factoren														
Gemiddelde leeftijd	41,0		38,1		32,4		35,4		38,1		37,1		37,5	
Woonsituatie														
<i>Alleen</i>	0	0,0%	0	0,0%	2	28,6%	2	11,8%	21	31,8%	34	33,7%	55	32,9%
<i>Niet alleen</i>	7	100,0%	10	100,0%	5	71,4%	15	88,2%	45	68,2%	67	66,3%	112	67,1%
Burgerlijke staat														
<i>Nooit gehuwd</i>	4	57,1%	3	33,3%	0	0,0%	3	20,0%	30	44,8%	42	41,2%	72	42,6%
<i>Gehuwd</i>	3	42,9%	2	22,2%	3	50,0%	5	33,3%	13	19,4%	27	26,5%	40	23,7%
<i>Weduwe(naar)</i>	0	0,0%	1	11,1%	1	16,7%	2	13,3%	3	4,5%	6	5,9%	9	5,3%
<i>Gescheiden</i>	0	0,0%	2	22,2%	1	16,7%	3	20,0%	16	23,9%	21	20,6%	37	21,9%
<i>Officieel samenwonend</i>	0	0,0%	1	11,1%	1	16,7%	2	13,3%	5	7,5%	6	5,9%	11	6,5%
Kinderen														
<i>Ja</i>	3	42,9%	5	71,4%	6	75,0%	11	73,3%	31	50,0%	58	60,4%	89	56,3%
<i>Nee</i>	4	57,1%	2	28,6%	2	25,0%	4	26,7%	31	50,0%	38	39,6%	69	43,7%
Economische toestand														
<i>Werkend</i>	1	14,3%	4	50,0%	2	28,6%	6	40,0%	29	44,6%	32	32,3%	61	37,2%
<i>Werkloos</i>	0	0,0%	1	12,5%	1	14,3%	2	13,3%	6	9,2%	16	16,2%	22	13,4%
<i>Economisch inactief</i>	6	85,7%	3	37,5%	4	57,1%	7	46,7%	30	46,2%	51	51,5%	81	49,4%
<i>Student</i>	3	50,0%	1	33,3%	0	0,0%	1	14,3%	10	37,0%	17	39,5%	27	38,6%
<i>Invalide</i>	1	16,7%	1	33,3%	2	50,0%	3	42,9%	8	29,6%	20	46,5%	28	40,0%
<i>Gepensioneerd</i>	2	33,3%	1	33,3%	2	50,0%	3	42,9%	9	33,3%	6	14,0%	15	21,4%
Psychiatrische behandeling in voorgeschiedenis														
<i>Geen</i>	0	0,0%	2	40,0%	0	0,0%	2	22,2%	20	30,8%*	16	15,8%*	36	21,7%
<i>Huisarts</i>	1	14,3%	0	0,0%	1	25,0%	1	11,1%	0	0,0%	5	5,0%	5	3,0%
<i>Ambulante behandeling</i>	1	14,3%	1	20,0%	2	50,0%	3	33,3%	23	35,4%*	57	56,4%*	80	48,2%
<i>Residentiële behandeling</i>	5	71,4%	2	40,0%	1	25,0%	3	33,3%	33	50,8%	59	58,4%	92	55,4%
Sociaal netwerk														
<i>Niemand</i>	0	0,0%	2	33,3%	0	0,0%	2	16,7%	2	3,2%	9	8,8%	11	6,7%
<i>Partner</i>	2	22,2%	2	33,3%	2	33,3%	4	33,3%	18	28,6%	25	24,5%	43	26,1%
<i>Familie</i>	6	66,7%	2	33,3%	2	33,3%	4	33,3%	37	58,7%	59	57,8%	96	58,2%
<i>Vriend(in)</i>	4	44,4%	1	16,7%	2	33,3%	3	25,0%	18	28,6%	26	25,5%	44	26,7%
<i>Andere</i>	0	0,0%	1	16,7%	2	33,3%	3	25,0%	7	11,1%	17	16,7%	24	14,5%

	AZ Sint-Augustinus		AZ Sint-Blasius ⁺						AZ Sint-Jan					
	Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Voorgeschiedenis van suïcidaal gedrag														
<i>Geen</i>	2	28,6%	5	62,5%	1	16,7%	6	42,9%	33	50,0%*	31	29,8%*	64	37,6%
<i>1</i>	0	0,0%	2	25,0%	2	33,3%	4	28,6%	16	24,2%	34	32,7%	50	29,4%
<i>2</i>	2	28,6%	0	0,0%	2	33,3%	2	14,3%	11	16,7%	12	11,5%	23	13,5%
<i>3</i>	1	14,3%	1	12,5%	0	0,0%	1	7,1%	2	3,0%	5	4,8%	7	4,1%
<i>4 of meerdere</i>	2	28,6%	0	0,0%	1	16,7%	1	7,1%	4	6,1%*	21	20,2%*	25	14,7%
<i>Meerdere, aantal onbekend</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,0%	1	0,6%
Tijdsinterval tussen suicidepogingen														
<i>< 12 maanden</i>	3	60,0%	2	66,7%	2	40,0%	4	50,0%	16	51,6%	35	50,0%	51	50,5%
<i>>12 maanden</i>	2	40,0%	1	33,3%	3	60,0%	4	50,0%	15	48,4%	35	50,0%	50	49,5%
Medische behandeling														
<i>Ja</i>	4	80,0%	3	100,0%	5	100,0%	8	100,0%	22	75,9%	59	83,1%	81	81,0%
<i>Ziekenhuis</i>	4	100,0%	3	100,0%	3	60,0%	6	75,0%	18	85,7%	44	93,6%	62	91,2%
<i>Huisarts</i>	0	0,0%	0	0,0%	1	20,0%	1	12,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Andere</i>	0	0,0%	0	0,0%	1	20,0%	1	12,5%	3	14,3%	3	6,4%	6	8,8%
<i>Nee</i>	1	20,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	7	24,1%	12	16,9%	19	19,0%
Psychische behandeling														
<i>Ja</i>	4	80,0%	2	66,7%	2	66,7%	4	66,7%	16	64,0%	47	70,1%	63	68,5%
<i>Nee</i>	1	20,0%	1	33,3%	1	33,3%	2	33,3%	9	36,0%	20	29,9%	29	31,5%
Alcohol- en middelenmisbruik														
<i>Geen vermoeden</i>	5	71,4%							26	49,1%*	62	72,9%*	88	63,8%
<i>Mogelijk misbruik</i>	1	14,3%							4	7,5%	5	5,9%	9	6,5%
<i>Waarschijnlijk misbruik</i>	1	14,3%							23	43,4%*	18	21,2%*	41	29,7%
As I diagnose														
<i>Geen AS I diagnose geformuleerd</i>	0	0,0%							4	7,0%	10	11,4%	14	9,7%
<i>Stemmingsst.</i>	7	100,0%							20	35,1%	35	39,8%	55	37,9%
<i>Middelenmisbruik</i>	0	0,0%							10	17,5%*	5	5,7%*	15	10,3%
<i>Stemming + middelenmisbruik</i>	0	0,0%							3	5,3%	5	5,7%	8	5,5%
<i>Acute aanpassingsstoornis</i>	0	0,0%							9	15,8%	26	29,5%	35	24,1%
<i>Andere</i>	0	0,0%							6	10,5%	3	3,4%	9	6,2%
<i>Enkel probleembeschrijving</i>	0	0,0%							5	8,8%	4	4,5%	9	6,2%
As II diagnose														
<i>Geen AS II diagnose geformuleerd</i>	6	85,7%							44	77,2%	71	80,7%	115	79,3%
<i>Cluster B</i>	1	14,3%							3	5,3%	12	13,6%	15	10,3%
<i>Andere</i>	0	0,0%							2	3,5%	0	0,0%	2	1,4%
<i>Uitgesteld</i>	0	0,0%							8	14,0%	5	5,7%	13	9,0%

	AZ Sint-Augustinus		AZ Sint-Blasius ⁺						AZ Sint-Jan					
	Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
EB factoren														
Situering in de tijd														
Maand van suïcidepoging														
<i>Januari</i>			1	10,0%	0	0,0%	1	5,6%	6	9,0%	11	9,1%	17	9,0%
<i>Februari</i>			1	10,0%	1	12,5%	2	11,1%	5	7,5%	10	8,3%	15	8,0%
<i>Maart</i>			0	0,0%	1	12,5%	1	5,6%	6	9,0%	16	13,2%	22	11,7%
<i>April</i>			2	20,0%	0	0,0%	2	11,1%	6	9,0%	8	6,6%	14	7,4%
<i>Mei</i>			0	0,0%	1	12,5%	1	5,6%	7	10,4%	10	8,3%	17	9,0%
<i>Juni</i>			1	10,0%	0	0,0%	1	5,6%	1	1,5%	8	6,6%	9	4,8%
<i>Juli</i>			1	10,0%	1	12,5%	2	11,1%	4	6,0%	6	5,0%	10	5,3%
<i>Augustus</i>			0	0,0%	1	12,5%	1	5,6%	6	9,0%	10	8,3%	16	8,5%
<i>September</i>			3	30,0%	1	12,5%	4	22,2%	8	11,9%	11	9,1%	19	10,1%
<i>Oktober</i>	2	22,2%	1	10,0%	1	12,5%	2	11,1%	7	10,4%	8	6,6%	15	8,0%
<i>November</i>	3	33,3%	0	0,0%	1	12,5%	1	5,6%	4	6,0%	9	7,4%	13	6,9%
<i>December</i>	4	44,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	7	10,4%	14	11,6%	21	11,2%
Tijdstip van suïcidepoging														
<i>Ochtend</i>	3	37,5%	2	25,0%	1	16,7%	3	21,4%	10	15,6%	23	19,7%	33	18,2%
<i>(Na)middag</i>	5	62,5%	2	25,0%	0	0,0%	2	14,3%	9	14,1%	31	26,5%	40	22,1%
<i>Avond</i>	0	0,0%	2	25,0%	2	33,3%	4	28,6%	30	46,9%	46	39,3%	76	42,0%
<i>Nacht</i>	0	0,0%	2	25,0%	3	50,0%	5	35,7%	15	23,4%	17	14,5%	32	17,7%
Methode														
<i>Zelfvergiftiging</i>	5	55,6%	6	60,0%	4	50,0%	10	55,6%	42	62,7%*	97	80,2%*	139	73,9%
<i>Zelfverwonding</i>	3	33,3%	3	30,0%	3	37,5%	6	33,3%	17	25,4%*	16	13,2%*	33	17,6%
<i>Combinatie zelfvergiftiging en -verwonding</i>	1	11,1%	1	10,0%	1	12,5%	2	11,1%	8	11,9%	8	6,6%	16	8,5%
Alcoholinname tijdens poging	2	22,2%	3	30,0%	1	12,5%	4	22,2%	28	41,8%	40	33,1%	68	36,2%
Ernst letsel														
<i>Geen</i>	8	88,9%	2	22,2%	2	28,6%	4	25,0%	21	33,9%	55	46,6%	76	42,2%
<i>Beperkt</i>	1	11,1%	6	66,7%	4	57,1%	10	62,5%	33	53,2%	53	44,9%	86	47,8%
<i>Ernstig</i>	0	0,0%	1	11,1%	1	14,3%	2	12,5%	5	8,1%	8	6,8%	13	7,2%
<i>Levensbedreigend</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	4,8%	2	1,7%	5	2,8%
Aanmelding														
<i>Op eigen initiatief</i>	0	0,0%	2	25,0%	4	57,1%	6	40,0%	6	9,2%	21	18,3%	27	15,0%
<i>Via 100</i>	5	55,6%	3	37,5%	2	28,6%	5	33,3%	38	58,5%	64	55,7%	102	56,7%
<i>Via politie</i>	0	0,0%	1	12,5%	0	0,0%	1	6,7%	11	16,9%*	1	0,9%*	12	6,7%
<i>Via huisarts/ vernijsbrief</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	7	10,8%	16	13,9%	23	12,8%
<i>Via andere(n)</i>	4	44,4%	2	25,0%	1	14,3%	3	20,0%	15	23,1%	36	31,3%	51	28,3%
Poging onderbroken	3	33,3%	5	55,6%	6	100,0%	11	73,3%	29	47,5%	37	35,6%	66	40,0%

	AZ Sint-Augustinus		AZ Sint-Blasius ⁺						AZ Sint-Jan					
	Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Suïcidale gedachten na de poging														
IPEO 1														
<i>Nee</i>	5	71,4%	6	75,0%	2	33,3%	8	57,1%	40	67,8%	64	62,1%	104	64,2%
<i>Zwak</i>	2	28,6%	1	12,5%	2	33,3%	3	21,4%	12	20,3%	21	20,4%	33	20,4%
<i>Matig tot sterk</i>	0	0,0%	1	12,5%	2	33,3%	3	21,4%	7	11,9%	18	17,5%	25	15,4%
IPEO 2														
<i>Nee</i>	5	71,4%							40	72,7%	64	65,3%	104	68,0%
<i>Zwak</i>	2	28,6%							10	18,2%	16	16,3%	26	17,0%
<i>Matig tot sterk</i>	0	0,0%							5	9,1%	18	18,4%	23	15,0%
Suïcidale plannen na de poging														
IPEO 1														
<i>Niet over nagedacht</i>	0	0,0%	0	0,0%	1	25,0%	1	20,0%	7	43,8%	15	53,6%	22	50,0%
<i>Over nagedacht, maar details niet uitgewerkt</i>	2	100,0%	0	0,0%	1	25,0%	1	20,0%	9	56,3%	12	42,9%	21	47,7%
<i>Goed geformuleerd en details uitgewerkt</i>	0	0,0%	1	100,0%	2	50,0%	3	60,0%	0	0,0%	1	3,6%	1	2,3%
IPEO 2														
<i>Niet over nagedacht</i>	0	0,0%							7	43,8%	11	33,3%	18	36,7%
<i>Over nagedacht, maar details niet uitgewerkt</i>	2	100,0%							7	43,8%	21	63,6%	28	57,1%
<i>Goed geformuleerd en details uitgewerkt</i>	0	0,0%							2	12,5%	1	3,0%	3	6,1%
Hopeloosheid														
<i>Negatieve anticipatie</i>	4	57,1%	1	50,0%	3	75,0%	4	66,7%	28	58,3%	47	52,2%	75	54,3%
<i>Positieve anticipatie</i>	1	14,3%	0	0,0%	1	25,0%	1	16,7%	11	22,9%	18	20,0%	29	21,0%
<i>Onzeker, ambivalent</i>	2	28,6%	1	50,0%	0	0,0%	1	16,7%	9	18,8%	25	27,8%	34	34,6%
Gevoelens na de poging														
<i>Kwaadheid</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4	6,1%	9	7,5%	13	7,0%
<i>Ambivalentie</i>	0	0,0%	0	0,0%	1	20,0%	1	7,7%	4	6,1%	14	11,7%	18	9,7%
<i>Spijt over mislukte poging</i>	1	14,3%	2	25,0%	1	20,0%	3	23,1%	11	16,7%	24	20,0%	35	18,8%
<i>Blij met mislukte poging</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	13	19,7%	12	10,0%	25	13,4%
<i>Angst/ Onrust</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	4,5%	6	5,0%	9	4,8%
<i>Leegheid</i>	0	0,0%	2	25,0%	0	0,0%	2	15,4%	2	3,0%	4	3,3%	6	3,2%
<i>Depressief</i>	0	0,0%	1	12,5%	2	40,0%	3	23,1%	6	9,1%	13	10,8%	19	10,2%
<i>Schuld/ Schaamte</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4	6,1%	5	4,2%	9	4,8%
<i>Goed, positief</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,0%	3	2,5%	5	2,7%
<i>Rustig</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,0%	0	0,0%	2	1,1%
<i>Negatief</i>	2	28,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,5%	9	7,5%	10	5,4%
<i>Emotioneel</i>	0	0,0%	1	12,5%	0	0,0%	1	7,7%	3	4,5%	15	12,5%	18	9,7%
<i>Minimalisatie van poging</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,5%	0	0,0%	1	0,5%
<i>Te versuft</i>	0	0,0%	1	12,5%	0	0,0%	1	7,7%	7	10,6%	10	8,3%	17	9,1%
<i>Andere</i>	2	28,6%	0	0,0%	1	20,0%	1	7,7%	8	12,1%	10	8,3%	18	9,7%

	AZ Sint-Augustinus		AZ Sint-Blasius ⁺						AZ Sint-Jan					
	Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Ervaren problemen														
<i>Partner</i>	5	71,4%							23	41,1%*	58	57,4%*	81	51,6%
<i>Ouders</i>	3	42,9%							14	25,0%	32	31,7%	46	29,3%
<i>Kinderen</i>	1	14,3%							11	19,6%	20	19,8%	31	19,7%
<i>Eenzaamheid</i>	4	57,1%							13	23,2%	30	29,7%	43	27,4%
<i>Sociale relaties</i>	4	57,1%							14	25,0%	15	14,9%	29	18,5%
<i>Afnijzing door geliefde</i>	3	42,9%							8	14,3%	8	7,9%	16	10,2%
<i>Gezondheid</i>	1	14,3%							6	10,7%	7	6,9%	13	8,3%
<i>Psychisch/psychiatrisch</i>	4	57,1%							21	37,5%	42	41,6%	63	40,1%
<i>Werk</i>	1	14,3%							13	23,2%	23	22,8%	36	22,9%
<i>Justitie</i>	0	0,0%							1	1,8%	1	1,0%	2	1,3%
<i>Wonen</i>	1	14,3%							6	10,7%	9	8,9%	15	9,6%
<i>Financiën</i>	0	0,0%							17	30,4%	18	17,8%	35	22,3%
<i>School</i>	2	28,6%							6	10,7%	10	9,9%	16	10,2%
<i>Seksuele oriëntatie</i>	0	0,0%							1	1,8%	3	3,0%	4	2,5%
<i>Overlijden/ ziekte sign. pers.</i>	2	28,6%							10	17,9%	16	15,8%	26	16,6%
<i>ZMP, ZM sign. pers.</i>	2	28,6%							4	7,1%	7	6,9%	11	7,0%
<i>Traumatische gebeurtenis</i>	5	71,4%							10	17,9%	20	19,8%	30	19,1%
Motieven														
<i>Vreselijke gedachten</i>	3	42,9%	15	53,6%	10	52,6%	25	52,1%	17	30,9%	33	32,7%	50	32,1%
<i>Weg willen</i>	4	57,1%	18	64,3%	8	42,1%	27	56,3%	20	36,4%	50	19,5%	70	44,9%
<i>Ondraaglijke situatie</i>	1	14,3%	18	64,3%	9	47,4%	28	58,3%	23	41,8%	54	53,5%	77	49,4%
<i>Controleverlies</i>	2	28,6%	11	39,3%	9	47,4%	20	41,7%	8	14,5%	22	21,8%	30	19,2%
<i>Zichzelf straffen</i>	1	14,3%	4	14,3%	2	10,5%	6	12,5%	3	5,5%	1	1,0%	4	2,6%
<i>Mislukking voelen</i>	1	14,3%	8	28,6%	7	36,8%	15	31,3%	6	10,9%	15	14,9%	21	13,5%
<i>Hulp zoeken</i>	1	14,3%	9	32,1%	5	26,3%	14	29,2%	2	3,6%	1	1,0%	3	1,9%
<i>Ontredering tonen</i>	2	28,6%	10	35,7%	7	36,8%	18	37,5%	8	14,5%	16	15,8%	24	15,4%
<i>Liefde tonen</i>	1	14,3%	7	25,0%	9	47,4%	17	35,4%	6	10,9%	11	10,9%	17	10,9%
<i>In vraag stellen liefde</i>	0	0,0%	6	21,4%	5	26,3%	12	25,0%	2	3,6%	7	6,9%	9	5,8%
<i>Mening beïnvloeden</i>	0	0,0%	1	3,6%	2	10,5%	4	8,3%	2	3,6%	8	7,9%	10	6,4%
<i>Spijt doen krijgen</i>	1	14,3%	5	17,9%	3	15,8%	8	16,7%	2	3,6%*	14	13,9%*	16	10,3%
<i>Iemand bang maken</i>	0	0,0%	1	3,6%	1	5,3%	2	4,2%	1	1,8%	0	0,0%	1	0,6%
<i>Kwaad zijn op iemand</i>	1	14,3%	2	7,1%	1	5,3%	3	6,3%	4	7,3%	12	11,9%	16	10,3%
<i>Willen sterren</i>	2	28,6%	17	60,7%*	6	31,6%*	24	50,0%	37	67,3%	59	58,4%	96	61,5%

	AZ Sint-Augustinus		AZ Sint-Blasius ⁺						AZ Sint-Jan					
	Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Suïcidale intentie														
<i>Laag</i>	3	42,9%							26	47,3%*	68	66,7%*	94	59,9%
<i>Hoog</i>	4	57,1%							29	52,7%*	34	33,3%*	63	40,1%
Ambivalentie tov het leven														
<i>Niet willen sterven</i>	1	14,3%							8	14,5%	15	14,9%	23	14,7%
<i>Onverschilligheid</i>	2	28,6%							18	32,7%	27	26,7%	45	28,8%
<i>Willen sterven</i>	4	57,1%							29	52,7%	59	58,4%	88	56,4%
Zorgbehoeften														
<i>Op vormelijk niveau</i>	3	42,9%							33	61,1%	64	64,0%	97	63,0%
<i>Op inhoudelijk niveau</i>	2	28,6%							7	13,0%	10	10,0%	17	11,0%
<i>Op beide niveaus</i>	2	28,6%							4	7,4%	13	13,0%	17	11,0%
<i>Geen van beide niveaus</i>	0	0,0%							10	18,5%	13	13,0%	23	14,9%
Zorgtraject														
Geen verdere behandeling	0	0,0%							1	1,8%	1	1,0%	2	1,2%
<i>Ontslag op advies</i>	0	0,0%							1	1,8%	1	1,0%	2	1,2%
<i>Ontslag op tegenadvies</i>	0	0,0%							0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Terugkeer naar begeleidingsdienst</i>	0	0,0%							0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ambulante behandeling	0	0,0%							17	29,8%	27	26,0%	44	27,3%
Residentiële behandeling	7	100,0%							51	89,5%	99	95,2%	150	93,2%
<i>Somatische behandeling</i>	0	0,0%							5	8,8%	6	5,8%	11	6,8%
<i>Urgentiepsychiatrie</i>	0	0,0%							43	75,4%	88	84,6%	131	81,4%
<i>Intramurale PAAZ</i>	7	100,0%							17	29,8%	34	32,7%	51	31,7%
<i>Extramurale PAAZ</i>	0	0,0%							2	3,5%	4	3,8%	6	3,7%
<i>PZ of PVT</i>	0	0,0%							5	8,8%	11	10,6%	16	9,9%

	AZ Sint-Jozef						AZ Sint-Lucas						AZ Sint-Maarten					
	Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Rates																		
PB	8	29,6%	19	70,4%	27	100,0%	25	41,7%	35	58,3%	60	100,0%	31	50,8%	30	49,2%	61	100,0%
EB	8	29,6%	19	70,4%	27	100,0%	26	38,8%	41	61,2%	67	100,0%	31	50,8%	30	49,2%	61	100,0%
PB factoren																		
Gemiddelde leeftijd	30,4		42,4		38,8		36,3		43,2		40,3		39,9		41,3		40,6	
Woonsituatie																		
<i>Alleen</i>	1	14,3%	5	27,8%	6	24,0%	11	44,0%	10	28,6%	21	35,0%	9	30,0%	9	30,0%	18	30,0%
<i>Niet alleen</i>	6	85,7%	13	72,2%	19	76,0%	14	56,0%	25	71,4%	39	65,0%	21	70,0%	21	70,0%	42	70,0%
Burgerlijke staat																		
<i>Nooit gehuwd</i>	6	75,0%*	4	22,2%*	10	38,5%	11	44,0%	13	37,1%	24	40,0%	9	31,0%	9	30,0%	18	30,5%
<i>Gehuwd</i>	1	12,5%*	12	66,7%*	13	50,0%	6	24,0%	9	25,7%	15	25,1%	11	38,0%	11	36,6%	22	37,3%
<i>Weduwe(naar)</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	8,0%	3	8,6%	5	8,3%	0	0,0%	3	10,0%	3	5,1%
<i>Gescheiden</i>	1	12,5%	2	11,1%	3	11,5%	4	16,0%	7	20,0%	11	18,3%	2	6,9%	3	10,0%	5	8,5%
<i>Officieel samenwonend</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	8,0%	3	8,6%	5	8,3%	7	24,1%	4	13,4%	11	18,6%
Kinderen																		
<i>Ja</i>	2	25,0%*	14	82,4%*	16	64,0%	14	56,0%	21	40,0%	35	58,3%	19	63,3%	17	58,6%	36	61,0%
<i>Nee</i>	6	75,0%*	3	17,6%*	9	36,0%	11	44,0%	14	60,0%	25	41,7%	11	36,7%	12	41,4%	23	39,0%
Economische toestand																		
<i>Werkend</i>	3	42,9%	11	61,1%	14	56,0%	14	56,0%	11	31,4%	25	41,7%	16	59,3%*	8	28,6%*	24	43,6%
<i>Werkloos</i>	1	14,3%	1	5,6%	2	8,0%	5	20,0%	5	14,3%	10	16,7%	3	11,1%	1	3,6%	4	7,3%
<i>Economisch inactief</i>	3	42,9%	6	33,3%	9	36,0%	6	24,0%*	19	54,3%*	25	41,7%	8	29,6%*	19	67,9%*	27	49,1%
<i>Student</i>	2	66,7%	0	0,0%	2	28,6%	2	33,3%	2	10,5%	4	16,0%	1	12,5%	4	23,5%	5	20,0%
<i>Invalide</i>	0	0,0%	4	100,0%	4	57,1%	2	33,3%*	13	68,4%*	15	60,0%	4	50,0%	10	58,8%	14	56,0%
<i>Gepensioneerd</i>	1	33,3%	0	0,0%	1	14,3%	2	33,3%	4	21,1%	6	24,0%	3	37,5%	3	17,6%	6	24,0%
Psychiatrische behandeling in voorgeschiedenis																		
<i>Geen</i>	5	71,4%	8	44,4%	13	52,0%	6	25,0%	5	14,7%	11	19,0%	6	26,1%	6	24,0%	12	25,0%
<i>Huisarts</i>	1	14,3%	4	22,2%	5	20,0%	7	29,2%	5	14,7%	12	20,7%	3	13,0%	0	0,0%	3	6,3%
<i>Ambulante behandeling</i>	1	14,3%	6	33,3%	7	28,0%	7	29,2%	14	41,2%	21	36,2%	6	26,1%	12	48,0%	18	37,5%
<i>Residentiële behandeling</i>	0	0,0%	2	11,1%	2	8,0%	10	41,7%	19	55,9%	29	50,0%	10	43,5%	11	44,0%	21	43,8%
Sociaal netwerk																		
<i>Niemand</i>	0	0,0%	3	15,8%	3	11,5%	7	28,0%	3	8,8%	10	16,9%	5	17,2%	7	25,9%	12	21,4%
<i>Partner</i>	1	14,3%	6	31,6%	7	26,9%	4	16,0%*	16	47,1%*	20	33,9%	8	27,6%	9	33,3%	17	30,4%
<i>Familie</i>	5	71,4%	13	68,4%	18	69,2%	13	52,0%	18	52,9%	31	52,5%	14	48,3%	9	33,3%	23	41,1%
<i>Vriend(in)</i>	4	57,1%	8	42,1%	12	46,2%	4	16,0%	10	29,4%	14	23,7%	7	24,1%	7	25,9%	14	25,0%
<i>Andere</i>	1	14,3%	1	5,3%	2	7,7%	5	20,0%	5	14,7%	10	16,9%	1	3,4%	2	7,4%	3	5,4%

	AZ Sint-Jozef						AZ Sint-Lucas						AZ Sint-Maarten					
	Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Voorgeschiedenis van suïcidaal gedrag																		
<i>Geen</i>	5	62,5%	9	47,4%	14	51,9%	13	52,0%	13	38,2%	26	44,1%	17	58,6%*	7	25,0%*	24	42,1%
<i>1</i>	1	12,5%	6	31,6%	7	25,9%	9	36,0%	11	32,4%	20	33,9%	6	20,7%*	13	46,4%*	19	33,3%
<i>2</i>	1	12,5%	1	5,3%	2	7,4%	2	8,0%	2	5,9%	4	6,8%	2	6,9%	5	17,9%	7	12,3%
<i>3</i>	1	12,5%	0	0,0%	1	3,7%	1	4,0%	1	2,9%	2	3,4%	2	6,9%	1	3,6%	3	5,3%
<i>4 of meerdere</i>	0	0,0%	3	15,8%	3	11,1%	0	0,0%*	7	20,6%*	7	11,9%	2	6,9%	2	7,1%	4	7,0%
<i>Meerdere, aantal onbekend</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Tijdsinterval tussen suicidepogingen																		
<i>< 12 maanden</i>	2	66,7%	3	30,0%	5	38,5%	6	50,0%	8	38,1%	14	42,4%	6	54,5%	9	45,0%	15	48,4%
<i>>12 maanden</i>	1	33,3%	7	70,0%	8	61,5%	6	50,0%	13	61,9%	19	57,6%	5	45,5%	11	55,0%	16	51,6%
Medische behandeling																		
<i>Ja</i>	2	66,7%	6	60,0%	8	61,5%	10	83,3%	19	90,5%	29	87,9%	6	54,5%	17	89,5%	23	76,7%
<i>Ziekenhuis</i>	2	100,0%	4	66,7%	6	75,0%	10	100,0%	18	94,7%	28	96,6%	4	80,0%*	17	100,0%*	21	95,5%
<i>Huisarts</i>	0	0,0%	1	16,7%	1	12,5%	0	0,0%	1	5,3%	1	3,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Andere</i>	0	0,0%	1	16,7%	1	12,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	20,0%	0	0,0%	1	4,5%
<i>Nee</i>	1	33,3%	4	40,0%	5	38,5%	2	16,7%	2	9,5%	4	12,1%	5	45,5%	2	10,5%	7	23,3%
Psychische behandeling																		
<i>Ja</i>	1	33,3%	4	40,0%	5	38,5%	8	66,7%	16	76,2%	24	72,7%	5	50,0%	15	78,9%	20	69,0%
<i>Nee</i>	2	66,7%	6	60,0%	8	61,5%	4	33,3%	5	23,8%	9	27,3%	5	50,0%	4	21,1%	9	31,0%
Alcohol- en middelenmisbruik																		
<i>Geen vermoeden</i>	3	60,0%	10	58,8%	13	59,1%	11	50,0%	22	71,0%	33	62,3%	17	73,9%	18	72,0%	35	72,9%
<i>Mogelijk misbruik</i>	0	0,0%	2	11,8%	2	9,1%	1	4,5%	0	0,0%	1	1,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Waarschijnlijk misbruik</i>	2	40,0%	5	29,4%	7	31,8%	10	45,5%	9	29,0%	19	35,8%	6	26,1%	7	28,0%	13	27,1%
As I diagnose																		
<i>Geen AS I diagnose geformuleerd</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	4,0%	4	11,8%	5	8,5%	2	8,7%	3	11,5%	5	10,2%
<i>Stemmingsst.</i>	2	50,0%	5	29,4%	7	33,3%	4	16,0%	9	26,5%	13	22,0%	7	30,4%	8	30,8%	15	30,6%
<i>Middelenmisbruik</i>	0	0,0%	1	5,9%	1	4,8%	4	16,0%	3	8,8%	7	11,9%	6	26,1%	3	11,5%	9	18,4%
<i>Stemming + middelenmisbruik</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	4,0%	1	2,9%	2	3,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Acute aanpassingsstoornis</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	7	28,0%	11	32,4%	18	30,5%	1	4,3%	4	15,4%	5	10,2%
<i>Andere</i>	1	25,0%	0	0,0%	1	4,8%	3	12,0%	2	5,9%	5	8,5%	3	13,0%	3	11,5%	6	12,2%
<i>Enkel probleembeschrijving</i>	1	25,0%	11	64,7%	12	57,1%	5	20,0%	4	11,8%	9	15,3%	4	17,4%	5	19,2%	9	18,4%
As II diagnose																		
<i>Geen AS II diagnose geformuleerd</i>	4	100,0%	16	94,1%	20	95,2%	19	76,0%	24	70,6%	43	72,9%	15	65,2%*	6	23,1%*	21	42,9%
<i>Cluster B</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	4,0%	7	20,6%	8	13,6%	3	13,0%	7	26,9%	10	20,4%
<i>Andere</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5	20,0%	3	8,8%	8	13,6%	1	4,3%	5	19,2%	6	12,2%
<i>Uitgesteld</i>	0	0,0%	1	5,9%	1	4,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4	17,4%	8	30,8%	12	24,5%

	AZ Sint-Jozef						AZ Sint-Lucas						AZ Sint-Maarten					
	Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
EB factoren																		
Situering in de tijd																		
Maand van suïcidepoging																		
<i>Januari</i>							0	0,0%	7	17,1%	7	10,4%	5	16,1%	2	6,9%	7	11,7%
<i>Februari</i>	2	25,0%	3	15,8%	5	18,5%	2	7,7%	4	9,8%	6	9,0%	3	9,7%	3	10,3%	6	10,0%
<i>Maart</i>	0	0,0%	1	5,3%	1	3,7%	2	7,7%	4	9,8%	6	9,0%	3	9,7%	3	10,3%	6	10,0%
<i>April</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	6	14,6%	6	9,0%	1	3,2%	2	6,9%	3	5,0%
<i>Mei</i>	0	0,0%	2	10,5%	2	7,4%	3	11,5%	6	14,6%	9	13,4%	2	6,5%	4	13,8%	6	10,0%
<i>Juni</i>	1	12,5%	3	15,8%	4	14,8%	4	15,4%	4	9,8%	8	11,9%	2	6,5%	3	10,3%	5	8,3%
<i>Juli</i>	1	12,5%	1	5,3%	2	7,4%	4	15,4%	4	9,8%	8	11,9%	2	6,5%	6	20,7%	8	13,3%
<i>Augustus</i>	1	12,5%	2	10,5%	3	11,1%	4	15,4%	0	0,0%	4	6,0%	1	3,2%	0	0,0%	1	1,7%
<i>September</i>	2	25,0%	2	10,5%	4	14,8%	4	15,4%	0	0,0%	4	6,0%	1	3,2%	1	3,4%	2	3,3%
<i>Oktober</i>	0	0,0%	2	10,5%	2	7,4%	1	3,8%	1	2,4%	2	3,0%	4	12,9%	1	3,4%	5	8,3%
<i>November</i>	1	12,5%	1	5,3%	2	7,4%	2	7,7%	4	9,8%	6	9,0%	1	3,2%	3	10,3%	4	6,7%
<i>December</i>	0	0,0%	2	10,5%	2	7,4%	0	0,0%	1	2,4%	1	1,5%	6	19,4%	1	3,4%	7	11,7%
Tijdstip van suïcidepoging																		
<i>Ochtend</i>	3	42,9%	4	22,2%	7	28,0%	5	19,2%	2	5,0%	7	10,6%	8	29,6%	4	14,3%	12	21,8%
<i>(Na)middag</i>	0	0,0%	7	38,9%	7	28,0%	4	15,4%*	18	45,0%*	22	33,3%	3	11,1%	7	25,0%	10	18,2%
<i>Avond</i>	3	42,9%	6	33,3%	9	36,0%	10	38,5%	15	37,5%	25	37,9%	10	37,0%	11	19,3%	21	38,2%
<i>Nacht</i>	1	14,3%	1	5,6%	2	8,0%	7	26,9%	5	12,5%	12	18,2%	6	22,2%	6	21,4%	12	21,8%
Methode																		
<i>Zelfvergiftiging</i>	5	62,5%	18	94,7%	23	85,2%	23	88,5%	36	87,8%	59	88,1%	25	80,6%	23	79,3%	48	80,0%
<i>Zelfverwonding</i>	2	25,0%	0	0,0%	2	7,4%	2	7,7%	4	9,8%	6	9,0%	4	12,9%	5	17,2%	9	15,0%
<i>Combinatie zelfvergiftiging en -verwonding</i>	1	12,5%	1	5,3%	2	7,4%	1	3,8%	1	2,4%	2	3,0%	2	6,5%	1	3,4%	3	5,0%
Alcoholiname tijdens poging																		
	1	12,5%	7	36,8%	8	29,6%	11	42,3%	10	24,4%	21	31,3%	16	51,6%	10	34,5%	26	43,3%
Ernst letsel																		
<i>Geen</i>	5	62,5%	8	44,4%	13	50,0%	12	46,2%	25	61,0%	37	55,2%	8	26,7%	10	34,5%	18	30,5%
<i>Beperkt</i>	3	37,5%	8	44,4%	11	42,3%	9	34,6%	9	22,0%	18	26,9%	9	30,0%	8	27,6%	17	28,8%
<i>Ernstig</i>	0	0,0%	2	11,1%	2	7,7%	3	11,5%	4	9,8%	7	10,4%	6	20,0%	7	24,1%	13	22,0%
<i>Levensbedreigend</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	7,7%	3	7,3%	5	7,5%	7	23,3%	4	13,8%	11	18,6%
Aanmelding																		
<i>Op eigen initiatief</i>	2	25,0%	3	15,8%	5	18,5%	2	7,7%	4	9,8%	6	9,0%	2	6,5%*	9	30,0%*	11	18,0%
<i>Via 100</i>	4	50,0%	11	57,9%	15	55,6%	15	57,7%	24	58,5%	39	58,2%	19	61,3%	13	43,3%	32	52,5%
<i>Via politie</i>	2	25,0%	0	0,0%	2	7,4%	2	7,7%	0	0,0%	2	3,0%	2	6,5%	4	13,3%	6	9,8%
<i>Via huisarts/ vernijsbrief</i>	1	12,5%	1	5,3%	2	7,4%	0	0,0%	3	7,3%	3	4,5%	1	3,2%	1	3,3%	2	3,3%
<i>Via andere(n)</i>	1	12,5%	4	21,1%	5	18,5%	9	34,6%	12	29,3%	21	31,3%	11	35,5%	9	30,0%	20	32,8%
Poging onderbroken																		
	1	14,3%	5	26,3%	6	23,1%	15	57,7%	24	58,5%	39	58,2%	9	32,1%	7	24,1%	16	28,1%

	AZ Sint-Jozef						AZ Sint-Lucas						AZ Sint-Maarten					
	Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Suïcidale gedachten na de poging																		
IPEO 1																		
<i>Nee</i>	6	85,7%	15	83,3%	21	83,3%	13	52,0%	18	47,4%	31	49,2%	11	44,0%	9	34,6%	20	39,2%
<i>Zwak</i>	1	14,3%	1	5,6%	2	5,6%	8	32,0%	13	34,2%	21	33,3%	4	16,0%	7	26,9%	11	21,6%
<i>Matig tot sterk</i>	0	0,0%	2	11,1%	2	11,1%	4	16,0%	7	18,4%	11	17,5%	10	40,0%	10	38,5%	20	39,2%
IPEO 2																		
<i>Nee</i>	4	80,0%	15	88,2%	19	86,4%	10	45,5%	21	60,0%	31	54,4%	13	56,5%	16	64,0%	29	60,4%
<i>Zwak</i>	1	20,0%	1	5,9%	2	9,1%	9	40,9%	8	22,9%	17	29,8%	3	13,0%	4	16,0%	7	14,6%
<i>Matig tot sterk</i>	0	0,0%	1	5,9%	1	4,5%	3	13,6%	6	17,1%	9	15,8%	7	30,4%	5	20,0%	12	25,0%
Suïcidale plannen na de poging																		
IPEO 1																		
<i>Niet over nagedacht</i>	1	100,0%	1	33,3%	2	50,0%	5	41,7%	14	70,0%	19	59,4%	3	23,1%	4	25,0%	7	24,1%
<i>Over nagedacht, maar details niet uitgewerkt</i>	0	0,0%	2	66,7%	2	50,0%	6	50,0%	5	25,0%	11	34,4%	9	69,2%	10	62,5%	19	65,5%
<i>Goed geformuleerd en details uitgewerkt</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	8,3%	1	5,0%	2	6,3%	1	7,7%	2	12,5%	3	10,3%
IPEO 2																		
<i>Niet over nagedacht</i>	1	100,0%	1	50,0%	2	66,7%	6	50,0%	9	60,0%	15	55,6%	1	10,0%	3	33,3%	4	21,1%
<i>Over nagedacht, maar details niet uitgewerkt</i>	0	0,0%	1	50,0%	1	33,3%	6	50,0%	5	33,3%	11	40,7%	9	90,0%	5	55,6%	14	73,7%
<i>Goed geformuleerd en details uitgewerkt</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	6,7%	1	3,7%	0	0,0%	1	11,1%	1	5,3%
Hopeloosheid																		
<i>Negatieve anticipatie</i>	3	42,9%	6	85,7%	9	64,3%	9	39,1%	18	56,3%	27	49,1%	11	50,0%	7	36,8%	18	43,9%
<i>Positieve anticipatie</i>	1	14,3%	0	0,0%	1	7,1%	10	43,5%*	5	15,6%*	15	27,3%	3	13,6%	7	36,8%	10	24,4%
<i>Onzeker, ambivalent</i>	3	42,9%	1	14,3%	4	28,6%	4	17,4%	9	28,1%	13	23,6%	8	36,4%	5	26,3%	13	31,7%
Gevoelens na de poging																		
<i>Kwaadheid</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	8,0%	1	2,6%	3	4,8%	1	3,8%	0	0,0%	1	1,9%
<i>Ambivalentie</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	8,0%	4	10,5%	6	9,5%	0	0,0%	1	3,8%	1	1,9%
<i>Spijt over mislukte poging</i>	1	12,5%	1	5,3%	2	7,4%	8	32,0%	13	34,2%	21	33,3%	7	26,9%	11	42,3%	18	34,6%
<i>Blij met mislukte poging</i>	1	12,5%	1	5,3%	2	7,4%	2	8,0%	4	10,5%	6	9,5%	4	15,4%	1	3,8%	5	9,6%
<i>Angst/ Onrust</i>	1	12,5%	0	0,0%	1	3,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	3,8%	1	1,9%
<i>Leggheid</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	4,0%	1	2,6%	2	3,2%	1	3,8%	0	0,0%	1	1,9%
<i>Depressief</i>	2	25,0%	2	10,5%	4	14,8%	3	12,0%	9	23,7%	12	19,0%	4	15,4%	1	3,8%	5	9,6%
<i>Schuld/ Schaamte</i>	1	12,5%	0	0,0%	1	3,7%	1	4,0%	2	5,3%	3	4,8%	0	0,0%	3	11,5%	3	5,8%
<i>Goed, positief</i>	0	0,0%	3	15,8%	3	11,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	7,7%	2	3,8%
<i>Rustig</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	4,0%	1	2,6%	2	3,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Negatief</i>	0	0,0%	2	10,5%	2	7,4%	1	4,0%	2	5,3%	3	4,8%	1	3,8%	5	19,2%	6	11,5%
<i>Emotioneel</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	12,0%	5	13,2%	8	12,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Minimalisatie van poging</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,6%	1	1,6%	0	0,0%	2	7,7%	2	3,8%
<i>Te versuft</i>	0	0,0%	3	15,8%	3	11,1%	4	16,0%	4	10,5%	8	12,7%	1	3,8%	2	7,7%	3	5,8%
<i>Andere</i>	0	0,0%	3	15,8%	3	11,1%	1	4,0%	1	2,6%	2	3,2%	4	15,4%	2	7,7%	6	11,5%

	AZ Sint-Jozef						AZ Sint-Lucas						AZ Sint-Maarten					
	Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Ervaren problemen					0													
<i>Partner</i>	2	40,0%	8	47,1%	10	45,5%	11	50,0%	17	50,0%	28	50,0%	16	64,0%	10	38,5%	26	51,0%
<i>Ouders</i>	1	20,0%	5	29,4%	6	27,3%	9	40,9%	11	32,4%	20	35,7%	7	28,0%	9	34,6%	16	31,4%
<i>Kinderen</i>	1	20,0%	6	35,3%	7	31,8%	6	27,3%	8	23,5%	14	25,0%	4	16,0%	2	7,7%	6	11,8%
<i>Eenzaamheid</i>	1	20,0%	9	52,9%	10	45,5%	8	36,4%	13	38,2%	21	37,5%	9	36,0%	12	46,2%	21	41,2%
<i>Sociale relaties</i>	0	0,0%	3	17,6%	3	13,6%	9	40,9%	9	26,5%	18	32,1%	6	24,0%	5	19,2%	11	21,6%
<i>Afnijzing door geliefde</i>	2	40,0%	1	5,9%	3	13,6%	12	54,5%*	3	8,8%*	15	26,8%	4	16,0%	1	3,8%	5	9,8%
<i>Gezondheid</i>	1	20,0%	3	17,6%	4	18,2%	3	13,6%	7	20,6%	10	17,9%	7	28,0%	4	15,4%	11	21,6%
<i>Psychisch/psychiatrisch</i>	1	20,0%	3	17,6%	4	18,2%	10	45,5%	24	70,6%	34	60,7%	13	52,0%	18	69,2%	31	60,8%
<i>Werk</i>	1	20,0%	5	29,4%	6	27,3%	7	31,8%	9	26,5%	16	28,6%	11	44,0%*	4	15,4%*	15	29,4%
<i>Justitie</i>	1	20,0%	1	5,9%	2	9,1%	0	0,0%	1	2,9%	1	1,8%	1	4,0%	0	0,0%	1	2,0%
<i>Wonen</i>	0	0,0%	1	5,9%	1	4,5%	4	18,2%	4	11,8%	8	14,3%	4	16,0%	1	3,8%	5	9,8%
<i>Financiën</i>	1	20,0%	4	23,5%	5	22,7%	5	22,7%	3	8,8%	8	14,3%	7	28,0%	2	7,7%	9	17,6%
<i>School</i>	1	20,0%	0	0,0%	1	4,5%	2	9,1%	2	5,9%	4	7,1%	0	0,0%	2	7,7%	2	3,9%
<i>Seksuele oriëntatie</i>	0	0,0%	1	5,9%	1	4,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	4,0%	0	0,0%	1	2,0%
<i>Overlijden/ ziekte sign. pers.</i>	1	20,0%	5	29,4%	6	27,3%	8	36,4%	6	17,6%	14	25,0%	2	8,0%	6	23,1%	8	15,7%
<i>ZMP, ZM sign. pers.</i>	0	0,0%	2	11,8%	2	9,1%	2	9,1%	4	11,8%	6	10,7%	2	8,0%	2	7,7%	4	7,8%
<i>Traumatische gebeurtenis</i>	0	0,0%	3	17,6%	3	13,6%	4	18,2%*	15	44,1%*	19	33,9%	7	28,0%	9	34,6%	16	31,4%
Motieven																		
<i>Vreselijke gedachten</i>	2	40,0%	1	5,9%	3	13,6%	3	13,6%	3	8,6%	6	10,5%	3	12,0%	3	11,5%	6	11,8%
<i>Weg willen</i>	3	60,0%	13	76,5%	16	72,7%	4	18,2%	10	28,6%	14	24,6%	7	28,0%	4	15,4%	11	21,6%
<i>Ondraaglijke situatie</i>	2	40,0%	10	58,8%	12	54,5%	8	36,4%	16	45,7%	24	42,1%	18	72,0%	15	57,7%	33	64,7%
<i>Controleverlies</i>	1	20,0%	9	52,9%	10	45,5%	3	13,6%	4	11,4%	7	12,3%	1	4,0%	5	19,2%	6	11,8%
<i>Zichzelf straffen</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	5,7%	2	3,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Mislukking voelen</i>	1	20,0%	5	29,4%	6	27,3%	5	22,7%	3	8,6%	8	14,0%	2	8,0%	3	11,5%	5	9,8%
<i>Hulp zoeken</i>	0	0,0%	6	35,3%	6	27,3%	0	0,0%	3	8,6%	3	5,3%	3	12,0%	0	0,0%	3	5,9%
<i>Ontredering tonen</i>	0	0,0%*	10	58,8%*	10	45,5%	2	9,1%	4	11,4%	6	10,5%	1	4,0%	1	3,8%	2	3,9%
<i>Liefde tonen</i>	0	0,0%	2	11,8%	2	9,1%	3	13,6%	1	2,9%	4	7,0%	1	4,0%	0	0,0%	1	2,0%
<i>In vraag stellen liefde</i>	1	20,0%	0	0,0%	1	4,5%	1	4,5%	1	2,9%	2	3,5%	1	4,0%	0	0,0%	1	2,0%
<i>Mening beïnvloeden</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	9,1%	1	2,9%	3	5,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Spijt doen krijgen</i>	1	20,0%	3	17,6%	4	18,2%	1	4,5%	1	2,9%	2	3,5%	1	4,0%	1	3,8%	2	3,9%
<i>Iemand bang maken</i>	0	0,0%	1	5,9%	1	4,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	3,8%	1	2,0%
<i>Kwaad zijn op iemand</i>	0	0,0%	5	29,4%	5	22,7%	1	4,5%	6	17,1%	7	12,3%	1	4,0%	2	7,7%	3	5,9%
<i>Willen sterren</i>	1	20,0%	7	41,2%	8	36,4%	12	54,5%	16	45,7%	28	49,1%	10	40,0%	8	30,8%	18	35,3%

	AZ Sint-Jozef						AZ Sint-Lucas						AZ Sint-Maarten					
	Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Suïcidale intentie																		
<i>Laag</i>	4	80,0%	11	64,7%	15	68,2%	12	54,5%	18	52,9%	30	53,6%	8	34,8%*	18	69,2%*	26	53,1%
<i>Hoog</i>	1	20,0%	6	35,3%	7	31,8%	10	45,5%	16	47,1%	26	46,4%	15	65,2%*	8	30,8%*	23	46,9%
Ambivalentie tov het leven																		
<i>Niet willen sterven</i>	3	60,0%	7	41,2%	10	45,5%	4	18,2%	9	25,7%	13	22,8%	5	21,7%	7	26,9%	12	24,5%
<i>Onverschilligheid</i>	1	20,0%	4	23,5%	5	22,7%	7	31,8%	13	37,1%	20	35,1%	4	17,4%	5	19,2%	9	18,4%
<i>Willen sterven</i>	1	20,0%	6	35,3%	7	31,8%	11	50,0%	13	37,1%	24	42,1%	14	60,9%	14	53,8%	28	57,1%
Zorgbehoeften																		
<i>Op vormelijk niveau</i>	1	33,3%	9	56,3%	10	52,6%	6	28,6%	10	28,6%	16	28,6%	7	30,4%	12	48,0%	19	39,6%
<i>Op inhoudelijk niveau</i>	1	33,3%	3	18,8%	4	21,1%	7	33,3%	10	28,6%	17	30,4%	2	8,7%	3	12,0%	5	10,4%
<i>Op beide niveaus</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5	23,8%	6	17,1%	11	19,6%	8	34,8%	4	16,0%	12	25,0%
<i>Geen van beide niveaus</i>	1	33,3%	4	25,0%	5	26,3%	3	14,3%	9	25,7%	12	21,4%	6	26,1%	6	24,0%	12	25,0%
Zorgtraject																		
Geen verdere behandeling	1	20,0%	1	5,9%	2	9,1%	4	15,4%	4	10,3%	8	12,3%	2	7,7%	2	7,1%	4	7,4%
<i>Ontslag op advies</i>	0	0,0%	1	5,9%	1	4,5%	2	7,7%	4	10,3%	6	9,2%	2	7,7%	0	0,0%	2	3,7%
<i>Ontslag op tegenadvies</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	7,1%	2	3,7%
<i>Terugkeer naar begeleidingsdienst</i>	1	20,0%	0	0,0%	1	4,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ambulante behandeling	3	60,0%	16	94,1%	19	86,4%	7	26,9%	5	12,8%	12	18,5%	5	19,2%	9	32,1%	14	25,9%
Residentiële behandeling	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	16	61,5%	30	76,9%	46	70,8%	21	80,8%	22	78,6%	43	79,6%
<i>Somatische behandeling</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	11,5%	2	5,1%	5	7,7%	8	30,8%	11	39,3%	19	35,2%
<i>Urgentiepsychiatrie</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,6%	1	1,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Intramurale PAAZ</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	15	57,7%	21	53,8%	36	55,4%	11	42,3%	15	53,6%	26	48,1%
<i>Extramurale PAAZ</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	11,5%	1	3,6%	4	7,4%
<i>PZ of PVT</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	7,7%	5	12,8%	7	10,8%	6	23,1%	5	17,9%	11	20,4%

	AZ Vesalius						H. Hartziekenhuis						Jan Yperman ZH					
	Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Rates																		
PB	16	45,7%	19	54,3%	35	100,0%	12	26,1%	34	73,9%	46	100,0%	30	34,1%	58	65,9%	88	100,0%
EB	16	45,7%	19	54,3%	35	100,0%	12	26,1%	34	73,9%	46	100,0%	31	33,7%	61	66,3%	92	100,0%
PB factoren																		
Gemiddelde leeftijd	37,1		48,3		43,2		38,6		40,9		40,3		33,5		38,1		36,6	
Woonsituatie																		
<i>Alleen</i>	5	31,3%	6	31,6%	11	31,4%	5	41,7%	9	26,5%	14	30,4%	3	10,0%	10	18,2%	13	15,3%
<i>Niet alleen</i>	11	68,8%	13	68,4%	24	68,6%	7	58,3%	25	73,5%	32	69,6%	27	90,0%	45	81,8%	72	84,7%
Burgerlijke staat																		
<i>Nooit gehuwd</i>	7	43,8%	7	36,8%	14	40,0%	2	16,7%	7	20,6%	9	19,6%	12	41,4%	15	27,8%	27	32,5%
<i>Gehuwd</i>	5	31,3%	9	47,4%	14	40,0%	4	33,3%	12	35,3%	16	34,8%	10	34,5%	21	38,9%	31	37,3%
<i>Weduwe(naar)</i>	0	0,0%	3	15,8%	3	8,6%	0	0,0%	1	2,9%	1	2,2%	0	0,0%	3	5,6%	3	3,6%
<i>Gescheiden</i>	4	25,0%*	0	0,0%*	4	11,4%	6	50,0%	11	32,4%	17	37,0%	2	6,9%	8	14,8%	10	12,0%
<i>Officieel samenwonend</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	8,8%	3	6,5%	5	17,2%	7	13,0%	12	14,5%
Kinderen																		
<i>Ja</i>	10	62,5%	13	68,4%	23	65,7%	7	41,7%	28	82,4%	35	76,1%	15	50,0%	20	35,7%	35	40,7%
<i>Nee</i>	6	37,5%	6	31,6%	12	34,3%	5	58,3%	6	17,6%	11	23,9%	15	50,0%	36	64,3%	51	59,3%
Economische toestand																		
<i>Werkend</i>	10	62,5%*	4	21,1%*	14	40,0%	8	72,7%	17	51,5%	25	56,8%	15	53,6%	26	48,1%	41	50,0%
<i>Werkloos</i>	2	12,5%	3	15,8%	5	14,3%	0	0,0%	2	6,1%	2	4,5%	10	35,7%	11	20,4%	21	25,6%
<i>Economisch inactief</i>	4	25,0%*	12	63,2%*	16	45,7%	3	27,3%	14	42,4%	17	38,6%	3	10,7%*	17	31,5%*	20	24,4%
<i>Student</i>	1	33,3%	3	25,0%	4	26,7%	1	50,0%	1	11,1%	2	18,2%	2	100,0%	5	31,3%	7	38,9%
<i>Invalide</i>	2	66,7%	3	25,0%	5	33,3%	0	0,0%	4	44,4%	4	36,4%	0	0,0%	7	43,8%	7	38,9%
<i>Gepensioneerd</i>	0	0,0%*	6	50,0%*	6	40,0%	1	50,0%	4	44,4%	5	45,5%	0	0,0%	4	25,0%	4	22,2%
Psychiatrische behandeling in voorgeschiedenis																		
<i>Geen</i>	4	25,0%	6	33,3%	10	29,4%	2	20,0%	7	25,0%	9	23,7%	6	31,6%	10	21,7%	16	24,6%
<i>Huisarts</i>	1	6,3%	2	11,1%	3	8,8%	0	0,0%	3	10,7%	3	7,9%	1	5,3%	4	8,7%	5	7,7%
<i>Ambulante behandeling</i>	6	37,5%	9	50,0%	15	44,1%	6	60,0%	15	53,6%	21	55,3%	5	26,3%	15	32,6%	20	30,8%
<i>Residentiële behandeling</i>	7	43,8%	5	27,8%	12	35,3%	3	30,0%	9	32,1%	12	31,6%	4	21,1%	9	19,6%	13	20,0%
Sociaal netwerk																		
<i>Niemand</i>	4	26,7%	3	16,7%	7	21,2%	2	18,2%	4	11,8%	6	13,3%	0	0,0%	7	15,2%	7	10,6%
<i>Partner</i>	4	26,7%	6	33,3%	10	30,3%	2	18,2%	10	29,4%	12	26,7%	7	35,0%	17	37,0%	24	36,4%
<i>Familie</i>	6	40,0%	13	72,2%	19	57,6%	6	54,5%	14	41,2%	20	44,4%	9	45,0%	20	43,5%	29	43,9%
<i>Vriend(in)</i>	4	26,7%	3	16,7%	7	21,2%	2	18,2%	16	47,1%	18	40,0%	4	20,0%	6	13,0%	10	15,2%
<i>Andere</i>	1	6,7%	0	0,0%	1	3,0%	2	18,2%	2	5,9%	4	8,9%	3	15,0%	6	13,0%	9	13,6%

	AZ Vesalius						H. Hartziekenhuis						Jan Yperman ZH					
	Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Voorgeschiedenis van suïcidaal gedrag																		
<i>Geen</i>	6	42,9%	9	47,4%	15	45,5%	4	33,3%	17	50,0%	21	45,7%	14	60,9%	27	50,0%	41	53,2%
<i>1</i>	5	35,7%	3	15,8%	8	24,2%	7	58,3%	9	26,5%	16	34,8%	3	13,0%	14	25,9%	17	22,1%
<i>2</i>	1	7,1%	3	15,8%	4	12,1%	0	0,0%	1	2,9%	1	2,2%	2	8,7%	5	9,3%	7	9,1%
<i>3</i>	2	14,3%	2	10,5%	4	12,1%	0	0,0%	5	14,7%	5	10,9%	1	4,3%	0	0,0%	1	1,3%
<i>4 of meerdere</i>	0	0,0%	2	10,5%	2	6,1%	1	8,3%	2	5,9%	3	6,5%	3	13,0%	8	14,8%	11	14,3%
<i>Meerdere, aantal onbekend</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Tijdsinterval tussen suicidepogingen																		
<i>< 12 maanden</i>	4	50,0%	2	20,0%	6	33,3%	1	12,5%	5	29,4%	6	24,0%	5	0,0%	19	70,4%	24	66,7%
<i>>12 maanden</i>	4	50,0%	8	80,0%	12	66,7%	7	87,5%	12	70,6%	19	76,0%	4	0,0%	8	29,6%	12	33,3%
Medische behandeling																		
<i>Ja</i>	3	37,5%	8	80,0%	11	61,1%	7	87,5%	13	76,5%	20	80,0%	7	77,8%	20	76,9%	27	77,1%
<i>Ziekenhuis</i>	3	100,0%	7	87,5%	10	90,9%	7	100,0%	10	76,9%	17	85,0%	4	57,1%	12	60,0%	16	59,3%
<i>Huisarts</i>	0	0,0%	1	12,5%	1	9,1%	0	0,0%	2	15,4%	2	10,0%	1	14,3%	4	20,0%	5	18,5%
<i>Andere</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	7,7%	1	5,0%	2	28,6%	4	20,0%	6	22,2%
<i>Nee</i>	5	62,5%	2	20,0%	7	38,9%	1	12,5%	4	23,5%	5	20,0%	2	22,2%	6	23,1%	8	22,9%
Psychische behandeling																		
<i>Ja</i>	2	25,0%	4	40,0%	6	33,3%	3	37,5%	7	41,2%	10	40,0%	7	77,8%	17	70,8%	24	72,7%
<i>Nee</i>	6	75,0%	6	60,0%	12	66,7%	5	62,5%	10	58,8%	15	60,0%	2	22,2%	7	29,2%	9	27,3%
Alcohol- en middelenmisbruik																		
<i>Geen vermoeden</i>	5	41,7%	11	73,3%	16	59,3%	6	66,7%	25	83,3%	31	79,5%	5	38,5%	19	67,9%	24	58,5%
<i>Mogelijk misbruik</i>	1	8,3%	0	0,0%	1	3,7%	0	0,0%	1	3,3%	1	2,6%	3	23,1%	2	7,1%	5	12,2%
<i>Waarschijnlijk misbruik</i>	6	50,0%	4	26,7%	10	37,0%	3	33,3%	4	13,3%	7	17,9%	5	38,5%	7	25,0%	12	29,3%
As I diagnose																		
<i>Geen AS I diagnose geformuleerd</i>	0	0,0%	1	6,7%	1	3,8%	0	0,0%	2	6,5%	2	5,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Stemmingsst.</i>	3	27,3%	5	33,3%	8	30,8%	5	55,6%	22	71,0%	27	67,5%	1	10,0%	5	29,4%	6	22,2%
<i>Middelenmisbruik</i>	4	36,4%	3	20,0%	7	26,9%	1	11,1%	0	0,0%	1	2,5%	1	10,0%	0	0,0%	1	3,7%
<i>Stemming + middelenmisbruik</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	9,7%	3	7,5%	0	0,0%	1	5,9%	1	3,7%
<i>Acute aanpassingsstoornis</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Andere</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Enkel probleembeschrijving</i>	4	36,4%	6	40,0%	10	38,5%	3	33,3%	4	12,9%	7	17,5%	8	80,0%	11	64,7%	19	70,4%
As II diagnose																		
<i>Geen AS II diagnose geformuleerd</i>	10	90,9%	13	86,7%	23	88,5%	7	77,8%	19	61,3%	26	65,0%	10	100,0%	17	100,0%	27	100,0%
<i>Cluster B</i>	1	9,1%	1	6,7%	2	7,7%	0	0,0%	2	6,5%	2	5,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Andere</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Uitgesteld</i>	0	0,0%	1	6,7%	1	3,8%	2	22,2%	10	32,3%	12	30,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

	AZ Vesalius						H. Hartziekenhuis						Jan Yperman ZH					
	Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
EB factoren																		
Situering in de tijd																		
Maand van suïcidepoging																		
<i>Januari</i>	0	0,0%	1	5,3%	1	2,9%	1	8,3%	0	0,0%	1	2,2%	2	6,5%	3	5,0%	5	5,5%
<i>Februari</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	8,3%	1	2,9%	2	4,3%	2	6,5%	3	5,0%	5	5,5%
<i>Maart</i>	2	12,5%	3	15,8%	5	14,3%	1	8,3%	3	8,8%	4	8,7%	5	16,1%	9	15,0%	14	15,4%
<i>April</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	5,9%	2	4,3%	3	9,7%	5	8,3%	8	8,8%
<i>Mei</i>	2	12,5%	2	10,5%	4	11,4%	1	8,3%	3	8,8%	4	8,7%	1	3,2%	6	10,0%	7	7,7%
<i>Juni</i>	1	6,3%	3	15,8%	4	11,4%	1	8,3%	4	11,3%	5	10,9%	2	6,5%	6	10,0%	8	8,8%
<i>Juli</i>	1	6,3%	2	10,5%	3	8,6%	3	25,0%	2	5,9%	5	10,9%	5	16,1%	8	13,3%	13	14,3%
<i>Augustus</i>	3	18,8%	2	10,5%	5	14,3%	1	8,3%	2	5,9%	3	6,5%	1	3,2%	6	10,0%	7	7,7%
<i>September</i>	0	0,0%	2	10,5%	2	5,7%	1	8,3%	6	17,6%	7	15,2%	0	0,0%	2	3,3%	2	2,2%
<i>Oktober</i>	3	18,8%	3	15,8%	6	17,1%	0	0,0%	4	11,8%	4	8,7%	1	3,2%	6	10,0%	7	7,7%
<i>November</i>	3	18,8%	0	0,0%	3	8,6%	0	0,0%	4	11,8%	4	8,7%	6	19,4%	3	5,0%	9	9,9%
<i>December</i>	1	6,3%	1	5,3%	2	5,7%	2	16,7%	3	8,8%	5	10,9%	3	9,7%	3	5,0%	6	6,6%
Tijdstip van suïcidepoging																		
<i>Ochtend</i>	3	25,0%	1	8,3%	4	16,7%	0	0,0%	5	19,2%	5	13,9%	2	8,7%	5	9,1%	7	9,0%
<i>(Na)middag</i>	4	33,3%	5	41,7%	9	37,5%	4	40,0%	10	38,5%	14	38,9%	2	8,7%	16	29,1%	18	23,1%
<i>Avond</i>	4	33,3%	5	41,7%	9	37,5%	4	40,0%	8	30,8%	12	33,3%	13	56,5%	20	36,4%	33	42,3%
<i>Nacht</i>	1	8,3%	1	8,3%	2	8,3%	2	20,0%	3	11,5%	5	13,9%	6	26,1%	14	25,5%	20	25,6%
Methode																		
<i>Zelfvergiftiging</i>	13	81,3%	16	84,2%	29	82,9%	6	50,0%*	31	91,2%*	37	80,4%	20	64,5%*	55	90,2%*	75	81,5%
<i>Zelfverwonding</i>	1	6,3%	1	5,3%	2	5,7%	4	33,3%	3	8,8%	7	15,2%	7	22,6%	5	8,2%	12	13,0%
<i>Combinatie zelfvergiftiging en -verwonding</i>	2	12,5%	2	10,5%	4	11,4%	2	16,7%	0	0,0%	2	4,3%	4	12,9%*	1	1,6%*	5	5,4%
Alcoholiname tijdens poging	7	43,8%	3	15,8%	10	28,6%	3	25,0%	12	35,3%	15	32,6%	12	38,7%	17	27,9%	29	31,5%
Ernst letsel																		
<i>Geen</i>	4	25,0%	3	15,8%	7	20,0%	5	41,7%	18	52,9%	23	50,0%	10	32,3%	18	31,0%	28	31,5%
<i>Beperkt</i>	8	50,0%	15	78,9%	23	65,7%	6	50,0%	14	41,2%	20	43,5%	12	38,7%	34	58,6%	46	51,7%
<i>Ernstig</i>	4	25,0%	1	5,3%	5	14,3%	1	8,3%	2	5,9%	3	6,5%	5	16,1%	4	6,9%	9	10,1%
<i>Levensbedreigend</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4	12,9%	2	3,4%	6	6,7%
Aanmelding																		
<i>Op eigen initiatief</i>	0	0,0%	4	21,1%	4	11,4%	2	16,7%	8	23,5%	10	21,7%	2	6,5%	10	16,9%	12	13,3%
<i>Via 100</i>	11	68,8%	13	68,4%	24	68,6%	6	50,0%	19	55,9%	25	54,3%	24	77,4%*	24	40,7%*	48	53,3%
<i>Via politie</i>	1	6,3%	0	0,0%	1	2,9%	3	25,0%*	1	2,9%*	4	8,7%	4	12,9%*	0	0,0%*	4	4,4%
<i>Via huisarts/ vernijsbrief</i>	1	6,3%	2	10,5%	3	8,6%	0	0,0%	5	14,7%	5	10,9%	2	6,5%	8	13,6%	10	11,1%
<i>Via andere(n)</i>	5	31,3%	3	15,8%	8	22,9%	4	33,3%	8	23,5%	12	26,1%	8	25,8%	22	37,3%	30	33,3%
Poging onderbroken	12	80,0%	11	57,9%	23	67,6%	2	16,7%	8	24,2%	10	22,2%	16	53,3%	26	44,1%	42	47,2%

	AZ Vesalius						H. Hartziekenhuis						Jan Yperman ZH					
	Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Suïcidale gedachten na de poging																		
IPEO 1																		
<i>Nee</i>	7	46,7%	12	63,2%	19	55,9%	7	58,3%	18	52,9%	25	54,3%	7	35,0%	21	42,0%	28	40,0%
<i>Znuk</i>	4	26,7%	3	15,8%	7	20,6%	2	16,7%	8	23,5%	10	21,7%	3	15,0%	16	32,0%	19	27,1%
<i>Matig tot sterk</i>	4	26,7%	4	21,1%	8	23,5%	3	25,0%	8	23,5%	11	23,9%	10	50,0%	13	26,0%	23	32,9%
IPEO 2																		
<i>Nee</i>	9	60,0%	11	57,9%	20	58,8%	8	88,9%	19	61,3%	27	67,5%	9	64,3%	19	63,3%	28	63,6%
<i>Znuk</i>	2	13,3%	4	21,1%	6	17,6%	0	0,0%	8	25,8%	8	20,0%	1	7,1%	4	13,3%	5	11,4%
<i>Matig tot sterk</i>	4	26,7%	4	21,1%	8	23,5%	1	11,1%	4	12,9%	5	12,5%	4	28,6%	7	23,3%	11	25,0%
Suïcidale plannen na de poging																		
IPEO 1																		
<i>Niet over nagedacht</i>	3	37,5%	4	57,1%	7	46,7%	2	40,0%	7	43,8%	9	42,9%	4	36,4%	11	40,7%	15	39,5%
<i>Over nagedacht, maar details niet uitgewerkt</i>	3	37,5%	3	42,9%	6	40,0%	3	60,0%	5	31,3%	8	38,1%	3	27,3%	12	44,4%	15	39,5%
<i>Goed geformuleerd en details uitgewerkt</i>	2	25,0%	0	0,0%	2	13,3%	0	0,0%	4	25,0%	4	19,0%	4	36,4%	4	14,8%	8	21,1%
IPEO 2																		
<i>Niet over nagedacht</i>	1	16,7%	5	62,5%	6	42,9%	0	0,0%	7	58,3%	7	53,8%	1	20,0%	3	27,3%	4	25,0%
<i>Over nagedacht, maar details niet uitgewerkt</i>	3	50,0%	3	37,5%	6	42,9%	1	100,0%	3	25,0%	4	30,8%	3	60,0%	6	54,5%	9	56,3%
<i>Goed geformuleerd en details uitgewerkt</i>	2	33,3%	0	0,0%	2	14,3%	0	0,0%	2	16,7%	2	15,4%	1	20,0%	2	18,2%	3	18,8%
Hopeloosheid																		
<i>Negatieve anticipatie</i>	6	42,9%	8	47,1%	14	45,2%	3	27,3%	10	37,0%	13	34,2%	5	62,5%	10	37,0%	15	42,9%
<i>Positieve anticipatie</i>	5	35,7%	5	29,4%	10	32,3%	4	36,4%	8	29,6%	12	31,6%	0	0,0%	10	37,0%	10	28,6%
<i>Onzeker, ambivalent</i>	3	21,4%	4	23,5%	7	22,6%	4	36,4%	9	33,3%	13	34,2%	3	37,5%	7	25,9%	10	28,6%
Gevoelens na de poging																		
<i>Kwaadheid</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	6,1%	2	4,4%	1	5,3%	0	0,0%	1	1,6%
<i>Ambivalentie</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	8,3%	5	15,2%	6	13,3%	1	5,3%	0	0,0%	1	1,6%
<i>Spijt over mislukte poging</i>	4	25,0%	5	31,3%	9	28,1%	1	8,3%	4	12,1%	5	11,1%	3	15,8%	5	11,9%	8	13,1%
<i>Blij met mislukte poging</i>	1	6,3%	3	18,8%	4	12,5%	1	8,3%	7	21,2%	8	17,8%	1	5,3%	4	9,5%	5	8,2%
<i>Angst/ Onrust</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	3,0%	1	2,2%	1	5,3%	0	0,0%	1	1,6%
<i>Leegheid</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Depressief</i>	4	25,0%	4	25,0%	8	25,0%	2	16,7%	5	15,2%	7	15,6%	3	15,8%	8	19,0%	11	18,0%
<i>Schuld/ Schaamte</i>	0	0,0%	1	6,3%	1	3,1%	0	0,0%	5	15,2%	5	11,1%	1	5,3%	0	0,0%	1	1,6%
<i>Goed, positief</i>	0	0,0%	1	6,3%	1	3,1%	2	16,7%	1	3,0%	3	6,7%	0	0,0%	1	2,4%	1	1,6%
<i>Rustig</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	8,3%	1	3,0%	2	4,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Negatief</i>	3	18,8%	1	6,3%	4	12,5%	2	16,7%	7	21,2%	9	20,0%	1	5,3%	1	2,4%	2	3,3%
<i>Emotioneel</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	6,1%	2	4,4%	1	5,3%	1	2,4%	2	3,3%
<i>Minimalisatie van poging</i>	1	6,3%	0	0,0%	1	3,1%	1	8,3%	0	0,0%	1	2,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Te versuft</i>	2	12,5%	0	0,0%	2	6,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	10,5%	8	19,0%	10	16,4%
<i>Andere</i>	0	0,0%	2	12,5%	2	6,3%	1	8,3%	1	3,0%	2	4,4%	2	10,5%	3	7,1%	5	8,2%

	AZ Vesalius						H. Hartziekenhuis						Jan Yperman ZH					
	Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Ervaren problemen																		
<i>Partner</i>	9	60,0%	11	57,9%	20	58,8%	7	77,8%	15	48,4%	22	55,0%	9	64,3%	15	50,0%	24	54,5%
<i>Ouders</i>	7	46,7%	5	26,3%	12	35,3%	1	11,1%	7	22,6%	8	20,0%	3	21,4%	7	23,3%	10	22,7%
<i>Kinderen</i>	2	13,3%	5	26,3%	7	20,6%	1	11,1%	11	35,5%	12	30,0%	3	21,4%	8	26,7%	11	25,0%
<i>Eenzaamheid</i>	5	33,3%	6	31,6%	11	32,4%	4	44,4%	19	61,3%	23	57,5%	3	21,4%	8	26,7%	11	25,0%
<i>Sociale relaties</i>	4	26,7%	1	5,3%	5	14,7%	1	11,1%	5	16,1%	6	15,0%	2	14,3%	5	16,7%	7	15,9%
<i>Afnijzing door geliefde</i>	5	33,3%	4	21,1%	9	26,5%	3	33,3%	10	32,3%	13	32,5%	5	35,7%	5	16,7%	10	22,7%
<i>Gezondheid</i>	1	6,7%	5	26,3%	6	17,6%	1	11,1%	7	22,6%	8	20,0%	0	0,0%	4	13,3%	4	9,1%
<i>Psychisch/ psychiatrisch</i>	9	60,0%	11	57,9%	20	58,8%	6	66,7%	27	87,1%	33	82,5%	6	42,9%	16	53,3%	22	50,0%
<i>Werk</i>	8	53,3%*	2	10,5%*	10	29,4%	1	11,1%	8	25,8%	9	22,5%	1	7,1%	4	13,3%	5	11,4%
<i>Justitie</i>	4	26,7%*	0	0,0%*	4	11,8%	0	0,0%	1	3,2%	1	2,5%	3	21,4%	0	0,0%	3	6,8%
<i>Wonen</i>	3	20,0%	1	5,3%	4	11,8%	0	0,0%	1	3,2%	1	250,0%	0	0,0%	1	3,3%	1	2,3%
<i>Financiën</i>	7	46,7%	6	31,6%	13	38,2%	2	22,2%	4	12,9%	6	15,0%	1	7,1%	7	23,3%	8	18,2%
<i>School</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	3,2%	1	2,5%	0	0,0%	1	3,3%	1	2,3%
<i>Seksuele oriëntatie</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	3,3%	1	2,3%
<i>Overlijden/ ziekte sign. pers.</i>	2	13,3%	5	26,3%	7	20,6%	0	0,0%	5	16,1%	5	12,5%	5	35,7%	3	10,0%	8	18,2%
<i>ZMP, ZM sign. pers.</i>	1	6,7%	0	0,0%	1	2,9%	0	0,0%	4	12,9%	4	10,0%	1	7,1%	4	13,3%	5	11,4%
<i>Traumatische gebeurtenis</i>	1	6,7%	5	26,3%	6	17,6%	1	11,1%	7	22,6%	8	20,0%	2	14,3%	6	20,0%	8	18,2%
Motieven																		
<i>Vreselijke gedachten</i>	0	0,0%	2	10,5%	2	5,7%	3	33,3%	10	33,3%	13	33,3%	0	0,0%	6	20,0%	6	13,6%
<i>Weg willen</i>	5	31,3%	9	47,4%	14	40,0%	2	22,2%	14	46,7%	16	41,0%	4	28,6%	17	56,7%	21	47,7%
<i>Ondraaglijke situatie</i>	4	25,0%	4	21,1%	8	22,9%	3	33,3%	14	46,7%	17	43,6%	6	42,9%	17	56,7%	23	52,3%
<i>Controleverlies</i>	2	12,5%	0	0,0%	2	5,7%	0	0,0%	3	10,0%	3	7,7%	2	14,3%	5	16,7%	7	15,9%
<i>Zichzelf straffen</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Mislukking voelen</i>	2	12,5%	0	0,0%	2	5,7%	2	22,2%	10	33,3%	12	30,8%	0	0,0%	4	13,3%	4	9,1%
<i>Hulp zoeken</i>	0	0,0%	1	5,3%	1	2,9%	0	0,0%	1	3,3%	1	2,6%	0	0,0%	1	3,3%	1	2,3%
<i>Ontreddering tonen</i>	2	12,5%	4	21,1%	6	17,1%	1	11,1%	7	23,3%	8	20,5%	1	7,1%	3	10,0%	4	9,1%
<i>Liefde tonen</i>	1	6,3%	3	15,8%	4	11,4%	1	11,1%	1	3,3%	2	5,1%	2	14,3%	4	13,3%	6	13,6%
<i>In vraag stellen liefde</i>	2	12,5%	2	10,5%	4	11,4%	1	11,1%	2	6,7%	3	7,7%	1	7,1%	4	13,3%	5	11,4%
<i>Mening beïnvloeden</i>	1	6,3%	4	21,1%	5	14,3%	1	11,1%	3	10,0%	4	10,3%	2	14,3%	3	10,0%	5	11,4%
<i>Spijt doen krijgen</i>	0	0,0%	2	10,5%	2	5,7%	1	11,1%	4	13,3%	5	12,8%	0	0,0%	1	3,3%	1	2,3%
<i>Iemand bang maken</i>	1	6,3%	0	0,0%	1	2,9%	0	0,0%	1	3,3%	1	2,6%	1	7,1%	1	3,3%	2	4,5%
<i>Kwaad zijn op iemand</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	11,1%	0	0,0%	1	2,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Willen sterren</i>	9	56,3%	9	47,4%	18	51,4%	2	22,2%	7	23,3%	9	23,1%	4	28,6%	10	33,3%	14	31,8%

	AZ Vesalius						H. Hartziekenhuis						Jan Yperman ZH					
	Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Suïcidale intentie																		
<i>Laag</i>	6	42,9%*	13	86,7%*	19	65,5%	4	44,4%	21	70,0%	25	64,1%	9	64,3%	17	56,7%	26	59,1%
<i>Hoog</i>	8	57,1%*	2	13,3%*	10	34,5%	5	55,6%	9	30,0%	14	35,9%	5	35,7%	13	43,3%	18	40,9%
Ambivalentie tov het leven																		
<i>Niet willen sterven</i>	3	20,0%	3	16,7%	6	18,2%	5	55,6%	13	43,3%	18	46,2%	7	50,0%	12	41,4%	19	44,2%
<i>Onverschilligheid</i>	4	26,7%	6	33,3%	10	30,3%	2	22,2%	10	33,3%	12	30,8%	2	14,3%	7	24,1%	9	20,9%
<i>Willen sterven</i>	8	53,3%	9	50,0%	17	51,5%	2	22,2%	7	23,3%	9	23,1%	5	35,7%	10	34,5%	15	34,9%
Zorgbehoeften																		
<i>Op vormelijk niveau</i>	6	46,2%	7	46,7%	13	46,4%	2	22,2%	9	29,0%	11	27,5%	4	33,3%	11	44,0%	15	40,5%
<i>Op inhoudelijk niveau</i>	1	7,7%	0	0,0%	1	3,6%	2	22,2%	8	25,8%	10	25,0%	1	8,3%	5	20,0%	6	16,2%
<i>Op beide niveaus</i>	0	0,0%	1	6,7%	1	3,6%	4	44,4%	3	9,7%	7	17,5%	1	8,3%	3	12,0%	4	10,8%
<i>Geen van beide niveaus</i>	6	46,2%	7	46,7%	13	46,4%	1	11,1%	11	35,5%	12	30,0%	6	50,0%	6	24,0%	12	32,4%
Zorgtraject																		
Geen verdere behandeling	1	6,3%	5	26,3%	6	17,1%	4	36,4%	3	9,7%	7	16,7%	4	21,1%	9	20,0%	13	20,3%
<i>Ontslag op advies</i>	0	0,0%	4	21,1%	4	11,4%	4	36,4%*	2	6,5%*	6	14,3%	2	10,5%	8	17,8%	10	15,6%
<i>Ontslag op tegenadvies</i>	1	6,3%	1	5,3%	2	5,7%	0	0,0%	1	3,2%	1	2,4%	2	10,5%	1	2,2%	3	4,7%
<i>Terugkeer naar begeleidingsdienst</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,2%	1	1,6%
Ambulante behandeling	6	37,5%	8	42,1%	14	40,0%	3	27,3%	18	58,1%	21	50,0%	3	15,8%	17	37,8%	20	31,3%
Residentieële behandeling	9	56,3%	6	31,6%	15	42,9%	4	36,4%	10	32,3%	14	33,3%	7	36,8%	15	33,3%	22	34,4%
<i>Somatische behandeling</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Urgentiepsychiatrie</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Intramurale PAAZ</i>	1	6,3%	0	0,0%	1	2,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	6,7%	3	4,7%
<i>Extramurale PAAZ</i>	4	25,0%	5	26,3%	9	25,7%	0	0,0%	3	9,7%	3	7,1%	0	0,0%	1	2,2%	1	1,6%
<i>PZ of PVT</i>	4	25,0%	1	5,3%	5	14,3%	4	36,4%	7	22,6%	11	26,2%	7	36,8%	11	24,4%	18	28,1%

Mariaziekenhuis O.L.V. van Lourdes ZH OLV Ziekenhuis Aalst-Asse

	Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Rates														
PB	10 (M: 3, V: 7)	100,0%	25	38,5%	40	61,5%	65	100,0%	36	35,0%	67	65,0%	103	100,0%
EB	10 (M: 3, V: 7)	100,0%	26	39,4%	40	60,6%	66	100,0%	36	33,3%	72	66,7%	108	100,0%
PB factoren														
Gemiddelde leeftijd	46,4		40,6		38,5		39,3		38,9		42,1		41	
Woonsituatie														
<i>Alleen</i>	6	60,0%	9	36,0%	10	26,3%	19	30,2%	16	50,0%*	14	22,2%*	30	31,6%
<i>Niet alleen</i>	4	40,0%	16	64,0%	28	73,7%	44	69,8%	16	50,0%*	49	77,8%*	65	68,4%
Burgerlijke staat														
<i>Nooit gehuwd</i>	2	20,0%	7	28,0%	16	41,0%	23	35,9%	11	34,4%	15	25,0%	26	28,3%
<i>Gehuwd</i>	3	30,0%	9	36,0%	15	38,4%	24	37,5%	9	28,1%	20	33,4%	29	31,6%
<i>Weduwe(naar)</i>	1	10,0%	0	0,0%	1	2,6%	1	1,6%	1	3,1%	4	6,7%	5	5,4%
<i>Gescheiden</i>	4	40,0%	7	28,0%	4	10,3%	11	17,2%	8	25,0%	11	18,3%	19	20,7%
<i>Officieel samenwonend</i>	0	0,0%	2	8,0%	3	7,7%	5	7,8%	3	9,4%	10	16,7%	13	14,1%
Kinderen														
<i>Ja</i>	7	70,0%	15	62,5%	17	45,9%	32	52,5%	13	46,4%	40	67,8%	53	60,9%
<i>Nee</i>	3	30,0%	9	37,5%	20	54,1%	29	47,5%	15	53,6%	19	32,2%	34	39,1%
Economische toestand														
<i>Werkend</i>	5	50,0%	15	65,2%	17	48,6%	32	55,2%	16	51,6%	27	46,6%	43	48,3%
<i>Werkloos</i>	2	20,0%	2	8,7%	5	14,3%	7	12,1%	4	12,9%	14	24,1%	18	20,2%
<i>Economisch inactief</i>	3	30,0%	6	26,1%	13	37,1%	19	32,8%	11	35,5%	17	29,3%	28	31,5%
<i>Student</i>	0	100,0%	2	33,3%	5	38,5%	7	36,8%	3	30,0%	4	26,7%	7	28,0%
<i>Invalide</i>	2	66,7%	2	33,3%	5	38,5%	7	36,8%	3	30,0%	4	26,7%	7	28,0%
<i>Gepensioneerd</i>	1	33,3%	2	33,3%	3	23,1%	5	26,3%	4	40,0%	7	46,7%	11	44,0%
Psychiatrische behandeling in voorgeschiedenis														
<i>Geen</i>	2	25,0%	6	35,3%	13	40,6%	19	38,8%	5	29,4%	11	27,5%	16	28,1%
<i>Huisarts</i>	1	12,5%	3	17,6%	5	15,6%	8	16,3%	1	5,9%	3	7,5%	4	7,0%
<i>Ambulante behandeling</i>	2	25,0%	6	35,3%	11	34,4%	17	34,7%	6	35,3%	17	42,5%	23	40,4%
<i>Residentiële behandeling</i>	5	62,5%	6	35,3%	8	25,0%	14	28,6%	5	29,4%	13	32,5%	18	31,6%
Sociaal netwerk														
<i>Niemand</i>	1	11,1%	6	27,3%	7	21,2%	13	23,6%	3	12,5%	2	3,9%	5	6,7%
<i>Partner</i>	5	55,6%	4	18,2%	11	33,3%	15	27,3%	8	33,3%	23	45,1%	31	41,3%
<i>Familie</i>	4	44,4%	11	50,0%	16	48,5%	27	49,1%	15	62,5%	35	68,6%	50	66,7%
<i>Vriend(in)</i>	1	11,1%	3	13,6%	3	9,1%	6	10,9%	9	37,5%	9	17,6%	18	24,0%
<i>Andere</i>	1	11,1%	0	0,0%	1	3,0%	1	1,8%	3	12,5%	1	2,0%	4	5,3%

Mariaziekenhuis O.L.V. van Lourdes ZH OLV Ziekenhuis Aalst-Asse

	Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Voorgeschiedenis van suïcidaal gedrag														
<i>Geen</i>	4	40,0%	13	59,1%	21	58,3%	34	58,6%	20	71,4%*	25	44,6%*	45	53,6%
<i>1</i>	0	0,0%	4	18,2%	5	13,9%	9	15,5%	3	10,7%*	18	32,1%*	21	25,0%
<i>2</i>	1	10,0%	2	9,1%	5	13,9%	7	12,1%	4	14,3%	6	10,7%	10	11,9%
<i>3</i>	0	0,0%	1	4,5%	1	2,8%	2	3,4%	0	0,0%	3	5,4%	3	3,6%
<i>4 of meerdere</i>	5	50,0%	2	9,1%	4	11,1%	6	10,3%	1	3,6%	4	7,1%	5	6,0%
<i>Meerdere, aantal onbekend</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Tijdsinterval tussen suïcidepogingen														
<i>< 12 maanden</i>	2	33,3%	6	66,7%	7	46,7%	13	54,2%	7	77,8%	16	51,6%	23	57,5%
<i>>12 maanden</i>	4	66,7%	3	33,3%	8	53,3%	11	45,8%	2	22,2%	15	48,4%	17	42,5%
Medische behandeling														
<i>Ja</i>	5	83,3%	8	88,9%	12	85,7%	20	87,0%	6	66,7%	21	67,7%	27	67,5%
<i>Ziekenhuis</i>	3	60,0%	8	100,0%	11	91,7%	19	95,0%	3	60,0%*	18	85,7%*	21	80,8%
<i>Huisarts</i>	2	40,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	40,0%	0	0,0%	2	7,7%
<i>Andere</i>	0	0,0%	0	0,0%	1	8,3%	1	5,0%	0	0,0%	3	14,3%	3	11,5%
<i>Nee</i>	1	16,7%	1	11,1%	2	14,3%	3	13,0%	3	33,3%	10	32,3%	13	32,5%
Psychische behandeling														
<i>Ja</i>	2	33,3%	8	88,9%	12	85,7%	20	87,0%	3	37,5%	21	70,0%	24	63,2%
<i>Nee</i>	4	66,7%	1	11,1%	2	14,3%	3	13,0%	5	62,5%	9	30,0%	14	36,8%
Alcohol- en middelenmisbruik														
<i>Geen vermoeden</i>	7	87,5%	15	78,9%	24	75,0%	39	76,5%	7	50,0%	26	78,8%	33	70,2%
<i>Mogelijk misbruik</i>	0	0,0%	1	5,3%	1	3,1%	2	3,9%	1	7,1%	2	6,1%	3	6,4%
<i>Waarschijnlijk misbruik</i>	1	12,5%	3	15,8%	7	21,9%	10	19,6%	6	42,9%	5	15,2%	11	23,4%
As I diagnose														
<i>Geen AS I diagnose geformuleerd</i>	1	20,0%	0	0,0%	1	4,8%	1	2,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Stemmingsst.</i>	2	40,0%	7	50,0%	7	33,3%	14	40,0%	2	28,6%	5	21,7%	7	23,3%
<i>Middelenmisbruik</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Stemming + middelenmisbruik</i>	0	0,0%	0	0,0%	2	9,5%	2	5,7%	0	0,0%	2	8,7%	2	6,7%
<i>Acute aanpassingsstoornis</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	4,3%	1	3,3%
<i>Andere</i>	0	0,0%	1	7,1%	0	0,0%	1	2,9%	1	14,3%	0	0,0%	1	3,3%
<i>Enkel probleembeschrijving</i>	2	40,0%	6	42,9%	11	52,4%	17	48,6%	4	57,1%	15	65,2%	19	63,3%
As II diagnose														
<i>Geen AS II diagnose geformuleerd</i>	4	80,0%	14	100,0%	20	95,2%	34	97,1%	7	100,0%	22	95,7%	29	96,7%
<i>Cluster B</i>	1	20,0%	0	0,0%	1	4,8%	1	2,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Andere</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Uitgesteld</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	4,3%	1	3,3%

Mariaziekenhuis O.L.V. van Lourdes ZH OLV Ziekenhuis Aalst-Asse

	Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
EB factoren														
Situering in de tijd														
Maand van suïcidepoging														
<i>Januari</i>	5	50,0%							0	0,0%	3	4,2%	3	2,9%
<i>Februari</i>	2	20,0%	4	15,4%	7	17,9%	11	16,9%	2	6,3%	3	4,2%	5	4,9%
<i>Maart</i>	1	10,0%	5	19,2%	4	10,3%	9	13,8%	3	9,4%	10	14,1%	13	12,6%
<i>April</i>	1	10,0%	1	3,8%	1	2,6%	2	3,1%	2	6,3%	4	5,6%	6	5,8%
<i>Mei</i>	0	0,0%	1	3,8%	3	7,7%	4	6,2%	3	9,4%	9	12,7%	12	11,7%
<i>Juni</i>	0	0,0%	0	0,0%	2	5,1%	2	3,1%	1	3,1%	8	11,3%	9	8,7%
<i>Juli</i>	0	0,0%	0	0,0%	2	5,1%	2	3,1%	0	0,0%	7	9,9%	7	6,8%
<i>Augustus</i>	0	0,0%	0	0,0%	5	12,8%	5	7,7%	2	6,3%	4	5,6%	6	5,8%
<i>September</i>	0	0,0%	0	0,0%	1	2,6%	1	1,5%	5	15,6%	5	7,0%	10	9,7%
<i>Oktober</i>	1	10,0%	5	19,2%	6	15,4%	11	16,9%	7	21,9%	5	7,0%	12	11,7%
<i>November</i>	0	0,0%	6	23,1%	7	17,9%	13	20,0%	3	9,4%	7	9,9%	10	9,7%
<i>December</i>	0	0,0%	4	15,4%	1	2,6%	5	7,7%	4	12,5%	6	8,5%	10	9,7%
Tijdstip van suïcidepoging														
<i>Ochtend</i>	1	11,1%	4	21,1%	8	22,9%	12	22,2%	6	24,0%	11	23,9%	17	23,9%
<i>(Na)middag</i>	4	44,4%	5	26,3%	14	40,0%	19	35,2%	6	24,0%	15	32,6%	21	29,6%
<i>Avond</i>	4	44,4%	5	26,3%	11	31,4%	16	29,6%	8	32,0%	15	32,6%	23	32,4%
<i>Nacht</i>	0	0,0%	5	26,3%	2	5,7%	7	13,0%	5	20,0%	5	10,9%	10	14,1%
Methode														
<i>Zelfvergiftiging</i>	7	70,0%	13	50,0%*	33	84,6%*	46	70,8%	29	82,9%	60	87,0%	89	85,6%
<i>Zelfverwonding</i>	1	10,0%	6	23,1%	5	12,8%	11	16,9%	4	11,4%	4	5,8%	8	7,7%
<i>Combinatie zelfvergiftiging en -verwonding</i>	2	20,0%	7	26,9%*	1	2,6%*	8	12,3%	2	5,7%	5	7,2%	7	6,7%
Alcoholiname tijdens poging														
<i>Alcohol</i>	1	10,0%	10	38,5%	16	41,0%	26	40,0%	15	42,9%*	16	23,2%*	31	29,8%
Ernst letsel														
<i>Geen</i>	4	40,0%	8	32,0%	16	42,1%	24	38,1%	6	18,8%*	24	39,3%*	30	32,3%
<i>Beperkt</i>	4	40,0%	13	52,0%	17	44,7%	30	47,6%	20	62,5%	31	50,8%	51	54,8%
<i>Ernstig</i>	0	0,0%	2	8,0%	4	10,5%	6	9,5%	3	9,4%	4	6,6%	7	7,5%
<i>Levensbedreigend</i>	2	20,0%	2	8,0%	1	2,6%	3	4,8%	3	9,4%	2	3,3%	5	5,4%
Aanmelding														
<i>Op eigen initiatief</i>	1	10,0%	6	23,1%	4	10,0%	10	15,2%	4	11,1%	12	16,7%	16	14,8%
<i>Via 100</i>	3	30,0%	11	42,3%	17	42,5%	28	42,4%	19	52,8%	47	65,3%	66	61,1%
<i>Via politie</i>	3	30,0%	1	3,8%	0	0,0%	1	1,5%	2	5,6%	1	1,4%	3	2,8%
<i>Via huisarts/ vernijsbrief</i>	2	20,0%	2	7,7%	8	20,0%	10	15,2%	1	2,8%	6	8,3%	7	6,5%
<i>Via andere(n)</i>	4	40,0%	8	30,8%	13	32,5%	21	31,8%	5	13,9%	9	12,5%	14	13,0%
Poging onderbroken														
<i>Poging onderbroken</i>	5	50,0%	15	57,7%	16	41,0%	31	47,7%	9	29,0%	19	30,6%	28	30,1%

Mariaziekenhuis O.L.V. van Lourdes ZH OLV Ziekenhuis Aalst-Asse

	Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Suïcidale gedachten na de poging														
IPEO 1														
<i>Nee</i>	5	50,0%	8	38,1%	13	40,6%	21	39,6%	16	59,3%	24	47,1%	40	51,3%
<i>Znuk</i>	3	30,0%	6	28,6%	10	31,3%	16	30,2%	3	11,1%	13	25,5%	16	20,5%
<i>Matig tot sterk</i>	2	20,0%	7	33,3%	9	28,1%	16	30,2%	8	29,6%	14	27,5%	22	28,2%
IPEO 2														
<i>Nee</i>	4	44,4%	16	72,7%	23	65,7%	39	68,4%	10	66,7%	24	68,6%	34	68,0%
<i>Znuk</i>	2	22,2%	5	22,7%	7	20,0%	12	21,1%	3	20,0%	5	14,3%	8	16,0%
<i>Matig tot sterk</i>	3	33,3%	1	4,5%	5	14,3%	6	10,5%	2	13,3%	6	17,1%	8	16,0%
Suïcidale plannen na de poging														
IPEO 1														
<i>Niet over nagedacht</i>	2	40,0%	2	15,4%	8	44,4%	10	32,3%	0	0,0%*	7	31,8%*	7	21,9%
<i>Over nagedacht, maar details niet uitgewerkt</i>	3	60,0%	9	69,2%	10	55,6%	19	61,3%	6	60,0%	10	45,5%	16	50,0%
<i>Goed geformuleerd en details uitgewerkt</i>	0	0,0%	2	15,4%	0	0,0%	2	6,5%	4	40,0%	5	22,7%	9	28,1%
IPEO 2														
<i>Niet over nagedacht</i>	2	40,0%	3	50,0%	5	45,5%	8	47,1%	1	25,0%	3	30,0%	4	28,6%
<i>Over nagedacht, maar details niet uitgewerkt</i>	2	40,0%	3	50,0%	5	45,5%	8	47,1%	3	75,0%	3	30,0%	6	42,9%
<i>Goed geformuleerd en details uitgewerkt</i>	1	20,0%	0	0,0%	1	9,1%	1	5,9%	0	0,0%	4	40,0%	4	28,6%
Hopeloosheid														
<i>Negatieve anticipatie</i>	2	33,3%	12	75,0%	14	66,7%	26	70,3%	5	35,7%	17	56,7%	22	50,0%
<i>Positieve anticipatie</i>	3	50,0%	2	12,5%	1	4,8%	3	8,1%	7	50,0%	8	26,7%	15	34,1%
<i>Onzeker, ambivalent</i>	1	16,7%	2	12,5%	6	28,6%	8	21,6%	2	14,3%	5	16,7%	7	15,9%
Gevoelens na de poging														
<i>Kwaadheid</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	13,0%*	0	0,0%*	3	4,5%
<i>Ambivalentie</i>	0	0,0%	1	4,5%	1	3,1%	2	3,7%	0	0,0%	3	7,0%	3	4,5%
<i>Spijt over mislukte poging</i>	3	33,3%	7	31,8%	6	18,8%	13	24,1%	3	13,0%	8	18,6%	11	16,7%
<i>Blij met mislukte poging</i>	2	22,2%	2	9,1%	1	3,1%	3	5,6%	0	0,0%	1	2,3%	1	1,5%
<i>Angst/ Onrust</i>	1	11,1%	0	0,0%	1	3,1%	1	1,9%	0	0,0%	1	2,3%	1	1,5%
<i>Leegheid</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	4,3%	1	2,3%	2	3,0%
<i>Depressief</i>	1	11,1%	4	18,2%	6	18,8%	10	18,5%	4	17,4%	6	14,0%	10	15,2%
<i>Schuld/ Schaamte</i>	1	11,1%	0	0,0%	1	3,1%	1	1,9%	0	0,0%	3	7,0%	3	4,5%
<i>Goed, positief</i>	2	22,2%	0	0,0%	1	3,1%	1	1,9%	3	13,0%	4	9,3%	7	10,6%
<i>Rustig</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	4,7%	2	3,0%
<i>Negatief</i>	1	11,1%	4	18,2%	2	6,3%	6	11,1%	2	8,7%*	13	30,2%*	15	22,7%
<i>Emotioneel</i>	0	0,0%	2	9,1%	0	0,0%	2	3,7%	1	4,3%	3	7,0%	4	6,1%
<i>Minimalisatie van poging</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Te versuft</i>	1	11,1%	2	9,1%	6	18,8%	8	14,8%	0	0,0%	1	2,3%	1	1,5%
<i>Andere</i>	2	22,2%	1	4,5%	3	9,4%	4	7,4%	4	17,4%	3	7,0%	7	10,6%

Mariaziekenhuis O.L.V. van Lourdes ZH OLV Ziekenhuis Aalst-Asse

	Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Ervaren problemen														
<i>Partner</i>	5	55,6%	11	50,0%	17	48,6%	28	49,1%	9	60,0%	19	54,3%	28	56,0%
<i>Ouders</i>	5	55,6%	3	13,6%	10	28,6%	13	22,8%	8	53,3%	10	28,6%	18	36,0%
<i>Kinderen</i>	3	33,3%	1	4,5%	6	17,1%	7	12,3%	4	16,7%	7	20,0%	11	22,0%
<i>Eenzaamheid</i>	3	33,3%	9	40,9%	14	40,0%	23	40,4%	7	46,7%	21	60,0%	28	56,0%
<i>Sociale relaties</i>	2	22,2%	3	13,6%	6	17,1%	9	15,8%	3	20,0%	8	22,9%	11	22,0%
<i>Afnijzing door geliefde</i>	1	11,1%	9	40,9%	7	20,0%	16	28,1%	9	60,0%*	7	20,0%*	16	32,0%
<i>Gezondheid</i>	2	22,2%	6	27,3%	5	14,3%	11	19,3%	6	40,0%	13	37,1%	19	38,0%
<i>Psychisch/ psychiatisch</i>	7	77,8%	11	50,0%	18	51,4%	29	50,9%	7	46,7%	14	40,0%	21	42,0%
<i>Werk</i>	3	33,3%	6	27,3%	11	31,4%	17	29,8%	8	53,3%*	8	22,9%*	16	32,0%
<i>Justitie</i>	1	11,1%	0	0,0%	1	2,9%	1	1,8%	4	26,7%	2	5,7%	6	12,0%
<i>Wonen</i>	2	22,2%	0	0,0%	2	5,7%	2	3,5%	3	20,0%	7	20,0%	10	20,0%
<i>Financiën</i>	4	44,4%	5	22,7%	7	20,0%	12	21,1%	5	33,3%	6	17,1%	11	22,0%
<i>School</i>	0	0,0%	1	4,5%	2	5,7%	3	5,3%	0	0,0%	1	2,9%	1	2,0%
<i>Seksuele oriëntatie</i>	0	0,0%	2	9,1%	0	0,0%	2	3,5%	1	6,7%	2	5,7%	3	6,0%
<i>Overlijden/ ziekte sign. pers.</i>	2	22,2%	0	0,0%	5	14,3%	5	8,8%	2	13,3%*	15	42,9%*	17	34,0%
<i>ZMP, ZM sign. pers.</i>	2	22,2%	2	9,1%	1	2,9%	3	5,3%	1	6,7%	5	14,3%	6	12,0%
<i>Traumatische gebeurtenis</i>	0	0,0%	3	13,6%	7	20,0%	10	17,5%	3	20,0%	7	20,0%	10	20,0%
Motieven														
<i>Vreselijke gedachten</i>	2	25,0%	8	36,4%	12	34,3%	20	35,1%	10	66,7%	17	48,6%	27	54,0%
<i>Weg willen</i>	1	12,5%	4	18,2%	7	20,0%	11	19,3%	9	60,0%	21	60,0%	30	60,0%
<i>Ondraaglijke situatie</i>	4	50,0%	12	54,5%	16	45,7%	28	49,1%	10	66,7%	27	77,1%	37	74,0%
<i>Controleverlies</i>	3	37,5%	3	13,6%	3	8,6%	6	10,5%	5	33,3%	16	45,7%	21	42,0%
<i>Zichzelf straffen</i>	0	0,0%	0	0,0%	1	2,9%	1	1,8%	1	6,7%	3	8,6%	4	8,0%
<i>Mislukking voelen</i>	0	0,0%	2	9,1%	8	22,9%	10	17,5%	5	33,3%	11	31,4%	16	32,0%
<i>Hulp zoeken</i>	1	12,5%	1	4,5%	0	0,0%	1	1,8%	6	40,0%	6	17,1%	12	24,0%
<i>Ontreddering tonen</i>	0	0,0%	5	22,7%	10	28,6%	15	26,3%	6	40,0%	9	25,7%	15	30,0%
<i>Liefde tonen</i>	0	0,0%	1	4,5%	1	2,9%	2	3,5%	5	33,3%	7	20,0%	12	24,0%
<i>In vraag stellen liefde</i>	0	0,0%	1	4,5%	0	0,0%	1	1,8%	2	13,3%	4	11,4%	6	12,0%
<i>Mening beïnvloeden</i>	0	0,0%	0	0,0%	1	2,9%	1	1,8%	1	6,7%	6	17,1%	7	14,0%
<i>Spijt doen krijgen</i>	0	0,0%	0	0,0%*	8	22,9%*	8	14,0%	2	13,3%	6	17,1%	8	16,0%
<i>Iemand bang maken</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4	11,4%	4	8,0%
<i>Kwaad zijn op iemand</i>	0	0,0%	1	4,5%	6	17,1%	7	12,3%	1	6,7%	6	17,1%	7	14,0%
<i>Willen sterren</i>	6	75,0%	9	40,9%	16	45,7%	25	43,9%	10	66,7%	20	57,1%	30	60,0%

Mariaziekenhuis O.L.V. van Lourdes ZH OLV Ziekenhuis Aalst-Asse

	Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Suïcidale intentie														
<i>Laag</i>	3	33,3%	10	47,6%*	27	77,1%*	37	66,1%	2	13,3%*	19	54,3%*	21	42,0%
<i>Hoog</i>	6	66,7%	11	52,4%*	8	22,9%*	19	33,9%	13	86,7%*	16	45,7%*	29	58,0%
Ambivalentie tov het leven														
<i>Niet willen sterven</i>	2	22,2%	3	16,7%	11	32,4%	14	26,9%	2	14,3%	7	20,6%	9	18,8%
<i>Onverschilligheid</i>	1	11,1%	5	27,8%	10	29,4%	15	28,8%	3	21,4%	11	32,4%	14	29,2%
<i>Willen sterven</i>	6	66,7%	10	55,6%	13	38,2%	23	44,2%	9	64,3%	16	47,1%	25	52,1%
Zorgbehoeften														
<i>Op vormelijk niveau</i>	1	16,7%	2	11,8%	5	20,8%	7	17,1%	3	23,1%	2	7,1%	5	12,2%
<i>Op inhoudelijk niveau</i>	5	0,0%	6	35,3%	7	29,2%	13	31,7%	2	15,4%	8	28,6%	10	24,4%
<i>Op beide niveaus</i>	0	0,0%	2	11,8%	1	4,2%	3	7,3%	3	23,1%	6	21,4%	9	22,0%
<i>Geen van beide niveaus</i>	0	0,0%	7	41,2%	11	45,8%	18	43,9%	5	38,5%	12	42,9%	17	41,5%
Zorgtraject														
Geen verdere behandeling	1	14,3%	5	23,8%	4	12,9%	9	17,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Ontslag op advies</i>	1	14,3%	2	9,5%	3	9,7%	5	9,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Ontslag op tegenadvies</i>	0	0,0%	3	14,3%	1	3,2%	4	7,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Terugkeer naar begeleidingsdienst</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ambulante behandeling	0	0,0%	4	19,0%	12	38,7%	16	30,8%	0	0,0%	1	3,0%	1	2,3%
Residentiële behandeling	6	85,7%	14	66,7%	20	64,5%	34	65,4%	11	100,0%	33	100,0%	44	100,0%
<i>Somatische behandeling</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	3,0%	1	2,3%
<i>Urgentiepsychiatrie</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	9,1%	0	0,0%	1	2,3%
<i>Intramurale PAAZ</i>	5	71,4%	13	61,9%	16	51,6%	29	55,8%	10	90,9%	30	90,9%	40	90,9%
<i>Extramurale PAAZ</i>	1	14,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	6,1%	2	4,5%
<i>PZ of PVT</i>	0	0,0%	0	0,0%	3	9,7%	3	5,8%	1	9,1%	1	3,0%	2	4,5%

	RZ Sint-Maria						RZ Sint-Trudo						AZ Salvator	
	Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Rates														
PB	8	30,8%	18	69,2%	26	100,0%	22	27,8%	57	72,2%	79	100,0%	10 (M: 4, V: 6) 100,0%	
EB	8	30,8%	18	69,2%	26	100,0%	22	26,8%	60	73,2%	82	100,0%	10 (M: 4, V: 6) 100,0%	
PB factoren														
Gemiddelde leeftijd	42,5		42,9		42,8		40,4		39,8		39,9		35,0	
Woonsituatie														
Alleen	3	42,9%	4	22,2%	7	28,0%	9	40,9%*	11	19,3%*	20	25,3%	1	11,1%
Niet alleen	4	57,1%	14	77,8%	18	72,0%	13	59,1%*	46	80,7%*	59	74,7%	8	88,9%
Burgerlijke staat														
Nooit gehuwd	3	42,9%	3	16,7%	6	24,0%	12	54,5%*	17	30,4%*	29	37,2%	3	33,3%
Gehuwd	2	28,0%	5	27,8%	7	28,0%	5	22,7%	17	30,4%	22	28,2%	2	22,2%
Weduwe(naar)	1	14,3%	1	5,6%	2	8,0%	0	0,0%	5	8,9%	5	6,4%	0	0,0%
Gescheiden	1	14,3%	7	38,9%	8	32,0%	4	18,2%	15	26,8%	19	24,4%	1	11,1%
Officieel samenwonend	0	0,0%	2	11,1%	2	8,0%	1	4,5%	2	3,6%	3	3,8%	3	33,3%
Kinderen														
Ja	5	71,4%	14	77,8%	19	76,0%	13	59,1%	37	64,9%	50	63,3%	5	55,6%
Nee	2	28,6%	4	22,2%	6	24,0%	9	40,9%	20	35,1%	29	36,7%	4	44,4%
Economische toestand														
Werkend	3	42,9%	7	38,9%	10	40,0%	10	45,5%	21	37,5%	31	39,7%	5	50,0%
Werkloos	1	14,3%	2	11,1%	3	12,0%	4	18,2%	7	12,5%	11	14,1%	1	10,0%
Economisch inactief	3	42,9%	9	50,0%	12	48,0%	8	36,4%	28	50,0%	36	46,2%	4	40,0%
Student	0	0,0%	2	22,2%	2	16,7%	1	16,7%	11	50,0%	12	42,9%	2	100,0%
Invalide	2	66,7%	5	55,6%	7	58,3%	3	50,0%	5	22,7%	8	28,6%	0	0,0%
Gepensioneerd	1	33,3%	2	22,2%	3	25,0%	2	33,3%	6	27,3%	8	28,6%	0	0,0%
Psychiatrische behandeling in voorgeschiedenis														
Geen	1	20,0%	3	18,8%	4	19,0%	9	47,4%	16	30,2%	25	34,7%	4	40,0%
Huisarts	0	0,0%	3	18,8%	3	14,3%	0	0,0%	4	7,5%	4	5,6%	0	0,0%
Ambulante behandeling	3	60,0%	5	31,3%	8	38,1%	8	42,1%	25	47,2%	33	45,8%	4	40,0%
Residentiële behandeling	2	40,0%	7	43,8%	9	42,9%	4	21,1%	15	28,3%	19	26,4%	3	30,0%
Sociaal netwerk														
Niemand	1	14,3%	3	16,7%	4	16,0%	3	13,6%	9	15,8%	12	15,2%	0	0,0%
Partner	1	14,3%	7	38,9%	8	32,0%	2	9,1%	11	19,3%	13	16,5%	4	40,0%
Familie	4	57,1%	10	55,6%	14	56,0%	12	54,5%	34	59,6%	46	58,2%	9	90,0%
Vriend(in)	3	42,9%	7	38,9%	10	40,0%	5	22,7%	17	29,8%	22	27,8%	3	30,0%
Andere	1	14,3%	0	0,0%	1	4,0%	1	4,5%	8	14,0%	9	11,4%	0	0,0%

	RZ Sint-Maria						RZ Sint-Trudo						AZ Salvator	
	Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Voorgeschiedenis van suïcidaal gedrag														
<i>Geen</i>	5	71,4%	6	33,3%	11	44,0%	13	61,9%	29	50,9%	42	53,8%	8	80,0%
<i>1</i>	1	14,3%	5	27,8%	6	24,0%	5	23,8%	16	28,1%	21	26,9%	2	20,0%
<i>2</i>	1	14,3%	3	16,7%	4	16,0%	2	9,5%	5	8,8%	7	9,0%	0	0,0%
<i>3</i>	0	0,0%	1	5,6%	1	4,0%	0	0,0%	2	3,5%	2	2,6%	0	0,0%
<i>4 of meerdere</i>	0	0,0%	3	16,7%	3	12,0%	1	4,8%	5	8,8%	6	7,7%	0	0,0%
<i>Meerdere, aantal onbekend</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Tijdsinterval tussen suïcidepogingen														
<i>< 12 maanden</i>	1	50,0%	3	25,0%	4	28,6%	1	12,5%	14	50,0%	15	41,7%	1	50,0%
<i>>12 maanden</i>	1	50,0%	9	75,0%	10	71,4%	7	87,5%	14	50,0%	21	58,3%	1	50,0%
Medische behandeling														
<i>Ja</i>	1	50,0%	9	75,0%	10	71,4%	4	66,7%	20	76,9%	24	75,0%	2	100,0%
<i>Ziekenhuis</i>	1	100,0%	6	66,7%	7	70,0%	4	100,0%	13	65,0%	17	70,8%	1	50,0%
<i>Huisarts</i>	0	0,0%	2	22,2%	2	20,0%	0	0,0%	2	10,0%	2	8,3%	0	0,0%
<i>Andere</i>	0	0,0%	1	11,1%	1	10,0%	0	0,0%	5	25,0%	5	20,8%	1	50,0%
<i>Nee</i>	1	50,0%	3	25,0%	4	28,6%	2	33,3%	6	23,1%	8	25,0%	0	0,0%
Psychische behandeling														
<i>Ja</i>	1	50,0%	8	66,7%	9	64,3%	4	57,1%	19	70,4%	23	67,6%	2	100,0%
<i>Nee</i>	1	50,0%	4	33,3%	5	35,7%	3	42,9%	8	29,6%	11	32,4%	0	0,0%
Alcohol- en middelenmisbruik														
<i>Geen vermoeden</i>	5	83,3%	14	77,8%	19	79,2%	7	50,0%*	34	72,3%*	41	67,2%	8	88,9%
<i>Mogelijk misbruik</i>	1	16,7%	0	0,0%	1	4,2%	2	14,3%	2	4,3%	4	6,6%	0	0,0%
<i>Waarschijnlijk misbruik</i>	0	0,0%	4	22,2%	4	16,7%	5	35,7%	11	23,4%	16	26,2%	1	11,1%
As I diagnose														
<i>Geen AS I diagnose geformuleerd</i>	1	16,7%	0	0,0%	1	8,3%	0	0,0%	2	4,2%	2	3,1%	3	30,0%
<i>Stemmingsst.</i>	4	66,7%	4	66,7%	8	66,7%	3	18,8%	16	33,3%	19	29,7%	5	50,0%
<i>Middelenmisbruik</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	6,3%	5	10,4%	6	9,4%	0	0,0%
<i>Stemming + middelenmisbruik</i>	0	0,0%	1	16,7%	1	8,3%	1	6,3%	0	0,0%	1	1,6%	2	20,0%
<i>Acute aanpassingsstoornis</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	6,3%	0	0,0%	1	1,6%	0	0,0%
<i>Andere</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	18,8%	2	4,2%	5	7,8%	0	0,0%
<i>Enkel probleembeschrijving</i>	1	16,7%	1	16,7%	2	16,7%	7	43,8%	23	47,9%	30	46,9%	0	0,0%
As II diagnose														
<i>Geen AS II diagnose geformuleerd</i>	6	100,0%	6	100,0%	12	100,0%	16	100,0%	40	83,3%	56	87,5%	9	90,0%
<i>Cluster B</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5	10,4%	5	7,8%	0	0,0%
<i>Andere</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Uitgesteld</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	6,3%	3	4,7%	1	10,0%

	RZ Sint-Maria						RZ Sint-Trudo						AZ Salvator	
	Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
EB factoren														
Situering in de tijd														
Maand van suïcidepoging														
<i>Januari</i>	0	0,0%	4	22,2%	4	16,0%	1	4,5%	5	8,3%	6	7,3%	2	20,0%
<i>Februari</i>	2	28,6%	3	16,7%	5	20,0%	2	9,1%	7	11,7%	9	11,0%	1	10,0%
<i>Maart</i>	1	14,3%	2	11,1%	3	12,0%	3	13,6%	4	6,7%	7	8,5%	3	30,0%
<i>April</i>	1	14,3%	0	0,0%	1	4,0%	2	9,1%	3	5,0%	5	6,1%	3	30,0%
<i>Mei</i>	0	0,0%	1	5,6%	1	4,0%	0	0,0%	6	10,0%	6	7,3%	1	10,0%
<i>Juni</i>	0	0,0%	2	11,1%	2	8,0%	0	0,0%	1	1,7%	1	1,2%		
<i>Juli</i>	1	14,3%	1	5,6%	2	8,0%	2	9,1%	8	13,3%	10	12,2%		
<i>Augustus</i>	1	14,3%	0	0,0%	1	4,0%	1	4,5%	4	6,7%	5	6,1%		
<i>September</i>	1	14,3%	2	11,1%	3	12,0%	5	22,7%	8	13,3%	13	15,9%		
<i>Oktober</i>	0	0,0%	1	5,6%	1	4,0%	1	4,5%	6	10,0%	7	8,5%		
<i>November</i>	0	0,0%	2	11,1%	2	8,0%	2	9,1%	3	5,0%	5	6,1%		
<i>December</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	13,6%	5	8,3%	8	9,8%		
Tijdstip van suïcidepoging														
<i>Ochtend</i>	2	28,6%	4	23,5%	6	25,0%	2	11,1%	9	18,0%	11	16,2%	1	16,7%
<i>(Na)middag</i>	1	14,3%	4	23,5%	5	20,8%	6	33,3%	21	42,0%	27	39,7%	2	33,3%
<i>Avond</i>	3	42,9%	9	52,9%	12	50,0%	8	44,4%	13	26,0%	21	30,9%	2	33,3%
<i>Nacht</i>	1	14,3%	0	0,0%	1	4,2%	2	11,1%	7	14,0%	9	13,2%	1	16,7%
Methode														
<i>Zelfvergiftiging</i>	6	85,7%	17	94,4%	23	92,0%	19	86,4%	57	95,0%	76	92,7%	8	80,0%
<i>Zelfverwonding</i>	1	14,3%	0	0,0%	1	4,0%	2	9,1%	2	3,3%	4	4,9%	2	20,0%
<i>Combinatie zelfvergiftiging en -verwonding</i>	0	0,0%	1	5,6%	1	4,0%	1	4,5%	1	1,7%	2	2,4%	0	0,0%
Alcoholiname tijdens poging	1	14,3%	4	22,2%	5	20,0%	6	27,3%	13	21,7%	19	23,2%	1	10,0%
Ernst letsel														
<i>Geen</i>	3	42,9%	15	83,3%	18	72,0%	6	28,6%	12	20,3%	18	22,5%	7	70,0%
<i>Beperkt</i>	3	42,9%	3	16,7%	6	24,0%	12	57,1%	38	64,4%	50	62,5%	0	0,0%
<i>Ernstig</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	14,3%	9	15,3%	12	15,0%	1	10,0%
<i>Levensbedreigend</i>	1	14,3%	0	0,0%	1	4,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	20,0%
Aanmelding														
<i>Op eigen initiatief</i>	1	12,5%	2	11,1%	3	11,5%	4	18,2%	12	20,0%	16	19,5%	0	0,0%
<i>Via 100</i>	5	62,5%	12	66,7%	17	65,4%	13	59,1%	32	53,3%	45	54,9%	3	30,0%
<i>Via politie</i>	0	0,0%	1	5,6%	1	3,8%	1	4,5%	3	5,0%	4	4,9%	1	10,0%
<i>Via huisarts/ vernijsbrief</i>	0	0,0%	1	5,6%	1	3,8%	3	13,6%	7	11,7%	10	12,2%	1	10,0%
<i>Via andere(n)</i>	2	25,0%	2	11,1%	4	15,4%	4	18,2%	7	11,7%	11	13,4%	7	70,0%
Poging onderbroken	0	0,0%	7	38,9%	7	28,0%	6	28,6%	16	26,7%	22	27,2%	1	10,0%

	RZ Sint-Maria						RZ Sint-Trudo						AZ Salvator	
	Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Suïcidale gedachten na de poging														
IPEO 1														
<i>Nee</i>	4	57,1%	12	66,7%	16	64,0%	6	37,5%	28	51,9%	34	48,6%	7	70,0%
<i>Znuk</i>	1	14,3%	5	27,8%	6	24,0%	6	37,5%	17	31,5%	23	32,9%	1	10,0%
<i>Matig tot sterk</i>	2	28,6%	1	5,6%	3	12,0%	4	25,0%	9	16,7%	13	18,6%	2	20,0%
IPEO 2														
<i>Nee</i>	4	57,1%	13	72,2%	17	68,0%	9	56,3%	31	63,3%	40	61,5%	6	60,0%
<i>Znuk</i>	1	14,3%	5	27,8%	6	24,0%	3	18,8%	14	28,6%	17	26,2%	2	20,0%
<i>Matig tot sterk</i>	2	28,6%	0	0,0%	2	8,0%	4	25,0%	4	8,2%	8	12,3%	2	20,0%
Suïcidale plannen na de poging														
IPEO 1														
<i>Niet over nagedacht</i>	1	50,0%	4	66,7%	5	62,5%	3	30,0%	17	65,4%	20	55,6%	0	0,0%
<i>Over nagedacht, maar details niet uitgewerkt</i>	0	0,0%	1	16,7%	1	12,5%	7	70,0%*	8	30,8%*	15	41,7%	3	100,0%
<i>Goed geformuleerd en details uitgewerkt</i>	1	50,0%	1	16,7%	2	25,0%	0	0,0%	1	3,8%	1	2,8%	0	0,0%
IPEO 2														
<i>Niet over nagedacht</i>	1	33,3%	3	60,0%	4	50,0%	2	28,6%	8	44,4%	10	40,0%	2	50,0%
<i>Over nagedacht, maar details niet uitgewerkt</i>	0	0,0%	1	20,0%	1	12,5%	5	71,4%	9	50,0%	14	56,0%	2	50,0%
<i>Goed geformuleerd en details uitgewerkt</i>	2	66,7%	1	20,0%	3	37,5%	0	0,0%	1	5,6%	1	4,0%	0	0,0%
Hopeloosheid														
<i>Negatieve anticipatie</i>	1	25,0%	6	60,0%	7	50,0%	6	60,0%	22	61,1%	28	60,9%	4	50,0%
<i>Positieve anticipatie</i>	2	50,0%	2	20,0%	4	28,6%	1	10,0%	6	16,7%	7	15,2%	2	25,0%
<i>Onzeker, ambivalent</i>	1	25,0%	2	20,0%	3	21,4%	3	30,0%	8	22,2%	11	23,9%	2	25,0%
Gevoelens na de poging														
<i>Kwaadheid</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	6,3%	3	5,1%	0	0,0%
<i>Ambivalentie</i>	1	16,7%	2	11,8%	3	13,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	20,0%
<i>Spijt over mislukte poging</i>	0	0,0%	2	11,8%	2	8,7%	0	0,0%	4	8,3%	4	6,8%	0	0,0%
<i>Blij met mislukte poging</i>	2	33,3%	2	11,8%	4	17,4%	0	0,0%	2	4,2%	2	3,4%	4	40,0%
<i>Angst/ Onrust</i>	1	16,7%	0	0,0%	1	4,3%	0	0,0%	1	2,1%	1	1,7%	1	10,0%
<i>Leggheid</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	9,1%	1	2,1%	2	3,4%	0	0,0%
<i>Depressief</i>	0	0,0%	1	5,9%	1	4,3%	0	0,0%	7	14,6%	7	11,9%	0	0,0%
<i>Schuld/ Schaamte</i>	0	0,0%	2	11,8%	2	8,7%	1	9,1%	1	2,1%	2	3,4%	2	20,0%
<i>Goed, positief</i>	0	0,0%	3	17,6%	3	13,0%	0	0,0%	4	8,3%	4	6,8%	0	0,0%
<i>Rustig</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Negatief</i>	0	0,0%	4	23,5%	4	17,4%	4	36,4%	14	29,2%	18	30,5%	0	0,0%
<i>Emotioneel</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	18,2%	11	22,9%	13	22,0%	2	20,0%
<i>Minimalisatie van poging</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4	8,3%	4	6,8%	0	0,0%
<i>Te versuft</i>	2	33,3%	3	17,6%	5	21,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	30,0%
<i>Andere</i>	1	16,7%	2	11,8%	3	13,0%	2	18,2%	2	4,2%	4	6,8%	1	10,0%

	RZ Sint-Maria						RZ Sint-Trudo						AZ Salvator	
	Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Ervaren problemen														
<i>Partner</i>	4	57,1%	12	66,7%	16	64,0%	11	64,7%	28	56,0%	39	58,2%	0	0,0%
<i>Ouders</i>	1	14,3%	8	44,4%	9	36,0%	3	17,6%	17	34,0%	20	29,9%	2	20,0%
<i>Kinderen</i>	2	28,6%	9	50,0%	11	44,0%	4	23,5%	18	36,0%	22	32,8%	0	0,0%
<i>Eenzaamheid</i>	5	71,4%	13	72,2%	18	72,0%	2	11,8%	17	34,0%	19	28,4%	2	20,0%
<i>Sociale relaties</i>	1	14,3%	6	33,3%	7	28,0%	2	11,8%	11	22,0%	13	19,4%	2	20,0%
<i>Afnijzing door geliefde</i>	3	42,9%	4	22,2%	7	28,0%	9	52,9%*	9	18,0%*	18	26,9%	4	40,0%
<i>Gezondheid</i>	0	0,0%	7	38,9%	7	28,0%	3	17,6%	9	18,0%	12	17,9%	1	10,0%
<i>Psychisch/psychiatrisch</i>	3	42,9%	8	44,4%	11	44,0%	9	52,9%	35	70,0%	44	65,7%	3	30,0%
<i>Werk</i>	5	71,4%	8	44,4%	13	52,0%	5	29,4%	10	20,0%	15	22,4%	3	30,0%
<i>Justitie</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	11,8%	6	12,0%	8	11,9%	0	0,0%
<i>Wonen</i>	1	14,3%	2	11,1%	3	12,0%	2	11,8%	7	14,0%	9	13,4%	0	0,0%
<i>Financiën</i>	3	42,9%	10	55,6%	13	52,0%	3	17,6%	15	30,0%	18	26,9%	1	10,0%
<i>School</i>	0	0,0%	1	5,6%	1	4,0%	1	5,9%	4	8,0%	5	7,5%	1	10,0%
<i>Seksuele oriëntatie</i>	0	0,0%	1	5,6%	1	4,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Overlijden/ ziekte sign. pers.</i>	1	14,3%	8	44,4%	9	36,0%	0	0,0%*	11	22,0%*	11	16,4%	0	0,0%
<i>ZMP, ZM sign. pers.</i>	1	14,3%	2	11,1%	3	12,0%	1	5,9%	5	10,0%	6	9,0%	0	0,0%
<i>Traumatische gebeurtenis</i>	0	0,0%	3	16,7%	3	12,0%	1	5,9%	15	30,0%	16	23,9%	1	10,0%
Motieven														
<i>Vreselijke gedachten</i>	5	71,4%*	3	16,7%*	8	32,0%	0	0,0%	7	14,0%	7	10,6%	0	0,0%
<i>Weg willen</i>	2	28,6%	5	27,8%	7	28,0%	7	43,8%	24	48,0%	31	47,0%	2	20,0%
<i>Ondraaglijke situatie</i>	3	42,9%	4	22,2%	7	28,0%	11	68,8%	30	60,0%	41	62,1%	5	50,0%
<i>Controleverlies</i>	0	0,0%	2	11,1%	2	8,0%	1	6,3%	6	12,0%	7	10,6%	0	0,0%
<i>Zichzelf straffen</i>	0	0,0%	2	11,1%	2	8,0%	1	6,3%	1	2,0%	2	3,0%	0	0,0%
<i>Mislukking voelen</i>	1	14,3%	3	16,7%	4	16,0%	3	18,8%	4	8,0%	7	10,6%	1	10,0%
<i>Hulp zoeken</i>	0	0,0%	1	5,6%	1	4,0%	1	6,3%	5	10,0%	6	9,1%	0	0,0%
<i>Ontreddering tonen</i>	0	0,0%	5	27,8%	5	20,0%	5	31,3%	18	36,0%	23	34,8%	2	20,0%
<i>Liefde tonen</i>	1	14,3%	1	5,6%	2	8,0%	2	12,5%	1	2,0%	3	4,5%	3	30,0%
<i>In vraag stellen liefde</i>	0	0,0%	2	11,1%	2	8,0%	2	12,5%	1	2,0%	3	4,5%	0	0,0%
<i>Mening beïnvloeden</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4	25,0%	6	12,0%	10	15,2%	0	0,0%
<i>Spijt doen krijgen</i>	1	14,3%	2	11,1%	3	12,0%	6	37,5%	16	32,0%	22	33,3%	1	10,0%
<i>Iemand bang maken</i>	1	14,3%	0	0,0%	1	4,0%	1	6,3%	0	0,0%	1	1,5%	0	0,0%
<i>Kwaad zijn op iemand</i>	1	14,3%	1	5,6%	2	8,0%	1	6,3%	3	6,0%	4	6,1%	0	0,0%
<i>Willen sterren</i>	5	71,4%	9	50,0%	14	56,0%	11	68,8%	22	44,0%	33	50,0%	4	40,0%

	RZ Sint-Maria						RZ Sint-Trudo						AZ Salvator	
	Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Suïcidale intentie														
<i>Laag</i>	3	42,9%	13	72,2%	16	64,0%	4	25,0%*	34	70,8%*	38	59,4%	7	77,8%
<i>Hoog</i>	4	57,1%	5	27,8%	9	36,0%	12	75,0%*	14	29,2%*	26	40,6%	2	22,2%
Ambivalentie tov het leven														
<i>Niet willen sterven</i>	2	28,6%	7	38,9%	9	36,0%	3	18,8%	20	42,6%	23	36,5%	4	40,0%
<i>Onverschilligheid</i>	0	0,0%	3	16,7%	3	12,0%	2	12,5%	8	17,0%	10	15,9%	2	20,0%
<i>Willen sterven</i>	5	71,4%	8	44,4%	13	52,0%	11	68,8%*	19	40,4%*	30	47,6%	4	40,0%
Zorgbehoeften														
<i>Op vormelijk niveau</i>	0	0,0%	4	50,0%	4	33,3%	9	56,3%	31	67,4%	40	64,5%	6	60,0%
<i>Op inhoudelijk niveau</i>	3	75,0%	2	25,0%	5	41,7%	0	0,0%	1	2,2%	1	1,6%	1	10,0%
<i>Op beide niveaus</i>	1	25,0%	0	0,0%	1	8,3%	2	12,5%	2	4,3%	4	6,5%	2	20,0%
<i>Geen van beide niveaus</i>	0	0,0%	2	25,0%	2	16,7%	5	31,3%	12	26,1%	17	27,4%	1	10,0%
Zorgtraject														
<i>Geen verdere behandeling</i>	0	0,0%	2	11,1%	2	8,0%	2	12,5%	12	25,5%	14	22,2%	0	0,0%
<i>Ontslag op advies</i>	0	0,0%	2	11,1%	2	8,0%	1	6,3%	9	19,1%	10	15,9%	0	0,0%
<i>Ontslag op tegenadvies</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	6,3%	2	4,3%	3	4,8%	0	0,0%
<i>Terugkeer naar begeleidingsdienst</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	4,3%	2	3,2%	0	0,0%
<i>Ambulante behandeling</i>	0	0,0%	2	11,1%	2	8,0%	9	56,3%	26	55,3%	35	55,6%	4	40,0%
<i>Residentieële behandeling</i>	3	42,9%	9	50,0%	12	48,0%	5	31,3%	9	19,1%	14	22,2%	6	60,0%
<i>Somatische behandeling</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Urgentiepsychiatrie</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,1%	1	1,6%	0	0,0%
<i>Intramurale PAAZ</i>	2	28,6%	7	38,9%	9	36,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Extramurale PAAZ</i>	0	0,0%	2	11,1%	2	8,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	30,0%
<i>PZ of PVT</i>	1	14,3%	0	0,0%	1	4,0%	5	31,3%	9	19,1%	14	22,2%	3	30,0%

	UZ Gent						UZ Leuven ⁺						ZH Maas en Kempen					
	Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Rates																		
PB	160	44,6%	199	55,4%	359	100,0%	38	28,4%	93	69,4%	134	100,0%	16	31,4%	35	68,6%	51	100,0%
EB	170	43,5%	221	56,5%	391	100,0%	38	28,4%	93	69,4%	134	100,0%	16	31,4%	35	68,6%	51	100,0%
PB factoren																		
Gemiddelde leeftijd	35,3		34,4		34,8							39,4		34,3		35,9		
Woonsituatie																		
<i>Alleen</i>	63	46,3%*	40	22,5%*	103	33,1%	19	52,8%*	20	22,0%*	39	30,7%	4	26,7%	10	31,3%	14	29,8%
<i>Niet alleen</i>	71	53,0%*	137	77,4%*	208	66,9%	17	47,2%*	71	78,0%*	88	69,3%	11	73,3%	22	68,8%	33	70,2%
Burgerlijke staat																		
<i>Nooit gehuwd</i>	92	60,1%	103	54,5%	195	57,0%	23	62,2%	43	48,9%	66	52,8%	7	43,8%	9	29,0%	16	34,0%
<i>Gehuwd</i>	22	14,4%	37	19,6%	59	17,3%	7	18,9%	26	29,5%	33	26,4%	6	37,5%	8	25,9%	14	29,8%
<i>Weduwe(naar)</i>	3	2,0%	5	2,6%	8	2,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Gescheiden</i>	29	19,0%	32	16,9%	61	17,8%	7	18,9%	19	21,6%	26	20,8%	2	12,5%	9	29,0%	11	23,4%
<i>Officieel samenwonend</i>	7	4,6%	12	6,3%	19	5,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	6,3%	5	16,1%	6	12,8%
Kinderen																		
<i>Ja</i>	58	45,0%	86	54,1%	144	50,0%							7	46,7%	16	57,1%	23	53,5%
<i>Nee</i>	71	55,0%	73	45,9%	144	50,0%							8	53,3%	12	42,9%	20	46,5%
Economische toestand																		
<i>Werkend</i>	51	39,5%	49	33,3%	100	36,2%	16	45,7%	31	42,5%	47	43,5%	5	38,5%	9	34,6%	14	35,9%
<i>Werkloos</i>	26	20,2%	27	18,4%	53	19,2%	18	51,4%	31	42,5%	49	45,4%	4	30,8%	8	30,8%	12	30,8%
<i>Economisch inactief</i>	52	40,3%	71	48,3%	123	44,6%	1	10,7%*	11	31,5%*	12	11,1%	4	30,8%	9	34,6%	13	33,3%
<i>Student</i>	15	31,9%*	35	50,7%*	50	43,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	50,0%	5	83,3%	7	70,0%
<i>Invalide</i>	24	51,1%	23	32,9%	47	40,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	25,0%	1	16,7%	2	20,0%
<i>Gepensioneerd</i>	8	17,0%	11	15,9%	19	16,4%	1	100,0%	6	100,0%	7	100,0%	1	25,0%	0	0,0%	1	10,0%
Psychiatrische behandeling in voorgeschiedenis																		
<i>Geen</i>	14	21,9%	24	30,0%	38	26,4%							1	16,7%	9	42,9%	10	37,0%
<i>Huisarts</i>	1	1,6%	1	1,3%	2	1,4%							1	16,7%	2	9,5%	3	11,1%
<i>Ambulante behandeling</i>	24	37,5%	28	35,0%	52	36,1%							2	33,3%	9	42,9%	11	40,7%
<i>Residentiële behandeling</i>	32	50,0%	39	48,8%	71	49,3%							2	33,3%	5	23,8%	7	25,9%
Sociaal netwerk																		
<i>Niemand</i>	9	12,7%	5	5,7%	14	8,8%							0	0,0%	4	15,4%	4	11,1%
<i>Partner</i>	16	22,5%*	46	52,3%*	62	39,0%							5	50,0%	7	26,9%	12	33,3%
<i>Familie</i>	49	69,0%	60	68,2%	109	68,6%							6	60,0%	10	38,5%	16	44,4%
<i>Vriend(in)</i>	18	25,4%	21	23,9%	39	24,5%							1	10,0%	8	30,8%	9	25,0%
<i>Andere</i>	8	11,3%	6	6,8%	14	8,8%							1	10,0%	2	7,7%	3	8,3%

	UZ Gent						UZ Leuven ⁺						ZH Maas en Kempen					
	Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Voorgeschiedenis van suïcidaal gedrag																		
<i>Geen</i>	51	45,5%*	44	31,4%*	95	37,7%							6	60,0%	19	61,3%	25	61,0%
<i>1</i>	28	25,0%	40	28,6%	68	27,0%							2	20,0%	7	22,6%	9	22,0%
<i>2</i>	11	9,8%	17	12,1%	28	11,1%							0	0,0%	3	9,7%	3	7,3%
<i>3</i>	6	5,4%	5	3,6%	11	4,4%							0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>4 of meerdere</i>	9	8,0%	17	12,1%	26	10,3%							1	10,0%	2	6,5%	3	7,3%
<i>Meerdere, aantal onbekend</i>	7	6,3%	17	12,1%	24	9,5%	17	100,0%	38	100,0%	57	100,0%	1	10,0%	0	0,0%	1	2,4%
Tijdsinterval tussen suicidepogingen																		
<i>< 12 maanden</i>	30	58,8%	42	54,5%	72	56,3%							3	75,0%	6	54,5%	9	60,0%
<i>>12 maanden</i>	21	41,2%	35	45,5%	56	43,8%							1	25,0%	5	45,5%	6	40,0%
Medische behandeling																		
<i>Ja</i>	37	86,0%	57	83,8%	94	84,7%	14	82,4%	30	78,9%	45	78,9%	3	75,0%	10	83,3%	13	81,3%
<i>Ziekenhuis</i>	26	70,3%	39	69,6%	65	69,9%	13	92,9%	27	96,4%	41	95,3%	2	66,7%	9	90,0%	11	84,6%
<i>Huisarts</i>	2	5,4%	5	8,9%	7	7,4%	1	7,1%	1	3,6%	2	4,7%	1	33,3%	0	0,0%	1	7,7%
<i>Andere</i>	9	24,3%	12	21,4%	21	22,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	10,0%	1	7,7%
<i>Nee</i>	6	14,0%	11	16,2%	17	15,3%	3	17,6%	8	21,1%	12	21,1%	1	25,0%	2	16,7%	3	18,8%
Psychische behandeling																		
<i>Ja</i>	28	68,3%	47	71,2%	75	70,1%							3	75,0%	7	77,8%	10	76,9%
<i>Nee</i>	13	31,7%	19	28,8%	32	29,9%							1	25,0%	2	22,2%	3	23,1%
Alcohol- en middelenmisbruik																		
<i>Geen vermoeden</i>	19	43,2%*	51	81,0%*	70	65,4%	19	57,6%*	63	80,8%*	82	71,9%	3	42,9%	12	80,0%	15	68,2%
<i>Mogelijk misbruik</i>	2	4,5%	4	6,3%	6	5,6%	3	9,1%	2	2,6%	5	4,4%	0	0,0%	1	6,7%	1	4,5%
<i>Waarschijnlijk misbruik</i>	23	52,3%*	8	12,7%*	31	29,0%	11	33,3%	13	16,7%	27	23,7%	4	57,1%	2	13,3%	6	27,3%
As I diagnose																		
<i>Geen AS I diagnose geformuleerd</i>	0	0,0%	4	6,3%	4	3,7%	2	5,7%	6	6,7%	8	6,5%	2	18,2%	8	42,1%	10	33,3%
<i>Stemmingsst.</i>	23	51,1%	38	60,3%	61	56,5%	16	45,7%	48	53,9%	64	51,6%	2	18,2%	5	26,3%	7	23,3%
<i>Middelenmisbruik</i>	1	2,2%	5	7,9%	6	5,6%	2	5,7%	5	5,6%	7	5,6%	5	45,5%*	1	5,3%*	6	20,0%
<i>Stemming + middelenmisbruik</i>	4	8,9%	2	3,2%	6	5,6%	6	17,1%	6	6,7%	12	9,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Acute aanpassingsstoornis</i>	15	33,3%	11	17,5%	26	24,1%	7	20,0%	23	25,8%	30	24,2%	1	9,1%	2	10,5%	3	10,0%
<i>Andere</i>	2	4,4%	2	3,2%	4	3,7%	2	5,7%	1	1,1%	3	2,4%	1	9,1%	1	5,3%	2	6,7%
<i>Enkel probleembeschrijving</i>	0	0,0%	1	1,6%	1	0,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	10,5%	2	6,7%
As II diagnose																		
<i>Geen AS II diagnose geformuleerd</i>	35	77,8%	42	66,7%	77	71,3%	1	2,9%	4	4,5%	5	4,0%	9	81,8%	12	63,2%	21	70,0%
<i>Cluster B</i>	3	6,7%	5	7,9%	8	7,4%	3	8,6%	11	12,4%	14	11,3%	2	18,2%	7	36,8%	9	30,0%
<i>Andere</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4	4,5%	4	3,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Uitgesteld</i>	7	15,6%	16	25,4%	23	21,3%	31	88,6%	70	78,7%	101	81,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

	UZ Gent						UZ Leuven ⁺						ZH Maas en Kempen					
	Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
EB factoren																		
Situering in de tijd																		
Maand van suïcidepoging																		
<i>Januari</i>	14	8,3%	19	8,6%	33	8,5%							1	6,3%	3	8,8%	4	8,0%
<i>Februari</i>	17	10,1%	17	7,7%	34	8,7%							2	12,5%	5	14,7%	7	14,0%
<i>Maart</i>	14	8,3%	23	10,5%	37	9,5%							2	12,5%	2	5,9%	4	8,0%
<i>April</i>	12	7,1%	20	9,1%	32	8,2%							1	6,3%	4	11,8%	5	10,0%
<i>Mei</i>	20	11,8%	14	6,4%	34	8,7%							0	0,0%	4	11,8%	4	8,0%
<i>Juni</i>	10	5,9%	15	6,8%	25	6,4%							2	12,5%	2	5,9%	4	8,0%
<i>Juli</i>	9	5,3%	20	9,1%	29	7,5%							0	0,0%	2	5,9%	2	4,0%
<i>Augustus</i>	12	7,1%	22	10,0%	34	8,7%							2	12,5%	4	11,8%	6	12,0%
<i>September</i>	16	9,5%	22	10,0%	38	9,8%							2	12,5%	2	5,9%	4	8,0%
<i>Oktober</i>	20	11,8%	15	6,8%	35	9,0%							2	12,5%	1	2,9%	3	6,0%
<i>November</i>	14	8,3%	17	7,7%	31	8,0%							2	12,5%	2	5,9%	4	8,0%
<i>December</i>	11	6,5%	16	7,3%	27	6,9%							0	0,0%	3	8,8%	3	6,0%
Tijdstip van suïcidepoging																		
<i>Ochtend</i>	18	22,0%	18	13,4%	36	16,7%							1	7,1%	6	20,7%	7	16,3%
<i>(Na)middag</i>	13	15,9%*	43	32,1%*	56	25,9%							3	21,4%	7	24,1%	10	23,3%
<i>Avond</i>	31	37,8%	47	35,1%	78	36,1%							6	42,9%	12	41,4%	18	41,9%
<i>Nacht</i>	20	24,4%	26	19,4%	46	21,3%							4	28,6%	4	13,8%	8	18,6%
Methode																		
<i>Zelfvergiftiging</i>	96	56,5%*	176	79,6%*	272	69,6%	26	68,4%	77	83,7%	104	78,8%	12	75,0%	32	91,4%	44	86,3%
<i>Zelfverwonding</i>	59	34,7%*	36	16,3%*	95	24,3%	9	23,7%*	8	8,7%*	18	13,6%	3	18,8%	1	2,9%	4	7,8%
<i>Combinatie zelfvergiftiging en -verwonding</i>	15	8,8%	9	4,1%	24	6,1%	3	7,9%	7	7,6%	10	7,6%	1	6,3%	2	5,7%	3	5,9%
Alcoholiname tijdens poging	49	28,8%	47	21,3%	96	24,6%	12	31,6%	22	23,9%	35	26,5%	5	31,3%	4	11,4%	9	17,6%
Ernst letsel																		
<i>Geen</i>	53	52,5%	59	48,0%	112	50,0%	12	32,4%	38	41,3%	51	38,9%	1	7,1%	4	13,8%	5	11,6%
<i>Beperkt</i>	34	33,7%	47	38,2%	81	36,2%	20	54,1%	45	48,9%	65	49,6%	6	42,9%*	22	75,9%*	28	65,1%
<i>Ernstig</i>	12	11,9%	13	10,6%	25	11,2%	3	8,1%	8	8,7%	11	8,4%	6	42,9%*	2	6,9%*	8	18,6%
<i>Levensbedreigend</i>	2	2,0%	4	3,3%	6	2,7%	2	5,4%	1	1,1%	4	3,1%	1	7,1%	1	3,4%	2	4,7%
Aanmelding																		
<i>Op eigen initiatief</i>	46	28,8%*	36	18,6%*	82	23,2%	2	5,3%	9	9,9%	11	8,5%	4	25,0%	8	24,2%	12	24,5%
<i>Via 100</i>	72	45,0%	90	46,4%	162	45,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	10	62,5%	21	63,6%	31	63,3%
<i>Via politie</i>	37	23,1%	32	16,5%	69	19,5%	6	15,8%	6	6,6%	12	9,3%	0	0,0%	1	3,0%	1	2,0%
<i>Via huisarts/ vernijsbrief</i>	11	6,9%	26	13,4%	37	10,5%	3	7,9%	13	14,3%	16	12,4%	4	25,0%	0	0,0%	4	8,2%
<i>Via andere(n)</i>	62	38,8%	78	40,2%	140	39,5%	29	76,3%	75	82,4%	104	80,6%	1	6,3%	7	21,2%	8	16,3%
Poging onderbroken	56	36,1%	64	30,5%	120	32,9%							4	26,7%	12	37,5%	16	34,0%

	UZ Gent						UZ Leuven ⁺						ZH Maas en Kempen					
	Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Suïcidale gedachten na de poging																		
IPEO 1																		
<i>Nee</i>	15	19,7%	28	32,6%	43	26,5%	17	45,9%	50	53,8%	68	51,5%	6	66,7%	16	66,7%	22	66,7%
<i>Zwak</i>	17	22,4%	23	26,7%	40	24,7%	16	43,2%	28	30,1%	45	34,1%	1	11,1%	3	12,5%	4	12,1%
<i>Matig tot sterk</i>	44	57,9%*	35	40,7%*	79	48,8%	4	10,8%	15	16,1%	19	14,4%	2	22,2%	5	20,8%	7	21,2%
IPEO 2																		
<i>Nee</i>	10	21,3%	14	20,6%	24	20,9%							9	90,0%	14	60,9%	23	69,7%
<i>Zwak</i>	16	34,0%	24	35,3%	40	34,8%							0	0,0%	6	26,1%	6	18,2%
<i>Matig tot sterk</i>	21	44,7%	30	44,1%	51	44,3%							1	10,0%	3	13,0%	4	12,1%
Suïcidale plannen na de poging																		
IPEO 1																		
<i>Niet over nagedacht</i>	20	43,5%	28	51,9%	48	48,0%	6	31,6%	10	25,6%	16	27,1%	0	0,0%	1	20,0%	1	12,5%
<i>Over nagedacht, maar details niet uitgewerkt</i>	20	43,5%	21	38,9%	41	41,0%	12	63,2%	25	64,1%	38	64,4%	1	33,3%	3	60,0%	4	50,0%
<i>Goed geformuleerd en details uitgewerkt</i>	6	13,0%	5	9,3%	11	11,0%	1	5,3%	4	10,3%	5	8,5%	2	66,7%	1	20,0%	3	37,5%
IPEO 2																		
<i>Niet over nagedacht</i>	7	19,4%	12	22,2%	19	21,1%							0	0,0%	2	22,2%	2	20,0%
<i>Over nagedacht, maar details niet uitgewerkt</i>	24	66,7%	37	68,5%	61	67,8%							1	100,0%	5	55,6%	6	60,0%
<i>Goed geformuleerd en details uitgewerkt</i>	5	13,9%	5	9,3%	10	11,1%							0	0,0%	2	22,2%	2	20,0%
Hopeloosheid																		
<i>Negatieve anticipatie</i>	19	30,6%	14	18,2%	33	23,7%							2	66,7%	3	37,5%	5	45,5%
<i>Positieve anticipatie</i>	27	43,5%	40	51,9%	67	48,2%							1	33,3%	2	25,0%	3	27,3%
<i>Onzeker, ambivalent</i>	16	25,8%	23	29,9%	39	28,1%							0	0,0%	3	37,5%	3	27,3%
Gevoelens na de poging																		
<i>Kwaadheid</i>	4	5,9%	7	8,6%	11	7,4%							0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Ambivalentie</i>	4	5,9%	2	2,5%	6	4,0%							0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Spijt over mislukte poging</i>	14	20,6%	11	13,6%	25	16,8%							2	18,2%	2	6,5%	4	9,5%
<i>Blij met mislukte poging</i>	3	4,4%	8	9,9%	11	7,4%							1	9,1%	5	16,1%	6	14,3%
<i>Angst/ Onrust</i>	5	7,4%	3	3,7%	8	5,4%							0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Leegheid</i>	3	4,4%	4	4,9%	7	4,7%							1	9,1%	3	9,7%	4	9,5%
<i>Depressief</i>	28	41,2%	28	34,6%	56	37,6%							0	0,0%	2	6,5%	2	4,8%
<i>Schuld/ Schaamte</i>	0	0,0%	2	2,5%	2	1,3%							0	0,0%	4	12,9%	4	9,5%
<i>Goed, positief</i>	2	2,9%	1	1,2%	3	2,0%							0	0,0%	1	3,2%	1	2,4%
<i>Rustig</i>	0	0,0%	4	4,9%	4	2,7%							0	0,0%	2	6,5%	2	4,8%
<i>Negatief</i>	1	1,5%	0	0,0%	1	0,7%							0	0,0%	3	9,7%	3	7,1%
<i>Emotioneel</i>	7	10,3%*	21	25,9%*	28	18,8%							0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Minimalisatie van poging</i>	1	1,5%	2	2,5%	3	2,0%							0	0,0%	1	3,1%	1	2,3%
<i>Te versuft</i>	2	2,9%	4	4,9%	6	4,0%							2	18,2%	5	16,1%	7	16,7%
<i>Andere</i>	6	8,8%	6	7,4%	12	8,1%							1	9,1%	2	6,5%	3	7,1%

	UZ Gent						UZ Leuven ⁺						ZH Maas en Kempen					
	Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Ervaren problemen																		
<i>Partner</i>	25	51,0%	31	47,0%	56	48,7%	23	69,7%	51	60,0%	76	62,8%	8	72,7%	14	60,9%	22	64,7%
<i>Ouders</i>	17	34,7%	25	37,9%	42	36,5%	18	54,5%	33	40,2%	51	43,6%	3	27,3%	9	39,1%	12	35,3%
<i>Kinderen</i>	8	16,3%	18	27,3%	26	22,6%	5	15,6%	25	30,1%	30	25,6%	3	27,3%	6	26,1%	9	26,5%
<i>Eenzaamheid</i>	21	42,9%	22	33,3%	43	37,4%	21	65,6%	52	61,2%	74	62,2%	6	54,5%	6	26,1%	12	35,3%
<i>Sociale relaties</i>	7	14,3%	12	18,2%	19	16,5%	11	36,7%	35	42,7%	47	41,2%	3	27,3%	8	34,8%	11	32,4%
<i>Afnijzing door geliefde</i>	16	32,7%	14	21,2%	30	26,1%	21	63,6%	36	44,4%	57	49,1%	7	63,6%	9	39,1%	16	47,1%
<i>Gezondheid</i>	10	20,4%	12	18,2%	22	19,1%	9	30,0%	22	26,5%	31	27,0%	1	9,1%	1	4,3%	2	5,9%
<i>Psychisch/psychiatrisch</i>	19	38,8%*	39	59,1%*	58	50,4%	27	81,8%	76	87,4%	105	86,1%	5	45,5%	13	56,5%	18	52,9%
<i>Werk</i>	18	36,7%	24	36,4%	42	36,5%	19	61,3%	37	44,0%	57	48,7%	4	36,4%	7	30,4%	11	32,4%
<i>Justitie</i>	3	6,1%	1	1,5%	4	3,5%	9	29,0%*	5	6,3%*	14	12,4%	1	9,1%	0	0,0%	1	2,9%
<i>Wonen</i>	8	16,3%	8	12,1%	16	13,9%	10	32,3%*	7	8,6%*	17	14,9%	1	9,1%	1	4,3%	2	5,9%
<i>Financiën</i>	9	18,4%	14	21,2%	23	20,0%	10	32,3%	21	25,0%	32	27,4%	4	36,4%	2	8,7%	6	17,6%
<i>School</i>	2	4,1%	5	7,6%	7	6,1%	5	17,2%	13	16,7%	18	16,5%	0	0,0%	2	8,7%	2	5,9%
<i>Seksuele oriëntatie</i>	2	4,1%	0	0,0%	2	1,7%	2	7,1%	0	0,0%	2	1,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Overlijden/ ziekte sign. pers.</i>	14	28,6%	21	31,8%	35	30,4%	3	10,3%	12	14,5%	15	13,2%	1	9,1%	4	17,4%	5	14,7%
<i>ZMP, ZM sign. pers.</i>	7	14,3%	18	27,3%	25	21,7%	2	6,7%	8	9,8%	11	9,6%	0	0,0%	1	4,3%	1	2,9%
<i>Traumatische gebeurtenis</i>	12	24,5%	25	37,9%	37	32,2%	2	6,9%	17	22,4%	20	14,9%	1	9,1%	5	21,7%	6	17,6%
Motieven																		
<i>Vreselijke gedachten</i>	3	6,3%	7	10,3%	10	8,6%	5	13,9%	13	14,4%	20	18,7%	5	50,0%	10	43,5%	15	45,5%
<i>Weg willen</i>	12	25,0%	21	30,9%	33	28,4%	10	27,8%	26	28,9%	36	27,9%	5	50,0%	14	60,9%	19	57,6%
<i>Ondraaglijke situatie</i>	36	75,0%	47	69,1%	83	71,6%	15	41,7%	35	38,9%	51	39,5%	7	70,0%	7	30,4%	14	42,4%
<i>Controleverlies</i>	4	8,3%	2	2,9%	6	5,2%	5	13,9%	18	20,0%	23	17,8%	4	40,0%	7	30,4%	11	33,3%
<i>Zichzelf straffen</i>	1	2,1%	2	2,9%	3	2,6%	1	2,8%	1	1,1%	3	2,3%	1	10,0%	0	0,0%	1	3,0%
<i>Mislukking voelen</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4	11,1%	13	14,4%	18	14,0%	4	40,0%	3	13,0%	7	21,2%
<i>Hulp zoeken</i>	0	0,0%	2	2,9%	2	1,7%	0	0,0%	1	1,1%	1	0,8%	0	0,0%	1	4,3%	1	3,0%
<i>Ontreddering tonen</i>	1	2,1%	6	8,8%	7	6,0%	2	5,6%	15	16,7%	17	13,2%	2	20,0%	4	17,4%	6	18,2%
<i>Liefde tonen</i>	0	0,0%	1	1,5%	1	0,9%	0	0,0%	1	1,1%	1	0,8%	1	10,0%	1	4,3%	2	6,1%
<i>In vraag stellen liefde</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,8%	3	3,3%	4	3,1%	2	20,0%	1	4,3%	3	9,1%
<i>Mening beïnvloeden</i>	1	2,1%	1	1,5%	2	1,7%	1	2,8%	5	5,6%	6	4,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Spijt doen krijgen</i>	1	2,1%	4	5,9%	5	4,3%	1	2,8%	7	7,8%	8	6,2%	1	10,0%	3	13,0%	4	12,1%
<i>Iemand bang maken</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Kwaad zijn op iemand</i>	0	0,0%	1	1,5%	1	0,9%	1	2,8%	5	5,6%	6	4,7%	1	10,0%	0	0,0%	1	3,0%
<i>Willen sterren</i>	23	47,9%	37	54,4%	60	51,7%	19	52,8%	41	45,6%	61	47,3%	4	10,0%	5	21,7%	9	27,3%

	UZ Gent						UZ Leuven ⁺						ZH Maas en Kempen					
	Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal		Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Suïcidale intentie																		
<i>Laag</i>	13	28,3%	29	46,8%	42	38,9%	23	62,2%	62	67,4%	85	64,9%	5	45,5%	16	69,6%	21	61,8%
<i>Hoog</i>	33	71,7%	33	53,2%	66	61,1%	14	37,8%	30	32,6%	46	35,1%	6	54,5%	7	30,4%	13	38,2%
Ambivalentie tov het leven																		
<i>Niet willen sterven</i>	9	18,8%	8	12,9%	17	15,5%	10	27,8%	24	27,6%	34	27,2%	4	40,0%	10	43,5%	14	42,4%
<i>Onverschilligheid</i>	11	22,9%	20	32,3%	31	28,2%	10	27,8%	28	32,2%	38	30,4%	3	30,0%	9	39,1%	12	36,4%
<i>Willen sterven</i>	28	58,3%	34	54,8%	62	56,4%	16	44,4%	35	40,2%	53	42,4%	3	3,0%	4	17,4%	7	21,2%
Zorgbehoeften																		
<i>Op vormelijk niveau</i>	14	34,1%	26	41,9%	40	38,8%	0	0,0%	1	6,7%	1	5,3%	4	36,4%	14	60,9%	18	52,9%
<i>Op inhoudelijk niveau</i>	6	14,6%	8	12,9%	14	13,6%	4	100,0%	13	86,7%	17	89,5%	0	0,0%	3	13,0%	3	8,8%
<i>Op beide niveaus</i>	13	31,7%	11	17,7%	24	23,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	18,2%	5	21,7%	7	20,6%
<i>Geen van beide niveaus</i>	8	19,5%	17	27,4%	25	24,3%	0	0,0%	1	6,7%	1	5,3%	5	45,5%	1	4,3%	6	17,6%
Zorgtraject																		
Geen verdere behandeling	5	4,3%	13	7,5%	18	6,2%	0	0,0%	1	1,2%	1	0,8%	2	20,0%	5	19,2%	7	19,4%
<i>Ontslag op advies</i>	3	2,6%	4	2,3%	7	2,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	20,0%	4	15,4%	6	16,7%
<i>Ontslag op tegenadvies</i>	2	1,7%	1	0,6%	3	1,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	3,8%	1	2,8%
<i>Terugkeer naar begeleidingsdienst</i>	0	0,0%*	8	4,6%*	8	2,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ambulante behandeling	17	14,7%	35	20,1%	52	17,9%	16	43,2%	41	49,4%	57	47,5%	4	40,0%	11	42,3%	15	41,7%
Residentiële behandeling	106	91,4%*	141	81,0%*	247	85,2%	24	64,9%	49	59,0%	73	60,8%	4	40,0%	10	38,5%	14	38,9%
<i>Somatische behandeling</i>	38	32,8%	57	32,8%	95	32,8%	2	5,4%	6	7,2%	8	6,7%	1	10,0%	0	0,0%	1	2,8%
<i>Urgentiepsychiatrie</i>	72	62,1%*	87	50,0%*	159	54,8%	2	5,4%	8	9,6%	10	8,3%	1	10,0%	0	0,0%	1	2,8%
<i>Intramurale PAAZ</i>	4	3,4%	7	4,0%	11	3,8%	6	16,2%	14	16,9%	20	16,7%	1	10,0%	3	11,5%	4	11,1%
<i>Extramurale PAAZ</i>	7	6,0%	9	5,2%	16	5,5%	1	2,7%	5	6,0%	6	5,0%	0	0,0%	2	7,7%	2	5,6%
<i>PZ of PVT</i>	22	19,0%	25	14,4%	47	16,2%	5	13,5%	11	13,3%	16	13,3%	2	20,0%	5	19,2%	7	19,4%

ZH Oost-Limburg⁺

	Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%
Rates						
PB	22	37,9%	35	60,3%	58	100,0%
EB	22	37,9%	35	60,3%	58	100,0%
PB factoren						
Gemiddelde leeftijd	37,1		38,8		38,1	
Woonsituatie						
<i>Alleen</i>	8	36,4%*	3	8,6%*	11	19,3%
<i>Niet alleen</i>	14	63,6%*	32	91,4%*	46	80,7%
Burgerlijke staat						
<i>Nooit gehuwd</i>	8	38,1%	7	20,0%	15	26,8%
<i>Gehuwd</i>	7	33,3%	15	42,9%	22	39,3%
<i>Weduwe(naar)</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Gescheiden</i>	5	23,8%	8	22,9%	13	23,2%
<i>Officieel samenwonend</i>	1	4,8%	5	14,3%	6	10,7%
Kinderen						
<i>Ja</i>	11	52,4%	21	63,6%	32	59,3%
<i>Nee</i>	10	47,6%	12	36,4%	22	40,7%
Economische toestand						
<i>Werkend</i>	7	36,8%	15	45,5%	22	42,3%
<i>Werkloos</i>	4	21,1%	7	21,2%	11	21,2%
<i>Economisch inactief</i>	8	42,1%	11	33,3%	19	36,5%
<i>Student</i>	1	12,5%	1	14,3%	2	13,3%
<i>Invalide</i>	6	75,0%	6	85,7%	12	80,0%
<i>Gepensioneerd</i>	1	12,5%	0	0,0%	1	6,7%
Psychiatrische behandeling in voorgeschiedenis						
<i>Geen</i>	3	14,3%	7	21,9%	10	18,9%
<i>Huisarts</i>	1	4,8%	1	3,1%	2	3,8%
<i>Ambulante behandeling</i>	7	33,3%	19	59,4%	26	49,1%
<i>Residentiële behandeling</i>	12	57,1%	16	50,0%	28	52,8%
Sociaal netwerk						
<i>Niemand</i>	2	9,1%	1	3,1%	3	5,6%
<i>Partner</i>	9	40,9%	12	37,5%	21	38,9%
<i>Familie</i>	15	68,2%	18	56,3%	33	61,1%
<i>Vriend(in)</i>	0	0,0%*	7	21,9%*	7	13,0%
<i>Andere</i>	1	4,5%	3	9,4%	4	7,4%

ZH Oost-Limburg⁺

	Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%
Voorgeschiedenis van suïcidaal gedrag						
<i>Geen</i>	10	47,6%	18	52,9%	28	50,9%
<i>1</i>	6	28,6%	9	16,5%	15	27,3%
<i>2</i>	2	9,5%	4	11,8%	6	10,9%
<i>3</i>	1	4,8%	1	2,9%	2	3,6%
<i>4 of meerdere</i>	2	9,5%	2	5,9%	4	7,3%
<i>Meerdere, aantal onbekend</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Tijdsinterval tussen suïcidepogingen						
<i>< 12 maanden</i>	5	45,5%	7	53,8%	12	50,0%
<i>>12 maanden</i>	6	54,5%	6	46,2%	12	50,0%
Medische behandeling						
<i>Ja</i>	9	81,8%	8	66,7%	17	73,9%
<i>Ziekenhuis</i>	4	100,0%	8	100,0%	12	100,0%
<i>Huisarts</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Andere</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Nee</i>	2	18,2%	4	33,3%	6	26,1%
Psychische behandeling						
<i>Ja</i>	8	72,7%	8	66,7%	16	69,6%
<i>Nee</i>	3	27,3%	4	33,3%	7	30,4%
Alcohol- en middelenmisbruik						
<i>Geen vermoeden</i>	7	38,9%*	20	74,1%*	27	60,0%
<i>Mogelijk misbruik</i>	3	16,7%	2	7,4%	5	11,1%
<i>Waarschijnlijk misbruik</i>	8	44,4%	5	18,5%	13	28,9%
As I diagnose						
<i>Geen AS I diagnose geformuleerd</i>	8	36,4%	8	25,8%	16	30,2%
<i>Stemmingsst.</i>	1	4,5%	8	25,8%	9	17,0%
<i>Middelenmisbruik</i>	5	22,7%*	0	0,0%*	5	9,4%
<i>Stemming + middelenmisbruik</i>	1	4,5%	1	3,2%	2	3,8%
<i>Acute aanpassingsstoornis</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Andere</i>	3	13,6%	6	19,4%	9	17,0%
<i>Enkel probleembeschrijving</i>	4	18,2%	8	25,8%	12	22,6%
As II diagnose						
<i>Geen AS II diagnose geformuleerd</i>	17	77,3%	18	58,1%	35	66,0%
<i>Cluster B</i>	4	18,2%	4	12,9%	8	15,1%
<i>Andere</i>	1	4,5%	3	9,7%	4	7,5%
<i>Uitgesteld</i>	0	0,0%*	6	19,4%*	6	11,3%

ZH Oost-Limburg⁺

	Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%
EB factoren						
Situering in de tijd						
Maand van suïcidepoging						
<i>Januari</i>	3	13,6%	2	5,7%	6	10,3%
<i>Februari</i>	2	9,1%	7	20,0%	9	15,5%
<i>Maart</i>	0	0,0%	2	5,7%	2	3,4%
<i>April</i>	2	9,1%	2	5,7%	4	6,9%
<i>Mei</i>	4	18,2%	4	11,4%	8	13,8%
<i>Juni</i>	2	9,1%	5	14,3%	7	12,1%
<i>Juli</i>	1	4,5%	3	8,6%	4	6,9%
<i>Augustus</i>	4	18,2%	2	5,7%	6	10,3%
<i>September</i>	2	9,1%	2	5,7%	4	6,9%
<i>Oktober</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>November</i>	1	4,5%	3	8,6%	4	6,9%
<i>December</i>	1	4,5%	3	8,6%	4	6,9%
Tijdstip van suïcidepoging						
<i>Ochtend</i>	0	0,0%	2	7,1%	2	4,8%
<i>(Na)middag</i>	5	35,7%	9	32,1%	14	33,3%
<i>Avond</i>	4	28,6%	11	39,3%	15	35,7%
<i>Nacht</i>	5	35,7%	6	21,4%	11	26,2%
Methode						
<i>Zelfvergiftiging</i>	17	81,0%	32	91,4%	50	87,7%
<i>Zelfverwonding</i>	3	14,3%*	0	0,0%*	3	5,3%
<i>Combinatie zelfvergiftiging en -verwonding</i>	1	4,8%	3	8,6%	4	7,0%
Alcoholinname tijdens poging	10	47,6%	10	28,6%	20	35,1%
Ernst letsel						
<i>Geen</i>	8	34,8%	14	43,8%	22	40,0%
<i>Beperkt</i>	12	52,2%	11	34,4%	23	41,8%
<i>Ernstig</i>	2	8,7%	5	15,6%	7	12,7%
<i>Levensbedreigend</i>	1	4,3%	2	6,3%	3	5,5%
Aanmelding						
<i>Op eigen initiatief</i>	3	13,6%	3	11,1%	6	12,2%
<i>Via 100</i>	10	45,5%	13	48,1%	23	46,9%
<i>Via politie</i>	3	13,6%	0	0,0%	3	6,1%
<i>Via huisarts/ verwijsbrief</i>	2	9,1%	4	14,8%	6	12,2%
<i>Via andere(n)</i>	4	18,2%	9	33,3%	13	26,5%
Poging onderbroken	9	40,9%	6	20,7%	15	29,4%

ZH Oost-Limburg⁺

	Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%
Suïcidale gedachten na de poging						
IPEO 1						
<i>Nee</i>	15	78,9%	15	65,2%	30	71,4%
<i>Zwak</i>	2	10,5%	5	21,7%	7	16,7%
<i>Matig tot sterk</i>	2	10,5%	3	13,0%	5	11,9%
IPEO 2						
<i>Nee</i>	14	82,4%	17	65,4%	31	70,5%
<i>Zwak</i>	1	5,9%	4	15,4%	6	13,6%
<i>Matig tot sterk</i>	2	11,8%	5	19,2%	7	15,9%
Suïcidale plannen na de poging						
IPEO 1						
<i>Niet over nagedacht</i>	3	75,0%	4	57,1%	7	63,6%
<i>Over nagedacht, maar details niet uitgewerkt</i>	1	25,0%	3	42,9%	4	36,4%
<i>Goed geformuleerd en details uitgewerkt</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
IPEO 2						
<i>Niet over nagedacht</i>	1	33,3%	5	55,6%	6	10,2%
<i>Over nagedacht, maar details niet uitgewerkt</i>	2	66,7%	2	22,2%	5	8,5%
<i>Goed geformuleerd en details uitgewerkt</i>	0	0,0%	2	22,2%	2	3,4%
Hopeloosheid						
<i>Negatieve anticipatie</i>	4	57,1%	9	50,0%	13	52,0%
<i>Positieve anticipatie</i>	2	28,6%	4	22,2%	6	24,0%
<i>Onzeker, ambivalent</i>	1	14,3%	5	27,8%	6	24,0%
Gevoelens na de poging						
<i>Kwaadheid</i>	1	4,5%	0	0,0%	1	1,9%
<i>Ambivalentie</i>	1	4,5%	2	6,7%	3	5,8%
<i>Spijt over mislukte poging</i>	1	4,5%	4	13,3%	5	9,6%
<i>Blij met mislukte poging</i>	2	9,1%	4	13,3%	6	11,5%
<i>Angst/ Onrust</i>	1	4,5%	4	13,3%	5	9,6%
<i>Leegheid</i>	2	9,1%	2	6,7%	4	7,7%
<i>Depressief</i>	1	4,5%	5	16,7%	6	11,5%
<i>Schuld/ Schaamte</i>	0	0,0%	1	3,3%	1	1,9%
<i>Goed, positief</i>	2	9,1%	2	6,7%	4	7,7%
<i>Rustig</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Negatief</i>	2	9,1%	2	6,7%	4	7,7%
<i>Emotioneel</i>	4	18,2%	7	23,3%	11	21,2%
<i>Minimalisatie van poging</i>	2	9,1%	1	3,3%	3	5,8%
<i>Te versuft</i>	5	22,7%	3	10,0%	8	15,4%
<i>Andere</i>	4	18,2%	6	20,0%	10	19,2%

ZH Oost-Limburg⁺

	Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%
Ervaren problemen						
<i>Partner</i>	12	54,5%	25	75,8%	38	67,9%
<i>Ouders</i>	5	22,7%	11	33,3%	16	28,6%
<i>Kinderen</i>	3	13,6%	12	36,4%	16	28,6%
<i>Eenzaamheid</i>	7	31,8%	18	54,5%	26	46,4%
<i>Sociale relaties</i>	8	36,4%	7	21,2%	16	28,6%
<i>Afnijzing door geliefde</i>	5	22,7%	11	33,3%	16	28,6%
<i>Gezondheid</i>	6	27,3%	9	27,3%	16	28,6%
<i>Psychisch/psychiatrisch</i>	16	72,7%	17	51,5%	34	60,7%
<i>Werk</i>	6	27,3%	10	30,3%	16	28,6%
<i>Justitie</i>	3	13,6%	1	3,0%	4	7,1%
<i>Wonen</i>	6	27,3%*	2	6,1%*	8	14,3%
<i>Financiën</i>	7	31,8%	5	15,2%	12	21,4%
<i>School</i>	2	9,1%	4	12,1%	6	10,7%
<i>Seksuele oriëntatie</i>	1	4,5%	3	9,1%	4	7,1%
<i>Overlijden/ ziekte sign. pers.</i>	7	31,8%	11	33,3%	18	32,1%
<i>ZMP, ZM sign. pers.</i>	4	18,2%	2	6,1%	6	10,7%
<i>Traumatische gebeurtenis</i>	6	27,3%	15	45,5%	22	39,3%
Motieven						
<i>Vreselijke gedachten</i>	5	31,3%	12	48,0%	18	42,9%
<i>Weg willen</i>	11	68,8%*	9	36,0%*	20	47,6%
<i>Ondraaglijke situatie</i>	5	31,3%	15	60,0%	21	50,0%
<i>Controleverlies</i>	4	25,0%	8	32,0%	13	31,0%
<i>Zichzelf straffen</i>	1	6,3%	3	12,0%	5	11,9%
<i>Mislukking voelen</i>	4	25,0%	12	48,0%	17	40,5%
<i>Hulp zoeken</i>	6	37,5%	3	12,0%	10	23,8%
<i>Ontreddering tonen</i>	4	25,0%	8	32,0%	13	31,0%
<i>Liefde tonen</i>	3	18,8%	4	16,0%	8	19,0%
<i>In vraag stellen liefde</i>	2	12,5%	3	12,0%	6	14,3%
<i>Mening beïnvloeden</i>	1	6,3%	2	8,0%	3	7,1%
<i>Spijt doen krijgen</i>	2	12,5%	5	20,0%	8	19,0%
<i>Iemand bang maken</i>	0	0,0%	3	12,0%	3	7,1%
<i>Kwaad zijn op iemand</i>	2	12,5%	5	20,0%	8	19,0%
<i>Willen sterven</i>	10	62,5%	11	44,0%	22	52,4%

ZH Oost-Limburg⁺

	Man		Vrouw		Totaal	
	n	%	n	%	n	%
Suïcidale intentie						
<i>Laag</i>	3	16,7%*	16	66,7%*	19	45,2%
<i>Hoog</i>	15	83,3%*	8	33,3%*	23	54,8%
Ambivalentie tov het leven						
<i>Niet willen sterven</i>	1	7,1%	7	30,4%	8	21,1%
<i>Onverschilligheid</i>	6	42,9%	8	34,8%	15	39,5%
<i>Willen sterven</i>	7	50,0%	8	34,8%	15	39,5%
Zorgbehoeften						
<i>Op vormelijk niveau</i>	7	36,8%	8	25,8%	15	30,0%
<i>Op inhoudelijk niveau</i>	2	10,5%	9	29,0%	11	22,0%
<i>Op beide niveaus</i>	6	31,6%	3	9,7%	9	18,0%
<i>Geen van beide niveaus</i>	4	21,1%	11	35,5%	15	30,0%
Zorgtraject						
Geen verdere behandeling	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Ontslag op advies</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Ontslag op tegenadvies</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Terugkeer naar begeleidingsdienst</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ambulante behandeling	0	0,0%	1	2,9%	1	1,8%
Residentiële behandeling	22	100,0%	34	100,0%	56	100,0%
<i>Somatische behandeling</i>	4	18,2%	6	17,6%	10	17,9%
<i>Urgentiepsychiatrie</i>	22	100,0%	31	91,2%	53	94,6%
<i>Intramurale PAAZ</i>	7	31,8%	12	35,3%	19	33,9%
<i>Extramurale PAAZ</i>	1	4,5%	0	0,0%	1	1,8%
<i>PZ of PVT</i>	1	4,5%	1	2,9%	2	3,6%

Bijlage: Relevante invloedsferen

Relevante invloedsferen van de deelnemende ziekenhuizen (gemeenten die behoren tot de regio van het desbetreffende ziekenhuis)

UZ Gent

Aalter	Hamme	Maldegem	Waasmunster
Anzegem	Herzele	Melle	Wachtebeke
Assenede	Horebeke	Merelbeke	Waregem
Avelgem	Ichtegem	Moerbeke	Wetteren
Berlare	Kaprijke	Nazareth	Wichelen
Brakel	Kluisbergen	Nevele	Wielsbeke
De Pinte	Knesselare	Oosterzele	Wortegem-Petegem
Deinze	Kruishoutem	Oudenaarde	Zele
Dentergem	Laarne	Ruiselede	Zelzate
Destelbergen	Lede	Sint-Gillis-Waas	Zingem
Eeklo	Lendeledede	Sint-Laureins	Zomergem
Erpe-Mere	Lierde	Sint-Lievens-Houtem	Zottegem
Evergem	Lochristi	Sint-Martens-Latem	Zulte
Gavere	Lokeren	Spiere-Helkijn	Zwalm
Gent	Lovendegem	Stekene	
Geraardsbergen	Maarkedal	Waarschoot	

AZ Damiaan, Oostende

Bredene	Gistel	Koksijde	Oostende
De Haan	Ichtegem	Middelkerke	Oudenburg
Diksmuide	Koekelare	Nieuwpoort	

AZ Glorieux, Ronse

Ronse	Brakel	Oudenaarde	Wortegem-Petegem
Maarkedal	Horebeke	Avelgem	
Kluisbergen	Bever	Lierde	

AZ Groeninge, Kortrijk

Anzegem	Kortrijk	Oostrozebeke	Wielsbeke
Avelgem	Kuurne	Spiere-Helkijn	Zwevegem
Deerlijk	Ledegem	Waregem	
Dentergem	Lendeledede	Wervik	
Harelbeke	Menen	Wevelgem	

AZ Lokeren

Lokeren	Zele	Waasmunster	Wachtebeke
Moerbeke	Berlare	Lochristi	

AZ Maria Middelaars, Gent

Aalter	Kruishoutem	Nevele	Zelzate
De Pinte	Laarne	Oosterzele	Zingem
Deinze	Lochristi	Sint-Martens-Latem	Zomergem
Destelbergen	Lovendegem	Sint-Lievens-Houtem	Zulte
Evergem	Melle	Waarschoot	Zwalm
Gavere	Merelbeke	Wachtebeke	
Gent	Nazareth	Wetteren	

AZ Monica, Antwerpen

Antwerpen	Malle	Wijnegem	Zwijndrecht
Boechout	Ranst	Wommelgem	
Borsbeek	Schilde	Zandhoven	
Brecht	Schoten	Zoersel	

AZ Oudenaarde

Anzegem	Horebeke	Maarkedal	Zingem
Avelgem	Kluisbergen	Oudenaarde	Zwalm
Gavere	Kruishoutem	Wortegem-Petegem	

AZ St-Augustinus, Veurne

Alveringem	Diksmuide	Lo-reninge	Veurne
De Panne	Koksijde	Nieuwpoort	

AZ St-Jozef Malle

Beerse	Kalmthout	Rijkevorsel	Zandhoven
Brecht	Lille	Schilde	Zoersel
Essen	Malle	Wijnegem	
Hoogstraten	Ranst	Wuustwezel	

AZ St-Maarten, Duffel

Berlaar	Kapelle-op-den-Bos	Londerzeel	Sint-Katelijne-Waver
Bonheiden	Keerbergen	Mechelen	Willebroek
Boortmeerbeek	Kontich	Nijlen	Zemst
Duffel	Lier	Putte	
Heist-op den-Berg	Lint	Rumst	

AZ St-Blasius, Dendermonde

Berlare	Hamme	Merchtem	Waasmunster
Buggenhout	Lebbeke	Opwijk	Wichelen
Dendermonde	Londerzeel	Sint-Amands	Zelee

AZ St-Jan, Brugge

Aalter	De Haan	Knokke-Heist	Oostkamp
Alveringem	De Panne	Koekelare	Oudenburg
Beernem	Diksmuide	Koksijde	Torhout
Blankenberge	Gistel	Maldegem	Veurne
Bredene	Ichtegem	Middelkerke	Wingene
Brugge	Jabbeke	Nieuwpoort	Zedelgem
Damme	Knesselare	Oostende	Zuienkerke

AZ St-Lucas, Brugge

Oostkamp	Zedelgem	Jabbeke	Ruiselede
Beernem	Damme	Wingene	Zuienkerke
Brugge	Knesselare	Aalter	Maldegem

AZ Vesalius, Tongeren

Bilzen	Herstappe	Lanaken	Voeren
Borgloon	Hoeselt	Riemst	Wellen
Heers	Kortesseem	Tongeren	

H. Hartziekenhuis, Mol

Balen	Ham	Lommel	Mol
Dessel	Leopoldsburg	Meerhout	Retie

Jan Yperman ZH, Ieper

Alveringem	Houthulst	Lo-Reninge	Vleteren
Diksmuide	Ieper	Mesen	Wervik
Heuvelland	Langemark-Poelkapelle	Poperinge	Zonnebeke

Mariaziekenhuis, Overpelt

Overpelt	Hamont-Achel	Bocholt	Meeuwen-Gruitrode
Neerpelt	Hechtel-Eksel	Leopoldsburg	Balen
Lommel	Peer	Bree	

OLV Aalst & Asse

Aalst	Dilbeek	Lede	Roosdaal
Affligem	Erpe-Mere	Lennik	Sint-Lievens-Houtem
Asse	Galmaarden	Liedekerke	Sint-Pieters-Leeuw
Berlare	Geraardsbergen	Londerzeel	Ternat
Bever	Gooik	Meise	Wemmel
Brakel	Haaltert	Merchtem	Wichelen
Buggenhout	Herne	Ninove	
Denderleeuw	Herzele	Opwijk	
Dendermonde	Lebbeke	Pepingen	

OLV van Lourdes ZH, Waregem

Anzegem	Dentergem	Waregem	Zulte
Avelgem	Kruishoutem	Wielsbeke	
Deerlijk	Oostrozebeke	Wortegem-Petegem	

RZ St-Maria Halle

Beersel	Gooik	Lennik	Roosdaal
Bever	Halle	Linkebeek	Sint-Genesius-Rode
Galmaarden	Herne	Pepingen	Sint-Pieters-Leeuw

AZ Salvator, Hasselt

Alken	Geetbets	Hoeselt	Nieuwerkerken
Beringen	Halen	Houthalen-Helchteren	Scherpenheuvel-Zichem
Bilzen	Ham	Kortenaken	Sint-Truiden
Borgloon	Hasselt	Kortesseem	Tessenderlo
Bree	Heers	Leopoldsburg	Wellen
Diepenbeek	Herk-de-Stad	Lummen	Zonhoven
Diest	Heusden-Zolder	Meeuwen-Gruitrode	

RZ St-Trudo, Sint-Truiden

Alken	Halen	Landen	Wellen
Borgloon	Heers	Linter	Zoutleeuw
Geetbets	Herk-de-Stad	Nieuwerkerken	
Gingelom	Kortenaken	Sint-Truiden	

UZ Leuven

Aarschot	Haacht	Kortenberg	Overpelt
Alken	Halen	Kortesseem	Peer
Arendonk	Halle	Kraainem	Pittem
As	Ham	Laakdal	Putte
Baarle-Hertog	Hamont-Achel	Lanaken	Retie
Balen	Hasselt	Landen	Riemst
Begijnendijk	Hechtel-Eksel	Leopoldsburg	Rotselaar
Bekkevoort	Heers	Leuven	Scherpenheuvel-Zichem
Beringen	Heist-op-den-Berg	Lille	Sint-Katelijne-Waver
Berlaar	Herent	Linter	Sint-Truiden
Bertem	Herentals	Lommel	Steenokkerzeel
Bierbeek	Herenthout	Lubbeek	Tervuren
Bilzen	Herk-de-Stad	Lummen	Tessenderlo
Bocholt	Herselt	Maaseik	Tielt-Winge
Bonheiden	Herstappe	Maasmechelen	Tienen
Boortmeerbeek	Heusden-Zolder	Machelen	Tongeren
Borgloon	Hoegaarden	Mechelen	Tremelo
Boutersem	Hoeilaart	Meerhout	Voeren
Dessel	Hoeselt	Meeuwen-Gruitrode	Vorselaar
Diepenbeek	Holsbeek	Meise	Vosselaar
Diest	Houthalen-Helchteren	Merksplas	Wellen
Dilsen-Stokkem	Huldenberg	Mol	Westerlo
Geel	Hulshout	Neerpelt	Wezembeek-Oppem
Geetbets	Kampenhout	Nieuwerkerken	Zaventem
Genk	Kapelle-op-den-Bos	Olen	Zemst
Gingelom	Kasterlee	Opglabbeek	Zonhoven
Glabbeek	Keerbergen	Oud-Heverlee	Zoutleeuw
Grimbergen	Kinrooi	Oud-Turnhout	Zutendaal
Grobbendonk	Kortenaken	Overijse	

ZH Maas en Kempen, Maaseik

Bocholt	Kinrooi	Meeuwen-Gruitrode
Bree	Maaseik	Opglabbeek
Dilsen-Stokkem	Maasmechelen	Peer

ZH Oost-Limburg, Genk

As	Hamont-Achel	Lanaken	Overpelt
Bilzen	Hechtel-Eksel	Leopoldsburg	Peer
Bocholt	Herstappe	Lommel	Riemst
Borgloon	Heusden-Zolder	Maaseik	Tongeren
Bree	Hoeselt	Maasmechelen	Wellen
Diepenbeek	Houthalen-Helchteren	Meeuwen-Gruitrode	Zonhoven
Dilsen-Stokkem	Kinrooi	Neerpelt	Zutendaal
Genk	Kortesseem	Opglabbeek	

Referentie

Bille-Brahe, U., Schmidtke, A., Kerkhof, A.J.F.M., De Leo, D., Lönnqvist, J., Platt, S. (1994). Background and introduction to the study. In: A.J.F.M. Kerkhof, A. Schmidtke, U. Bille-Brahe, D. De Leo, & J. Lönnqvist (Eds.), *Attempted suicide in Europe: Findings from the Multicentre study on Parasuicide by the WHO Regional Office for Europe*. Leiden: DSWO Press.